**Read enclosed leaflet before use. उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। ಉಪಯೋಗಿಸುಟಕು ముందు జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి.**

## మోనోక్రోటోఫాస్ 36% ఎస్.ఎల్. - కీటకనాశని

రసాయనిక మిశ్రమము : మోనోక్రోటొఫాస్ టెక్ని (68% భార/భార సు.మ. స్వచ్ఛత పై ఆధారితి) ... 53.0% భార/భార, సాల్వెంట్ (సైక్లొహెక్సానన్) ... 47.0% భార/భార, మొత్తం ... 100.0% భార/భార. ఉపయోగించువిధము మొదట : మందు ఉపయోగించువారు తప్పకుండా జాగ్రత్తగా చదవవలెను. హెచ్చరిక : కూలగాలుల సంబంధిత సిమ్పించవలెను. మందు తాగరాదు : 1. మందును ఆహారపదార్థములు ధాన్ పాత్రలు మరియు పశుగ్రాసాలకు దూరంగా ఉంచండి. 2. మందును ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు తగులు నీయరాదు. 3. మందును పీల్చరాదు. గాలి వాలుని పిచికారి చేయరాదు. 4. కుయుక్ష మున్నులు మరియు చర్మమును బాగా శుభ్రపరుచుకోవలెను. 5. పిచికారి చేయునపుడు పొగాకులను, త్రాగరాదు, తినరు మరియు ఏమైన తినరాదు మరియు నంకకిత్తెన మున్నులు తరించరాదు. విధగరు : 1. ఆట్రోపిన్ రోగికి 2 ంంటలో ఇవ్వండి. 2-4 మి.గ్రా. ఆట్రోపిన్ సల్ఫేట్ మోతాదు వారాలన్నా 5-10 ని.ఎదాదుంబులో ఇవ్వండి. రోజుకి 25-50 మి.గ్రా. ఆట్రోపిన్ అవసరమవారవుచు. ఆట్రోపిన్ నిలంత్రణ రోగి లక్షణములను బట్టి చేయండి. లాలాజలస్రావి ఇది మోతాదు చూచుకొనవలెను. 2. 1-2 గ్రా. ఆక్సి ఏ.ఎ.ఎమ్. 10 ఎంలీ. ఎడతోనే కలిసి నరాలలోనా వాలా వెళ్ళుదిగా 10-15 ని.లలో ఇవ్వండి. ఔషద దిశిక్ష : ఉపయోగించువిధము మొదట కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదవవలెను. విషలక్షణములు : ఉపయోగించువిధము మొదట కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదవవలెను. సిపొరుపులు : వరి అంచు దోమదోషా, చచ్చీచీపురుగు, కపుపుంకాయము తొండ పురుగు, ప్రత్తి పై ఆశించు ఆపిపిడ్స్ ప్రత్తి పురుగు, పచ్చ పురుగు, కాయ పురుగు, మొక్క పురుగు, ఆకు ముడత పురుగు పురుగు పై సిఫారసుచేయుటకు ఉపయోగించవలెను. గమనిక : ఈ లేబుల్ / లీఫ్‌లెట్‌లో సిద్ధేశించబడ్డ పంటలకు తప్ప మరి దేనికి వాడరాదు.

## मोनोक्रोटोफॉस ३६% एस.एल. - कीटनाशक

रासायनिक संरचना : मोनोक्रोटोफॉस. टेक्निकल (भार के हिसाब से ६८ प्रतिशत स.त. पर आधारित) ... ५३.०० % भार/भार, शोलक ( सायक्लोहेक्सानोन) ... ४७.०० % भार/भार, कुल.... १००.०० % भार/भार, प्रयोग करने के संबंधमे सुचना : कृपया साथमे दी हुयी हस्तपुस्तिका प्रयोग करने के पहिले अवश्य पढ़े। चेतावनी : शाक-सब्जियों पर उपयोग पर पाबंदी। प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुँह, त्वचा और आँखों के संपर्क से बचाएं। ३. छिड़काव की समय की सांस द्वारा अंदर जाने से बचाएं। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नही चाहिए। ६. छिड़काव करने का मिलाने समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। विषबाधाः १. रोगी को तुरंत एट्रोपिन देंजिए और इसकी २ से ४ मि.ग्रा. तब की खुराक ५ से १० मिनट के अंतराल पर अंतःशिरा द्वारा लगातार देते हुए पूर्ण एट्रोपिनाइज रखिए। एक दिन में एट्रोपिन सल्फेट की अधिक से अधिक २५ से ५० मिग्रा. तक की मात्रा की आवश्यकता पड़ सकती है। एट्रोपिन सल्फेट की मात्रा लक्षणों के बरकरार रहने दी जा सकती है। एट्रोपिन की कितनी खुराक देनी चाहिए इसके लिए मुँह से निकलने वाली लार एक लाभदायक कसौटी है। २. १ से २ ग्राम २ पी.ए.एम. १० मि.ली. आसुत जल में घोलकर अंतःशिरा द्वारा बहुत धीरे धीरे १० से १५ मिनट में देना चाहिए। विषबाधा के लक्षण : कृपया संलग्न लीफलेट पढ़ें। प्रायमिक चिकित्सा : कृपया संलग्न लीफलेट पढ़ें। सिफारिश : धान की फसल पर का भूरा पीछा फुदका, और पकासपरके प्रथम अंडुर डेंढक पर प्रभावशाली नियंत्रण के लिये इसकी सिफारिश की जाती है। सावधानी : लेबल / पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है।

## ಮೊನೋಕ್ರೋಟೊಫಾಸ್ 36% ಎಸ್.ಎಲ್. - ಕೀಟನಾಶಕ

ರಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಣ : ಮೋನೊಕ್ರೊಟೊಫಾಸ್ ಟೆಕ್ನಿ (68% ತೂಕ/ತೂಕ, ಎ.ಐ. ಶುದ್ಧತೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತ) ... 53.0% ತೂಕ/ತೂಕ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ (ಸೈಕ್ಲೊಹೆಕ್ಸನನ್) ... 47.0% ತೂಕ/ತೂಕ, ಮೊತ್ತ... 100.00% ತೂಕ/ತೂಕ.ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಧಾನ :ಇದರ ಜೊತೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಕಪ್ಪದೇ ಓದಿ ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಹೆಚ್ಚರಿಕೆ :ತಾರಕರು ಬೆಳಗಾಳಮೆಳೆ ನಿಷೇದಿಸಲಾಗದೆ. ಮುಂದು ಜಾಗ್ರತೆಗಳು: 1.ಆಹಾರ ವಸ್ತು, ಪಶು ಆಹಾರ, ಬಿಂಡಿ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರವಿಡಿಸಬೇಕು. 2. ಬಾಲಿಯಾದ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. 3. ಕಣ್ಣುಹಾಗೂ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಾಕದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು. 4. ಮಂಎಗಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಗಾಳಿಯಾಯುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ರೋಗಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು. 5. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬೆಳಗಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಶರೀರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 6. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವವರು ದೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದು, ಕುಡಿಯುವುದು, ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಜಗಿಯುವುದು ಮಾಡಬಾರದು. ಸಿಂಪರಣೆ ಬೇಳೆ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕವಚ, ಕನ್ನಡಿ ಚಾಳಿಸು, ಬೂಟು, ನಿಲುವಂಗಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : - 1. 2-4 .ಮಿ.ಗ್ರಾಂ. 5 ರಿಂದ 10 5ಮಿಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಟ್ರಿಫಿನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದಿನಕ್ಕೆ 25- 50 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ. ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊದಲು ನರಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬರುವವರೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ವಿಷ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಎಟ್ರಿಫಿನ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 2. 1 ರಿಂದ 2 ಗ್ರಾಂ. ಪಿ.ಎ.ಎಂ ನ್ನು 10 ಸಿಸಿ ಸ್ಟಂರಿಸುವ ನರಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು. ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ :ಇದರ ಜೊತೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಓದಿ ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ವಿಷಲಕ್ಷಣಗಳು: ಇದರ ಜೊತೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಕಪ್ಪದೇ ಓದಿ ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಶಿಫಾರಸ್ಸು : ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗುವ ಕಂದು ಜಿಗಿಹುಳು (ಮೊಸ) ಕಾಯಿಕೊರಕ ಹುಳು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಈ ಲೇಬಲ್ / ವಿವರಣಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಲಾದ ಹೊರತಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬಾರದು.

## மோனோக்ரோடோபோஸ் 36% எஸ்.எல். - பூச்சிக்கொல்லி

ரசாயன கலவை : மோனோக்ரோடோபோஸ் டெக். (68% எ/எ எனு அடிப்படையில்) ... 53.00 % எ/எ, ஸால்வெந்ட் - ஸைக்லோஹெக்ஸானோன் ... 47.00 % எ/எ, மொத்தம் ... 100.00 % எ/எ. பயன்படுத்தும் முறைகள் : உபயோகிக்குமுன் இணைத்துள்ள பிரசுரம் மற்றும் லையினை முழுமையாகப் படிக்கவும்.முன்னெச்சரிக்கைகள்: 1. உணவுப் பண்டங்கள், உணவுப் பொருட்கள் இருந்த காலிடப்பாக்கள் மற்றும் கால்நடை தீவனங்கள் இருக்கும் இடத்தை விட்டு தூரமாக வைக்கவும். 2. வாய், கண்கள் மற்றும் சருமத்தின் மீது படுவதைத் தவிர்க்கவும். 3. ஸ்ப்ரே மிஸ்ட்டை உள்ளுக்குள் முகசிவதைத் தவிர்க்கவும். காற்று வீசும் திசைநோக்கி ஸ்ப்ரே செய்யவும் 4. மருந்தை ஸ்ப்ரே செய்து முடித்தும் மருந்து பட்ட துணிகள் மற்றும் சருமப் பகுதிகளை நன்றாக தண்ணிரில் அலசிக் கழுவவும். 5. மருந்தை ஸ்ப்ரே செய்யும்போது புகைக்கவோ, குடிக்கவோ, சாப்பிடவோ, எதையும் மெல்லவோ கூடாது. 6. மருந்தை கலக்கும்போதும், ஸ்ப்ரே செய்யும்போதும் பாதுகாப்பு உடைகளை அணிந்து கொள்ளுங்கள். மற்று மருந்தாக : அட்ரோபின் முறிவு மருந்தாகும். நோயாளிக்கு ஒவ்வொரு 5-10 நிமிடங்களுக்கு ஒருமுறை 2-4 மி.கிராம் அளவுடன் மீண்டும் நரம்பு ஊசிமூலம் அட்ரோபினைத் தரவேண்டும். நுரை தள்ளுதல் குறைவதைப் பொருத்து அட்ரோபின் மருந்து அளவை நிர்ணயிக்கவும். நான் ஒவ்வொரு 25-50 மி.கிராம் அட்ரோபின் தேவைப்படலாம். 2. பி.ஏ.எம்.மை 10 மி.லீட்டர் நீரில் கலந்தது (1-2 கிராம்) ஊசிமூலம் நேரத்தக் முழுமய் வழி மெதுவாக 10-15 நிமிட காலம் எடுத்துக் கொண்டு உட்செலுத்தவேண்டும். முதலுதவி : உபயோகிக்குமுன் இணைத்துள்ள பிரசுரம் மற்றும் லையினை முழுமையாகப் படிக்கவும். அறிகுறிகள் : உபயோகிக்குமுன் இணைத்துள்ள பிரசுரம் மற்றும் லையினை முழுமையாகப் படிக்கவும். எச்சரிக்கை: இந்த லேபிள்/பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பயிர்கள் தவிர மற்ற பயிர்களில் பயன்படுத்தக் கூடாது.

Aegis™

# SUNCRON

## MONOCROTOPHOS 36% S.L.

Insecticide

Keep out of reach of children.
बच्चों की पहुंच से दूर रखें
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి
ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಡಿರಿ

**A product of Aegis™**

## MONOCROTOPHOS 36% SL - INSECTICIDE

Chemical Composition : Monocrotophos Tech. (based on 68% w/w a.i.) ... 53.0% w/w, Solvent (Cyclohexanone) ... 47.0% w/w, Total ... 100.0% w/w. Direction for use : Please read the entire label and leaflet before use. Warning : Banned for use on Vegetables. Precautions : 1.Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2.Avoid contact with mouth, eyes and skin.3.Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4.Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.5.Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.6.Wear full protective clothing while mixing and spraying Antidote : 1. Atropinize the patient immediately and maintain full atropinization by repeated doses of 2 to 4 mg. of atropine sulphate intravenously at 5 to 10 minutes interval. As much as 25 to 50 mg. of atropine may be required in a day. The need for further atropine administration is guided by the continuance of symptoms. Extent of salivation is a useful criterion for dose adjustment. 2. Dissolve 1-2 gm of 2 PAM in 10 ml distilled water and inject intravenously very slowly for 10-15 minutes. First Aid : Please see enclosed leaflet. Symptoms : Please see enclosed leaflet. Recommendations: It is recommended to control Brown plant hopper in paddy, early shoot borer on cotton. "Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet."

Regn.No / रजि नं. :

**CIR-112225/2014-Monocrotophos (SL) (345)-24**

Mfg.Lic.No / उत्पादक लायसेंस. न. : **019/TS-IML/2016 Dt. 23-7-2016**

Manufactured & Marketed by :

**Aegis™**

Agro Chemicals India Private Limited
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY
# 237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295. Telangana State.

In Case of any Consumer Complaints Contact, "Manager Customer Care" Cell No.: +91 84980 99536
Email : aegisagrochemicals@gmail.com
Website : www.aegisagro.in
(Address as of Aegis Agro Sangareddy Dist, T.S.)

Net Contents : **1ℓ**
उतशुद्ध सामग्री :

Batch No :
बैच नं . :

Mfg.Date :
उत्पादन तिथि :

Exp.Date :
निष्प्रभावी होने का तिथि:

Max.Retail.Price ₹ :
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
(Inclusive of all taxes)
(सभी करों सहित)

**For Agricultural Use Only**

**BANNED FOR USE ON VEGETABLE CROPS**

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. ठंडी, शुष्क जगह से गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।

**EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE**