सनकॉन

मोनोक्रोटोफॉस ३६% एस.एल.(कीटनाशक)

खबरदारी : हया लेबल /हस्तपत्रिकेत निवेदित केलेल्या पीकांखेरीज अन्य कुठल्याहि पीकांवर याचा उपयोग करू नये.

परिचय : एक रचनाबद्ध आणि संसर्गस्थापित करणारे विश्वव्यापी द्रव सुगीकरण असून ते मोनोक्रोटोफॉस टेक्नीकल यावर आधारित आहे.

जैव प्रभावी पदार्थाना-शिफारसी-निर्मित उत्पादनाचे गुणत्व -१.११

पीक	कीटा चे सामान्य नाम	ए.आय (ग्राम.%)	मात्रा प्रति हेक्टर सुगीकरण (मि.लि.)	सौम्यीकरण पाण्यात (लिटर)	प्रतिक्षा अवधि शेवटची फवारणी कापणी (दिवस)
अन्नधान्य					
तांदूळ	रोपावरिल तपकीरी टोळ हिरव्या	४००	१२५०	४००-१०००	-
		२५०	६२५	४००-१०००	-
	पानावरिल टोळ	२५०	६२५	४००-१०००	-
	पान धडी करणारा				
	गुंडाळणारा	४००	१२५०	४००-१०००	-
	पिवळा खोडछेदक	४००	१२५०	४००-१०००	-
	अंकूर माशी	२५०	६२५	४००-१०००	-
वटाणा	पर्ण छेदक	४००	१०००	४००-१०००	-
	गाय ढकूण	२५०	६२५	४००-१०००	-
कापूस	अमे रिकन बोंड अळी	४५०-८००	११२५-२०००**	४००-१०००	-
	ऑफिडस	१७५	४३७	४००-१०००	-
	पर्ण टोल	१७५	४६७	४००-१०००	-
	स्रे विविल	४००	१२५०	४००-१०००	-
	दीपकेदार बोंड अळी	४५०-८००	११२५-२०००**	४००-१०००	-
	गुलाबी बोंड अळी	८००	२०००	४००-१०००	-
	थ्रिप्स	१७५	४६७	४००-१०००	-
	पांढरी माशी	२००	४००	४००-१०००	-

✻ अंकुरण झाल्यानंतर ७ ते १४ दिवसांत कमी प्रमाणात मात्रा द्यावी आणि रांगांमध्ये बिज प्रक्रीये साठी अधिक प्रमाणांत मात्रा द्यावी लागवड करतांना.

✻✻ वमी प्रमाणांत मात्रा पहिल्या आणि दुसऱ्या इनस्टर आणि अधिक प्रमाणांत मात्रा तिसऱ्या आणि चौथ्या इनस्टर अळ्यांसाठी.

मात्रेची गणना करावयाचा मुळ आधार

पाहीजे गणलेले सुगीकरण.

एस ड्रॉ १००X ए.आय १००.. ए.आय

घनती Xसुगी- १.११X३६

करणा चे प्रतिशत

प्रयोगासाठी वापरण्याची साधनें - नॅपसॅक फवारक पायसंचालित फवारक दबावाचा पिशवीअसलेला फवारक पिशवीचा दबावाचा बॅटरीवर चालणारा फवारक आणि ऑरपी एच टी पी शक्ती संचलित फवारक. विषबाधेची लक्षणे : प्रारंभिक तक्रार तक्षांत येणारी लक्षणे म्हणजे पुढे दिलेल्या लक्षणांचा संयोग असू शकतो. डोके दुखी, मोवळ येणे, चक्कर येणे, मळमळ, वांती होणे अंधुक दिसणे, धामाधुम होणे अतिशय अशुद्धारा वाहणे आणि लाळ गळणे. प्रथमोपचार : १. जर गिळले गेले असेल तर ५% सोडीयम कार्बोनिटचे द्रावण देवून ऊलटी साठी प्रवृत्त करावे. २. प्रदुषित त्वचा धुवून टाकावी आणि डोळ्यांना साधारण खाऱ्या पाण्ने सिंचन करावे. औषधोपचार : १. रोग्याला तावडतोब ॲट्रोपनाइझेन करावे आणि कीत्येक तासांपर्यंत ॲट्रोपनाइझेन चालू ठेवावे पुन: पुन: २ ते ४ मि.ग्रा. ची मात्रा ३ ते १० मिनीटांच्या अंतराने देत राहून. त्यापुढे आणखी अट्रो पाईन देण्याची आवश्यकता आहे किंवा नाही ही लक्षणे तशीच पुढे चालू रहाण्यावर अवलंबून राहील. एका दिवसात जवळजवळ २४ ते ३० मि.ग्रा.आवश्यक असण्याची शक्यता असते अट्रोपाईनची आवश्यकता कीती प्रमाणात आहे हे ठरविण्यासाठी उत्तम निदर्शक म्हणजे लाळ गळण्याचे प्रमाण. २. २ पी.ए.एम. १-२ ग्रॅम घेऊन ते १० मि.ली. शुद्धीकरण केलेल्या पाण्यात विरघळवावे आणि त्याचे नरोमधे इंजेक्शन हळूहळू सुमारे १० ते १४ मिनीटांपर्यंत द्यावे. संग्रहण : १. कीटनाशकाचे संग्रहण करण्यासाठी निवडलेल्या खोल्या आगर झमरत/आवार हया मजबूत बांधणीच्या, कोरड्या, खोळती हवा असणाऱ्या भरपूर प्रकाशमय आणि पुरेश्या आकाराच्या असाव्यात, जेणे करुन बष्पाबरोबर होणारे प्रदुषण टाळता येईल. .२ कीटनाशक समाविष्ट असलेली पाकीटे ही स्वतंत्र अशी वेगळ्या खोल्या अगर झंमरतीत अशारितीने संग्रहीत करावीत की ते स्थान अन्य पदार्थ, सामग्री संग्रहणासाठी ठेवलेल्या खोल्यांपासून दूर असाव्यात विषेशत: खाद्य पदार्थ संग्रहण स्थानापासून. कीटनाशक स्वतंत्र अशा वेगळ्या कपाटामध्ये कडी कुलुप लावूनहि ठेवता येईल परंतू हे कीटनाशकाचा प्रकार आणि त्याचे परिमाण यावर अवलंबून राहील. पॅकिटस डब्बे यांची विल्हेवाट : १. पॅकिटस डब्बे आणि वापरुन ऊरलेली सामग्री तसेच मशीन आणि भांडी धुवून झालेले सांडपाणी यांची सुरक्षित पद्धदीती विल्हेवाट अशी लावावी की जेणे करुन प्रदुषण होण्यात प्रतिबंध होऊ शकेल. २. वापरलेली पाकीटे तशीच बाहेर टाकून देवू नयेत जेणे करुन त्यांचा पुन: वापर होवू शकणार नाही. ३. पाकीटे तोडून टाकावीत आणि त्यांना रहीवासी वस्तीपासून दूर जमिनीत गाडून टाकावे. प्रयोग करणाऱ्यांनी बाळगावयाची दक्षदारी : १. मिश्रणाचे सौम्यीकरण करतांना द्रावण संडण्याची किंवा त्याचे शिंतोडे उडण्याची शक्यता असते त्यामुळे अशा वेळी ऱ्हसनक्रीया किंवा त्वचेची संसर्ग टळावा. २. प्रयोग करणाऱ्यांनी संपूर्णपणे संरक्षित पेहराव करावा सौम्यीकरण करतांना,जसे खरी हातमोजे, बूट घेऊन वर आवरण किंवा धूळ प्रतिरोधी कुरुता, किंवा संरक्षि आंवरण करणारे वस्त्र अथवा खरी ऑपन, तसेच शिरोवस्त्र किंवा हॅट. ३. उच्च तीव्रतेच्या द्रावणासाठी कमी अथवा फारच कमी परिमाणाचे साधन वापरणे हे योग्यदायक असून तसे करणे टाळावे.

रासायनिक संघटन :

मोनोक्रोटोफास टेक्निकल	९३% व/व
(भार के हिसाबसे ६८% स.त. पर आधारित)	
घोलक (स्योक्लोहेक्सानोन)	४७% व/व
एकुल	१००% व/व

સર્ન્ક્રાન્ન્

મોનોક્રોટોફાસ 36% એસ.એલ. (કીટનાશક)

એહતીયાત : ખરાબ્રીસલાદ કરાસકત્રુતદીયુ સાવકેમલાદ ડોલેગર મોલ્લોડોમ
ઈસ્કાદીયાસનુ મલાસોયોલગોસ્કોલ. ન્યાસ્ટર ડોલેગર મોલ્લે ન્યસનુ મલાસોયોલગોસ્કાસરાદાસ.

પ્રારાદાયિક સમાચારાર: ડોલેગર મોલ્લે સારિલાસમારી રિલેકાસલુ મોલ્લસોલ્કોગ્રાસાસ્ન્ન્ સારાદોલ સલ્યાસ્નોલ્યુલ્લ્ક, અન્કાર વ્યાસ ભાગ્યાર સ્ટ્રક્ટર વ્યાસ્રોલ મોલ્લલે કુંડાયોગોલ્યુલ્લ ભાગ્યાર સિલેગલે કરોગલ સ્યુગ્રાસાલ્યુલ્લે કોલ્લાસલ્કે.

કોલ્લાસમોલ્લલ્સ શક્તિ / કોલ્લાસલ્યુ સાવદ્રતે

1.11 (સ્ટ્રિચ્નોસ ન્યુક્સોસ)યા કોનલેયા ટ્યુસરોલાસલ કોલ્લાસલ્કે

ડોલે	કોલ્લાસોગોગે	હેક્ટ્રોગે સ્યુમલાલ	કોલ્લાસલ્કે રોલલ	સોલ્યોલ	કોલ્લ્યુ સ્યુમલાલ
	ડોલ્લાસલ	મોલ્લલ્યુમલાલ	એ.પી.ઇ. સ્યુમલાલ	પ્યુલ્લાર	સ્યુમલાલલ
	હોલ્લાગોલ	ગ્રા.ગોલ્લ્યુ	લોલ્લાર્ન્સ્યુ	ડોલે ડોલલા	કાયોયલ સમાયા
ધ્રાન્યુ	દોલલમ્યાલ અલ્યલ	500	1250	500 - 1000	-
મગ	ડોલ્લાગોલ				
	હસોલ ક્રોલ	250	625	500-1000	-
એલી	સરુલ્લ ક્રોલ	250	625	500-1000	-
	ડોલે કાગલોકોલલ્ક હોલ્લ	250	1250	500-1000	-
	કાગલોકોલલ્ક હોલ્લ	500	1250	500-1000	-
મોલ્લલ્લ	ક્રોલ્લ				
	કાગલોકોલલ્કહોલ્લ	250	625	500-1000	-
ડ્યુલલ	ધાન્યુગોલ				
	કાગલોકોલલ્ક હોલ્લ	500	1250	500-1000	-
કોલ્લગા	ડોલે				
	કાગલોકોલલ્કહોલ્લ	250	625	500-1000	-
ધ્યાલ્લ	કાગલોકોલલ્કહોલ્લ	175	437	500-1000	-
	હોલ્લલ ડોલે / ડલ્લલ્લે				
	એલી કિલ્યુલ હોલ્લ	400	1000	500-1000	-
સ્કલ્લ	લ્ડ્યુ હોલ્લ,	450-800	1125-2000	500-1000	-
	જોગોલ્લ	175	437	500-1000	-
	હસોલ્લ હોલ્લ	175	467	500-1000	-
	એલી સરુલ્લ ક્રલ	500	1250	500-1000	-
	ક્રોલ્લ્યુ કાગલ ક્રોલલ્ક	450-800	1125-2000	500-1000	-
	ગોલલગલ કાગલ ક્રોલલ્ક	500	2000	500-1000	-
	કાગલ ક્રોલલ્ક				
	તલ્લ્યુ કિગોર્ન	175	437	500-1000	-
	ડલ્લ ગોલલ્લ	200	500	500-1000	-

મોલ્લેયોલલ્લદ 7-14 દિગાર્ન સાલ્લદ કલ્લિયો સ્યુમલાલ ડોલ્લોલ્લાસલ્કોલ્યુ હોલ્લોગલ્લે સાકલ્લ હોલ્લ્લે સ્યુમલાલ
ન્યોલ્લ.મલ્યુ ડાગોલલ્લે હાગલલ્લોલ્યુલ્લ કલ્યુલ્લોગોગે કલ્યુલ્લ સ્યુમલાલલ્લે 3 દિગલ્લ ૧ ત્ર હાગલલ્લોલ્યલ્લ ક્રોલ્લોગોગે હોલ્લ્લ સ્યુમલાલલ્લે
સ્યુમલાલ નિર્ગાયોલ્યલ્લ લ્યાગલ સલ્લ્લે કોલલ્લોલ્લલ્લ 36% એસ.એલ્લે.

ક્રોલ્લાગોલ્લે =100° કોલલ્લ સ્યુમલાલ 100° કોલલ્લ સ્યુમલાલ

સાગલ્યુલે કોલ્લાગોલ્લે 1.11° 36

ગિગલોલલ્લે મોલ્લાગલ્લ લોલ્લોલગોલ્લ કોલ્લ્યુ સ્યુ સલ્યુ, કાલ્લાગોલ્લ્લે લોલ્લોયાગલ્લ સલ્યુ, વિદ્યુત્ લાલોલ્લે સ્યુલ્લાર સલ્લ્લ્, ડ્યુલ્લોલ્લે લાલોલ્લ્લ્લ

SUNCRON

MONOCROTOPHOS 36% SL INSECTICIDE

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

Introduction: A systemic and contact solubel liquid formulation based on Monocroto phos technical. Bioefficary/recommendations: SP. Gravity of the finished product is 1,11

Crop	Common name of pests	A.I. (gm/%)	Dosage/HA Formulation (ml.)	Dilution in water (Ltr.)	waiting Period Between last spray Harvest (Days)
Paddy	Brown Plant hoopers	500	1250	500-1000	-
	Green leaf hoper	250	625	500-1000	-
	Leaf roller/folder	250	625	500-1000	-
	Yellow stemborer	500	1250	500-1000	-
Maize	Shoot fly	250	625	500-1000	-
Pea	Leaf minor	400	1000	500-1000	-
Cotton	American boll worm	450-800	1125-2000*	500-1000	-
	Aphid	175	437	500-1000	-
	Leaf hooper	175	437	500-1000	-
	Grey weevil	500	1250	500-1000	-
	Spotted boll worm	450-800	1125-2000**	500-1000	-
	Pink boll worm	800	2000	500-1000	-
	Thrips	175	437	500-1000	-
	White fly	200	500	500-1000	-

* Lower dosages for 7-14 days after germination and higher dosages for seed tratment in forrows at planting.

** Lower dosage for first and second instar and higher dosages for 3rd and 4th instar larva.

Basic of dosage calculation:

Formulation required:

Sp. Gr. = 100x a.i. / Density x percentatge = 100x A.I. / 1.11 X 36

Equipment used in application: Knapsack sprayer, footsprayer, compression knapsack sprayer, compression, knapsack battery sprayer and ASPEE - HTP Power sprayer. (a) Symptoms of poisoning: The early symptoms may be any combination of headache, gidiness, virgo, nausea, vomiting, blurred vision, Sweating execessive lacrimation and salivation. b) First and measures: 1. Gastric lavage with 5% sodium bicarbonate may be given if swallowed. 2. Wash contaminated skin the irrigate eyes with normal saline. Drug Therapy: 1. Atropinize the patient immeriatelyand a maintain full atropinization by repeated doses of 2 to 4 mg. at 5 to 10 minutes interval for hours together. The need for further atropine administration is indicated by the continuance of symptoms. As much as 25 to 50 mg. may be required in a day. The extent of salivation is a useful criterion to follow in adjusting the dosage of atropine. 2. Dissolve 1-2gm. of 2 PAM in 10 ml. distilled water and inject intravenously very slowly for 10-15 munutes. Storage:1. The rooms or premises meant for storing shall be well built, dry, ventilated and well lit and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour. 2. The packages containing the insecticides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises away from the particularly articles of food, shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quality & nature of the insecticide. Disposal of the Containers: 1. Packages or surplus materials and washing from the machine and containers should be disposed of water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re use.3. Packages shall be broken and burried away from habitation. Precautions:1. Avoid inhalation and skin contact while diluting because of spillag or splashes. Do not mix with bare hands. 2. The user should use full protective clothing diluting which includes rubber gloves, boots, either face shield or dust mask and an overall or rubber apron hood or hat. 3. Use in high concentrations with low and ultra low volume application equipmet is dangerous and should be avoided.

Chemical Compostion:

Monocrotophos Tech. (based on 68% w/w a.i.)	: 53% w/w
Solvent (Cyclohexamone)	: 47% w/w
Total	: 100% w/w

సన్‌క్రాన్

మోనోక్రోటోఫాస్ 36% ఎస్.ఎల్. (కీటకనాశని)

హెచ్చరిక : ఆకపచదిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపైనే ఈ మందును ఉపయోగించవలెను. మిగతాపైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

ప్రాథమిక సమాచారం: పైర్లపై చల్లుటకు వీలైన రూపంలో, మోనోక్రోటోఫాస్ ఆధారంగా తయారుచేయబడిన, అంతర్గత మరియు స్పర్శ శక్తి ద్వారా నిర్మూలన చేయు ఏటిలో కరిగే స్వభావంగల కీటకనాశని.

కీటకనిర్మూలన శక్తి/సిఫారసులు సాంద్రత 1.11 (స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ) గల ఆఖరి ప్రచురాప కీటకనాశని

పైరు	పురుగుల పేర్లు	హెక్టారుకు మోతాదు మూ.వ గ్రా	కీటకనాశిని రూప నీరు మి.లీ లీ	కోయుటకు	ఆఖరిసారి చల్లిన పిదప పంటనేవి యుండవలసిన కాలం
వరి	దోమపాటు లేక నుడి తెగులు	500	1250	500-1000	-
	పచ్చ తీపపు పురుగు	250	625	500-1000	-
	లేక పచ్చదోమ				
	ఆకు చుట్టు పురుగు	250	625	500-1000	-
	నాము				
	తెల్ల కంకి లేక	250	1250	500-1000	-
	కాండం తొల్చేపురుగు	500	1250	500-1000	-
మొక్కజొన్న	కాండం తొల్చు పురుగు	250	625	500-1000	-
బఠాణి	ఆకుతొల్చు పురుగు	400	1000	500-1000	-
ప్రత్తి	బాగాకు లద్దెపురుగు	450-800	1125-2000**	500-1000	-
	పేనుబంక	175	437	500-1000	-
	పచ్చదోమ	175	467	500-1000	-
	బూజిన రంగు ముక్కుపురుగు	500	1250	500-1000	-
	మచ్చల కాయ దొల్చుపురుగు	450-800	1125-2000**	500-1000	-
	గులాబిరంగు కాయదొల్చుపురుగు	500	2000	500-1000	-
	తామర పురుగు	175	437	500-1000	-
	తెల్లదోమ	200	500	500-1000	-

★ మొలవిన 7-14 రోజుల తరువాత తక్కువ మోతాదు. విత్తన శుద్ధికి చాళ్ళలో వేసేందుకు ఎక్కువ మోతాదు.

★ ఒకటి మరియు రెండవ దశలో యున్న క్రిములకు తక్కువ మోతాదు 3 లేక 4వ దశలో ఎక్కువ మోతాది.

మోతాదు నిర్ణయించేందుకు ఆధారం:

కావలసిన 36% ఎస్.ఎల్. / క్రిమినాశిని = 100Xమూ.వ. / సాంద్రత X కీటకనాశిని% = 100Xమూ.వ. / 1.11X36

చల్లెందుకు పరికరాలు: చేతిపంపు, ఫుట్ స్ప్రేయరు, కంప్రెషన్ నాప్‌సాక్ స్ప్రేయరు, బాటరీతో నడిచే కంప్రషన్ స్ప్రేయరు ఏస్పీ పవర్ స్ప్రేయరు. విషప్రయోగ లక్షణాలు: ప్రారంభంలో అన్నీ లేక ఏటిలో కొన్ని లక్షణాలు కన్పిస్తాయి. తలనొప్పి, తలతిరగడం, వికారం, వాంతులు, వెజ్జేచూపు, చెమటలు కారటం, నోంగ కారటం, మరగ కక్కటం. ప్రథమ చికిత్స: 1. 5% సోడియం బైకార్బొనేట్ యిచ్చి మింగిన విషాన్ని కక్కించి, కడుపును కడగాలి. 2. సెలైన్‌తో చర్మాన్ని మరియు కండ్లను బాగా కడగాలి. మందులతో చికిత్స: 1. రోగికి ఎట్రాపిన్ యివ్వాలి. వెంటనే ఎట్రాపిన్ యిచ్చి రక్తంలో దాని శాతం పెరిగేటట్లు చూడాలి. 2-4 మి.గ్రా మోతాదులు, మరల మరల ప్రతి 5 నుండి 10 మినుషాలకు ఒకసారి, యింజెక్షన్ గంటలతరబడి చేయాలి. విషలక్షణాల తీవ్రతను అనుసరించి యింకా ఎక్కువ ఎట్రాపిన్ చికిత్సయొక్క అవసరాన్ని నిర్ణయించాలి. 25-50 గ్రా ఎట్రాపిన్ ఒకరోజుకు యివ్వాల్సి వుంటుంది. నోంగ లేక నురుగు కక్కే తీవ్రత మోతాదును నిర్ణయించేందుకు ఉపయోగపడవచ్చును. 2. 1-2 గ్రా. 2 పి.ఎ.ఎమ్‌ను 10 మి.లీ డిస్టిల్డ్ వాటర్‌లో కరిగించి, 10-15 నిముషములు వ్యవధి తీసుకొని నిదానంగా రక్తనాళాలలోనికి ఇంజెక్షన్ యివ్వాలి. నిలువచేయు పద్ధతి. 1. కీటకనాశిని నిలువచేసేందుకు, దృఢమైన నిర్మాణం కలిగి, పాడియుండి, గాలి వెలుతురు ధారాళంగలిగించే, విశాలమైన, వెలువడే విషవాయువులవలన కలుషితంకానంత ఏర్పాటైన గోదాములను ఎన్నుకోవాలి. 2. కీటకనాశిని ప్యాకేజింగులను ఇతర సామాగ్రి వుంచే, గదులకు భవనాలకు దూరంగా, ముఖ్యంగా ఆహారపదార్థాలకు, పశుగ్రాసాలకు దూరంగా, ప్రత్యేకమైన తాళం వేసేందుకు వీలుగల అల్మారాలలో నిల్వచేయాలి. పాత్రల నిర్మూలన: 1. ప్యాకేజింగులను, మిగిలిన విషపదార్థాలను పరికరములు, కడుగగా వచ్చిన నీటిని జనావాసాలకు దూరంగా, క్షేమకరమైన రీతిలో నిర్మూలించండి. 2. కీటకనాశి నింపివిచ్చిన పాత్రలను యితర అవసరాలకు వాడరాదు. 3. ప్యాకేజింగ్‌లను పగులగొట్టి జనావాసాలకు దూరంగా పాతిపెట్టండి. వాడేవారు పాటించవలసిన ముందు జాగ్రత్తలు: 1. కీటకనాశిని పీల్చటం, నీటిలో కలిసేటప్పుడు, చింది చర్మంపై పడకుండా చూడండి. ఒట్టి చేతులతో కలపవద్దు. 2. మందు చల్లే వ్యక్తి ఆపాదమస్తకం రక్షణ దుస్తులు ధరించాలి. రబ్బరు బూట్లు, చేతితొడుగులు, ముఖకవచం, తలపై ముసుగు, ముందుభాగానికి రబ్బరు బట్ట ధరించాలి. 3. సిఫారసు చేయబడిన ఎక్కువ మేతాదులలో మందును, నీరుకలుపకుండా లేక అతిక్కువ నీటితో చల్లే పరికరాలతో చల్లటం అతి ప్రమాదకరం.

రసాయనిక మిశ్రణము -

మోనోక్రోటోఫాస్ టెక్నీ. (68% భా/భా స.ప. ఆధారిత)	53% భా/భా
సాల్వెంట్ (స్క్లోహెక్సానోన్)	47% భా/భా
మొత్తం	100% భా/భా

सनक्रॉन

मोनोक्रोटोफोस ३६% एस.एल. (कीटकनाशक)

चेतावनी : इस लेबल /हस्तपत्रिका मे दी गई फसलो के अलावा अन्य कोईभी फसल पर इसका उपयोग ना करें ।

परिचय- यह एक मोनोक्रोटोफास टेक्निकल से बनायी गीयी पानी में घुलन शील कीटनाशक हैं। जो कि स्पर्श करने तथा शरीर के अन्द जाने पर असर करती है।

उपयोग की मालासं :

फसल	कीटो के सामान्य नाम	स.त. (ब्रम.%)	साला/हेक्टर संरचना (मिली.)	पानी की मात्रा (ली.)	आखिरी स्पे तथा फसल काटने में अन्तर (दिन)
खाधाच					
धान	भूरा पौध का फुदका	५००	१२५०	५००-१०००	-
	हरी पत्ती का फुदका	२५०	६२५	५००-१०००	-
	पत्ता मोडक/पत्ता	२५०	६२५	५००-१०००	-
	लेपटक पीला ताना छेदक	५००	१२५०	५००-१०००	-
मक्का	तना मक्खी	२५०	६२५	५००-१०००	-
दालें					
मटर	पत्ती सुरंगी कीट	५००	१०००	५००-१०००	-
कपास	अमरीकी डोडें की सुंडी	४५०-८००	११२५-२०००✻✻	५००-१०००	-
	माहू	१६५	४३७	५००-१०००	-
	पत्ती का फुदका	१६५	४३७	५००-१०००	-
	भूरा धुल	८००	२०००	५००-१०००	-
	चितीदार डोडे की सुंडी	१६५	४३५	५००-१०००	-
	गुलाबी डोडे की सुंडी	४५०-८००	११२५-२०००✻✻	५००-१०००	-
	चुरदा	१६५	४३७	५००-१०००	-
	सफेद मक्खी	२००	५००	५००-१०००	-

✻ कीटनाशक की निम्न मात्रा अंकुरण के ७-१४ दिन बाद तथा उच्च मात्रा बोते समय बीज उपचार के लिये ।

✻✻ कीटनाशक की निम्न मात्रा पहले एवं दूसरे तथा उच्च मात्रा तीसरे तथा जौथी लार्वा की हालत में ।

फारमूला -

संरचाना की मात्रा म.त.१००
आ.घनत्व (१.११)३६

प्रयोग में आने वाले यंत्र : नैपसेक स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, कम्प्रेशन नैपसेक स्प्रेयर, काम्प्रेशन नैपसेक बैटरी स्प्रेयर, और ए.एस. पी. ई.ई. एच.टी.पी. पावर स्प्रेयर आदि। विषके लक्षण: सिर दर्द, सिर चकराना, भ्रमि, मितली, उल्टी, नजर का धुंधलापन, पसीना आना, आंख की पुतलियों का सिकुडना, अधिक आंसू आना, और लार टपकना आदि प्रारम्भिक लक्षण हैं। प्रथमिक चिकित्सा : १. मैस्ट्रिक लवेज के साथ ५%सोडियम बाई कार्बोनेट से आमाशय की सफाई की जा सकती हैं। २. दूषित त्वचा को धो डालिये और आंखों को नमक मिले पानी में धो डालें। औषधि चिकित्सा : १. रोगी को तुरन्त एट्रोपीन की खुराक दें और दो-चार मि ग्राम. एट्रोपीन १० से १५ मिनट बाद लगातार घन्टों तक एट्रोपीन का पूर्ण एलाज करें। जहर के लक्षण के हिसाब से एट्रोपीन का एलाज करें ज्यादा से ज्यादा २५-५० मि.ग्रा. एट्रोपीन की जसरत एक दिन में पड़ सकती है। मुंह से आने वाली लार की मात्रा से एट्रोपीन की मात्रा घटाई बढ़ाई जा सकती है। २. १-२ ग्राम २ पी.ए.एम. को १० मि.ली. आयुत पानी में मिलाकर रोगी की नस में बहुत धीरे धीरे १०-१५ मिनट में इन्जक्शन लगाना चाहिये। संग्रह : १. जिस कमरे या जगह में कीटनाशक को रखना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, हवादार, प्रकाशमय तथा पर्याप्त लम्बा चौड़ा होना चाहिये। जिससे भाप से प्रदूषण होने का भय न हो। २. कीटनाशक रखे हुये डिब्बे आणि को ऐसे कमरे या ऐसी जगह जो अन्य वस्तुओं के रखे जाने वाले कमरे या जगह से दी हो। २. कीटनाशक रखे हुये डिब्बे आदि को ऐसे कमरे या ऐसी जगह जो अन्य वस्तुओं के रखे जाने वाले कमरे या जगह से दी हो, कमरे या अलमारी में ताला बन्द कर रखना चाहिये। अलमारी या कमरे के बारे में कीटनाशक की मात्रा और गुण के अनुसार निर्णय करना चाहिये। डिब्बों व साधनों के धोबन का निपटारा : १. खाली डिब्बों को अच्छी तरह तो इफोड़ कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिये। २. दुबारा प्रयोग मे आने वाले डिब्बों को बाहर खुला न छोड़े। ३. डिब्बों या बची हुई कीटनाशक तथा साधनों के धोवन को इस प्रकार निपटाना चाहिये जिससे आस पास की चीजें या पानी विषैला न हो जायें। प्रयोग करने वालों के लिये सावदानियाँ :१. घोलबनाते समय इसे सासो में न जाने दीजिये। और न ही शरीर से स्पर्श होने दीजिये। २. प्रयोग कर्ता की पूरे बचाव के कपड़े पहनने चाहिये। इस रबर के सास्ताने, जूते और मुंह ढकने का ढ़ाल या धूल से बचाव का नकाब (मखौटा) और एक सारे शरीर को ढकने ताला कपड़ा यर रबड़ का एप्रेन, कन्टोप,या है शामिल है। ३. बहुते सध्य कीटनाशक का प्रयोग निम्न अथवा बहुत निम्न आयतन वाले यंत्रों से नहीं करना चाहिये क्यों कि इन पेंत्रों का प्रयोग खतरनाक साबित हो सकता हैं।

रासायनिक संघटन :

मोनोक्रोटोफास टेक्निकल (भार के हिसाबसे ६८% स.त. पर आधारित)	५३% भार/भार
घोलक (स्योक्लोहेक्सानोन)	४७% भार/भार
कुल	१००% भार/भार

SUNCRON

MONOCROTOPHOS 36% SL INSECTICIDES

సన్‌క్రాన్

మోనోక్రోటోఫాస్ 36% ఎస్.ఎల్. (కీటకనాశని)

सनक्रॉन

मोनोक्रोटोफोस 36% एस.एल. (कीटकनाशक)

ಮೋನೋಕ್ರೋಟೋಫಾಸ್ 36% ಎಸ್.ಎಲ್. (ಕೀಟನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

విష
ज़हर
विषमु
POISON
RED

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by :

Aegis™
Agro Chemicals India Private Limited

237, Main Road, Mallepally (V),
Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295. Telangana State.
Customer Care Manager No. +91 8498099536
Email: aegisagrochemicals@gmail.com / www.aegisagro.com

Mfg Licence No: 019/TS-IML/2016
Reg.No.: CIR-112225/2014-Monocrotopos (SL) (345)-24

For Agriculture use only. केवल कृषि उपयोग के लिए।