

SUNMIRE IMIDACLOPRID 70% WG INSECTICIDE

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".
Imidacloprid 70% WG is recommended for the control of sucking pests Viz Jassids, Aphids and Thrips in cotton and Brown Plant hoppers and white backed plant hoppers in rice.

Recommendation

Crop(s)	Common Name of pest	Dosages per Hectare		Waiting Period (in days)
		A.I. (gm)	Formulation (gm)	
Cotton	Jassids, Aphids, Thrips	21-24.5	30-35	375-500
Cucumber	Aphid, Jassid	24.5	35	500
Rice	Brown Plant hopper	21-24.5	30-35	300-375
Okra	Jassid, Aphid, Thrips	21-24.5	30-35	375-500

Direction of Use

Spray with hand operated Knapsack sprayer.

Compatibility: It is compatible with generally used fungicides, insecticides and urea.

Precaution:

Poisonous, Handle with care, Do not touch or inhale the contents while handling the contents use rubber gloves and face mask.

Symptoms of Poisoning

Apathy, Myatonia, Tremor, Difficult breathing and Myospasms.

FirstAid:

If the product gets into the eyes, rinse it out immediately with plenty of water. In case of poisoning measure blood pressure and pulse rate frequently. Since bradycardia and drop in blood pressure may occur, artificial breathing and heart action are recommended. Eliminate the active ingredient through gastric lavage and saline laxative. In case of skin contamination, wash with soap and water.

Antidote: There is no known specific antidote. Follow attached directions. Treat symptomatically.

Disposal of used container:

1. The packages shall be broken and buried away from habitation. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages or surplus material and washing should be disposed off in safe manner as to prevent environment or water pollution.

Storage Conditions:

1. The packages containing the insecticides shall be stored in suppurate rooms or premises, away from the rooms or premises used for storing other articles of shall be kept in separate armories under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticides.

2. The rooms or premises meant for storing the insecticides shall be well built well lit, dark well ventilated and of sufficient diminutions to avoid contamination with water vapor.

Chemical Composition:

Imidacloprid (Active Ingredient)	70.00% w/w
Lignosulfonic acid, sodium salt	Q.S.
Total	100.00% w/w

సన్మైర్ ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 70% డబ్ల్యు.జి.

హెచ్చరిక : అత్యధిక కనీసములో పేర్కొన్న సైట్లపై ఈ మందు ఉపయోగించవద్దు. మిగతా సైట్లపై ఉపయోగించరాదు. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 75% నీటిలో కరుగు గుళికల రూపములో లభించును. పచ్చదోమ లేక పచ్చదీప్తుపురుగులు, పేనుబంక మరియు అకుస్త ముడుతకు కారణమగు త్రిప్స్ ప్రత్తి పంటలో రసముపీల్చు పురుగుల నివారణకు, వరిలో దోమపాటు లేక గోధుమ రంగు దుబుబ్బు దోమ మరియు మెన్నుపై తెల్ల రంగుగుల దుబ్బుదోమల నివారణకు సిఫారసు చేయబడినది. సిఫారసులు:

పేరు	కీటకముల సాధారణ నామము (గ్రా.)	సాధారణ నామము మూ.ప (గ్రా.)	సీక్వారుకు మోతాదు (గ్రా.)	పంట	కోయిటుకు ఆగవలసిన కాలం రోజులు
ప్రత్తి	పచ్చదోమ, పేనుబంక, తామర పురుగులు	21-24.5	30-35	375-500	7
దోసకాయ వరి	పేనుబంక, పచ్చదోమ	24.5	35	500	5
బెండ	గోధుమరంగు సుడిదోమ, పచ్చదోమ, పేనుబంక, తామరపురుగులు	21-24.5	30-35	375-500	3

ఉపయోగించుటకు సూచనలు:

సమాన వత్తిడితో నీటిని విడుదలచేయు, చేతి పంపులను వాడండి. సాధారణంగా వినియోగించబడని శిలీంధ్రనాశనాలతోనూ, కీటకనాశనాలతోనూ పరిచయం యూరియోతేను అనుగుణంకలిగియున్నది.

ముందు జాగ్రత్తలు:

విషపూరితమైనది, బహుజాగ్రత్తగా చల్లండి, మందువల్ల సమయంలో, ఒళ్ళి చేతులతో తాకటం లేదా చర్మంపై పడనియటం, వాసనచూడటం నివ్వడం. రబ్బరు చేతోడుగులు మరియు ముఖమునకు రక్షణ ఆచార్యన ధరించాలి.

విషప్రయోగ లక్షణములు:

ఉదాసీనత లేక మానసిక స్తబ్ధత, వణుకుడు, మయబోనియా, కష్టంగా ఊపిరి పీల్చటం మిడిగుడ్డు, చూపు తగ్గిపావటం.

ప్రథమ వికేత్య: విషము కండ్లలో పడినపుడు ఎక్కువ నీటిలో కండ్లను బాగా కడగండి.

విషప్రయోగం జరిగినపుడు రక్తపోటును, వాడిని పరీక్షించాలి. గుండె తక్కువగా కొట్టుకోవటం, రక్తపోటు తగ్గిపావటం సంభవించవచ్చును. కృత్రిమ శ్వాస మరియు గుండె కొట్టుకునేందుకు శ్వాసలీన చర్యలు చేపట్టాలి. కడుపును బాగా కడిగి, పాట్లోగల విషాన్ని, సెలైన్ ద్వారా విరేచన కారిన యిప్పి బయటకు రప్పించాలి. చర్మంపై పడిన విషాన్ని సబ్బునీటితో బాగా కడగాలి.

విరుగుడు : ప్రత్యేకమైన తెలిసిన విరుగుడంటూ ఏమీ లేదు. లక్షణాల ప్రకారము వికీర్ణా చేయాలి.

నిలువ చేయు పద్ధతి: 1. కీటకనాశనిగల ప్యాకేజీలను, జనావాసాలకు దూరంగా, ఇతర వస్తువులు, పదార్థాలు నిలువ చేయుటకు ఉపయోగించుగడంలో గాక, వేరే గదులలో వుంచాలి. కీటకనాశని విలువ, దాని విషి తీవ్రత మరియు పరిమాణమును బట్టి అల్పకాలలో తాళంవేసి భద్రపరచాలి.

2. కీటక నాశని నిల్వకు నిర్దేశించిన గదులు, లేక భవనములు విశాలంగా దృఢమైన కట్టుబడికలిగి, పాడిగాయిండి గాలి వెలుతురు ధారాళంగా ప్రసరించేటట్లు వుండాలి. కీటకనాశని నుండి వెలువడి విషవాయువులు వాతావరణ కలుషితం చేయకుండా జాగ్రత్త వహించాలి.

ప్యాకేజీను వాడిన పెట్టెలు, డబ్బాలు మరియు పరికరములను పాత్రలను కడుగుటకు వాడిన నీటిని, చల్లగా మిగిలిన కీటకనాశనులను నాశనం చేయుట:

ప్యాకేజీలను పగులకొట్టి జనావాసాలకు దూరంగా లోతుగా పాతిపెట్టాలి. ఖాళీ డబ్బాలను తిరిగి ఉపయోగించే విధంగా పారవేయకూడదు. వాతావరణము నీటి వసరులు కలుషితం కాని రీతిలో, మిగిలిన విషపదార్థాలను, పరికరాల పాత్రల కడుగుగా వచ్చిన నీటిని, హానికలుగని విధంగా నిర్మూలించాలి.

రసాయనిక సమ్మేళనం:

ఇమిడాక్లోప్రిడ్ (మూల పదార్థము)	70%	భారము/భారము
లిగ్నోసల్ఫ్యూనిక్ ఆమ్లము మొక్క, సోడియం సాల్ఫ్		మిగిలినది
మొత్తం	100%	భారము/భారము

सनमायर इमिडाक्लोप्रिड 70 प्रतिशत डब्ल्यू.जी. कीटनाशक

चेतावनी : इस लेबल/हस्तपत्रिका में दी गई फसलों के अलावा अन्य कोई भी फसल पर इसका उपयोग ना करें।
इमिडाक्लोप्रिड 70 प्रतिशत डब्ल्यू.जी. का उपयोग कपास में आनेवाले चूसक किटों जैसे माहू, तेला, चूरदा तथा धान में आनेवाले भूरे पीठ और सफेद पीठ के फूँदको की रोकथाम के लिए किया जाता है।

उपयोग:

फसल	कीट के नाम	सं. तत्व (ग्राम)	संरचना (ग्राम)	पानी की (लि.)	अंतिम छिड़काव (दिन में)
कपास	जैसिड्स, एफिड्स, थ्रिप्स	२१-२४.५	३०-३५	३७५-५००	७
ककड़ी	एफिड, जसिड	२४.५	३५	५००	५
राइस	ब्राउन प्लांट हॉपर	२१-२४.५	३०-३५	३००-३७५	७
ओकरा	जसिड, एफिड, थ्रिप्स	२१-२४.५	३०-३५	३७५-५००	३

उपयोग के लिये निर्देश

हाथ से चलने वाले नैपसेक स्प्रेयर का प्रयोग करें।

मिश्रणशीलता:

यह आम प्रयोग में आने वाले कीटनाशकों, फूँदनाशकों तथा युरिया खाद के साथ मिलाकर स्प्रे किया जा सकता है।

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियां:

जहरीला। रखने में सावधानी बरतें। इसे न तो छुएँ और न ही सास से भीतर जाने दीजिये। रसायन के रखने में खर के दरताने और मुखौटा इस्तमाल करें। विष के लक्षण दिखने पर तुरन्त डाक्टर को बुलायें।

विष के लक्षण:

विरक्त, मायटोनिया, कॅंपकॅपी, श्वास लेने में कठिनाई और मयोस्पार्सम।

प्राथमिक चिकित्सा:

यदि कीटनाशक आखों में गया है तो आखों को तुरंत पानी से धो लें। विष बाधा की अवस्था में लगातार रक्त दाब एवं नाडी परीक्षण करते रहे। रक्त दाब का गिरना एवं ब्रेडिकार्डिया की संभावना होने के कारण कृत्रिम श्वसन एवं हृदय क्रिया को बनाय रखना आवश्यक है। अमाशय में गए विष को अमाशय की ध्युलाई एवं क्षारीय विरेचनक के माध्यम से शरीर से बाहर निकालें। त्वचा दूषित होने पर साबुन, पानी से धोएँ।

विष नाशक :

कोइ विशिष्ट विषनिवारक ज्ञात नहीं है। संलग्न आदेशों का पालन कीजिए। लक्षानुसार उपचार करें।

खाली डिब्बों का निपटारा :

१. खाली डिब्बों को जानवरों तथा इन्सान के रहने वाली जगह से दूर नष्ट करें तथा जमीन में गाड़ दीजिये।

२. खाली डिब्बों को बाहर न रखिय ताकि दुबारा इस्तमाल न हो सके।

३. डिब्बा, बचे हुए कीटनाशक तथाघावन को सावधानी से एक तरफ फेंके ताकि वातावरण या पानी दूषित न हो।

संग्रहण की शर्तें:

१. कीटनाशक के डिब्बे को अलग कमरें में तथा अन्य खाद्य पदार्थों के रखने वाली जगह से दूर तालाबंद स्थान पर रखीय।

२. कीटनाशक रखनेवाला कमरा या जगह सूखी, हवादार, मजबूत बनावट रोशनीदार तथा बड़े आकार वाली होनी चाहिए ताकि हवा दूषित न हो।

रसायनिक संरचना:

इमिडाक्लोप्रिड सक्रिय तत्व	७०.००%	भार भार
लिग्नोसल्फोनिक ऑसिड, सोडियम सॉल्ट		प्रयास मात्रा
योग	१००.०%	भार भार

SUNMIRE IMIDACLOPRID 70% WG INSECTICIDE

సన్మైర్ ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 70% డబ్ల్యు.జి. కీటకనాశని

सनमायर इमिडाक्लोप्रिड 70% प्रतिशत डब्ल्यू.जी. कीटनाशक सन्मैर ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 70% ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಜಿ ಕೀಟನಾಶಕ

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.
बच्चों से दूर रखिए।
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.



READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరచిత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.
इस्तेमाल करने से पहले सारी पचाँ पूरी तरह पढ़िये।

Manufactured & Marketed by :



237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295. Telangana State.
Customer Care Manager No. +91 8498099536

Email: aegisagrochemicals@gmail.com / www.aegisagro.com

Mfg Licence No: 019/TS-IML/2016

Regn. No.: CIR-112323/2014-Imidacloprid (WG) (345)-149

For Agriculture use only. केवल कृषि उपयोग के लिए।



