SUNMIDA

IMIDACLOPRID -17.8% SL

(SYSTEMIC INSECTICIDE)

Imidacloprid 17.8% SL is a Systemic Insecticide containing Imidacloprid active ingredient balance auxiliaries and inert material. It is used as a spray for the control of sucking and other insects in different crops.

Recommendation :

Crop	Common Name of the Pest	A.I. (Kg.)	Dosage per Hectare Formu-lation (ltr.)	Dilution in water (Ltr)	Waiting Period last application & harvest (days)
Grapes	Flea bettle	0.06-0.08	0.300-0.400	1000	32
Mango	Hopper	0.4-0.8g/tree	2-4 ml/tree	10 Litre	45
Cotton	Aphid,whitefly Jassid,Thrips	0.020-0.025	0.10-0.125	500-700	40
Sugarcane	Termite	0.07	0.35	1875	45
Tomato	White fly	0.03-0.035	0.150-0.175	500	3
Paddy	BPH, WBPH, G L H	0.020-0.025	0.10-0.125	500-700	40
Citrus	Leaf miner, psylla	0.01%	0.05%	-	15
Okra	Aphids, jassid, whitefly	0.020	0.10	500	3
Chilli	Jassid, Aphid Thrips	0.025-0.05	0.125-0.125	500-700	40
Groundnut	Aphid, Jassid	0.025-0.05	0.125-0.125	500-700	40
Sunflower	Jassid, Thrips, whitefly	0.020	0.10	500	30

Direction of use :

Plant Protection Equipment : Hand operated knapsack sprayer or foot sprayer is recommended and tractor mounted sprayer can also be used.

Precaution : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed. 2. Avoid contact with eyes, mouth and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and part of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of Poisoning : Apathy, myotonic. tremor, difficult breathing, myospasms occur.

FIRST AID : 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient unconscious. 2. If clothing and skin is contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

PHYTOTOXICITY : The product is not Phytotoxic when used as per field recommendation.

Antidote: No specific antidote. Treat symptomatically.

Disposal Of Used Container : 1. The packages shall be broken and buried away from habitation. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages or surplus material and washing should be disposed in a safe manner so as to prevent environment or water pollution.

Storage Conditions : 1) The package containing the insecticide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for stored other articles shall be kept in separate Almirahs under lock and key, depending on the quantity and nature of insecticides 2) The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, and well lit and ventilated and sufficient dimensions to avoid contamination with vapour.

CHEMICAL COMPOSITION :

Imidacloprid Tech (Based on 100% w/w a.i.)	17.80 % w/w
(Blend of Anonic and non ionic)	
Non Ionic Emulsifier	2.50% w/w
(Etheoxylated alkyl aryl phenol derivative)	
Polyvinyl Pyrrolidone - Copolymer.	1.00 % w/w
Dimethyl Sulfoxide	38.50% w/w
N-Methyl Pyrrolidone	Q.S.
Total	100.00 % w/w

Caution: Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

సన్‌మిడా

ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 17.8% ఎస్.ఎల్ (అంతర్వాహిక కీటకనాశిని)

ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 17.8% ఎస్.ఎల్ 1-(6-క్లోరో-3-పైరిడి ఐమిథైల్)-ఎన్-నైట్రో ఇమిడా జోలిడిన్ 2థైల్-ఇడినియామైన్ అనే రసాయనం ఆధారిత కీటకనాశిని. దీని సాధారణ నామం ఇమిడాక్లోప్రిడ్ . దీనిలో 17.8% భా/భా ఇమిడాక్లోప్రిడ్ మూలపదార్థం ఉన్నది.

సిఫారసులు:

పైరు	కీటకముల వాడుక పేర్లు	హెక్టారుకు మోతాదు మూల పదార్థము (గ్రా.)	హెక్టారు చల్లుటకు (గ్రా.)	నీటి పరిమాణం (లి.)	ఆఖరి సారిచల్లిన పిదప పంట కోతకు వేచి వుండవలసిన కాలం (రోజులు)
ద్రాక్ష	ఫ్లీ బిటల్	0.06-0.08	0.300-0.400	1000	32
మామిడి	తేనెమంచు	0.4-0.8 గ్రా. ప్రతి చెట్టుకు	2-4గ్రా. ప్రతి చెట్టుకు	10 లి	45
ప్రత్తి	పేనుబంక, తెల్లదోమ పచ్చదోమ	0.020-0.25	0.10-0.125	500-700	40
చెఱకు	చెదపురుగులు	0.07 (వాళ్ళలో విత్తనపు ముక్కలపై చల్లి మట్టితో కప్పండి)	0.650	1875	75
టమాట	తెల్లదోమ	0.03-0.035	0.150-0.175	500	3
వరి	నుడితెగులు, దోమపాటు పచ్చదోమ,గోధు చ్ఛుప్పు దోమ	0.020-0.25	0.10-0.125	700-700	40
నిమ్మ	ఆకుముడత, సైల్లా	0.01%	0.05%	-	15
బెండజాతి	పేనుబంక,తెల్లదోమ, పచ్చదోమ	0.020	0.10	500	3
మిరప	పచ్చదోమ, పేనుబంక, ఆకుపైకి ముడత	0.020-0.25	0.10-0.125	700-700	40
వేరుశనగ	పచ్చదోమ, పేనుబంక	0.02-0.025	0.1-0.25	500	40
ప్రొద్దు తిరుగుడు	పేనుబంక,పచ్చదోమ తెల్లదోమ,	0.020	0.10	500	30

ఉపయోగించుటకు సూచనలు : సస్యరక్షణ పరికరములు: బకెట్ స్ప్రేయర్, కాలితోతొక్కు స్ప్రేయర్, నాప్‌శాక్ చేతిపంపు, బాటరీతోనడచు ఆస్పీ నాప్‌శాక్ స్ప్రేయరు, పవర్ స్ప్రేయర్ వంటివి వాడవచ్చును. ట్రాక్టర్ స్ప్రేయర్‌ను కూడా వుపయోగించవచ్చును.

ముందు జాగ్రత్తలు: 1. పిల్లలకు అందనివోట వుంచండి. చర్మంపైన, కండ్లలోను మరియు బట్టలపై పడనియకండి. 2. మందువల్లే సమయంలో తినటం, పాగిపీల్చటం లేదా పానియములు సేవించటం నిషిద్ధం. 3. చేతులను, ముఖాన్ని బాగా సబ్బుతో కడుకొన్న పిదప పై వాటిని తీసుకోండి. 3. మందువల్లే సమయంలో చేతి తొడుగులు, బూట్లు, శరీరంఆరికి ముందు భాగానికి ఆచ్ఛాదన, కండ్ల జోడులేక ముఖ కవచం వంటి సరియైన రక్షణ దుస్తులను ధరించండి. 4. మందువల్లటం పూర్తి అయిన పిదప స్ప్రేయర్లు, బకెట్లు మరియు యితర పాత్రలను ప్రతిరోజూ బాగా సిటితో శుభ్రపరచండి. 5.ఎనిపూర్తి అయిన వెంటనే దుస్తులు తీసివేయాలి. సబ్బుతో చక్కగా స్నానం చేయాలి. 6.ఎస్తులను శుభ్రంగా వుతకాలి మిగిలిన పదార్థాలవల్ల కుంటలు, చెరువులు, వాగులు, కాలువలు వంటి సిటివనరులు కలుషితం కాకుండా జాగ్రత్తపడండి.

విషతుల్యత : ఈ రంగంలో అనేది సిఫారసు చేసిన విధంగా వాడినట్లయితే హానికరం కాదు.

విషలక్షణాలు: ఉదాసీనత లేక మానసిక ఆందోళన, వెఱ్ఱిమూపు, చలుకుడు, ఊపిరి పీల్చటంలో యిబ్బంది. మూర్ఛ, వికారము, దోకులు లేక వాంతులు తలనొప్పి.

ప్రథమ చికిత్స: కండ్లలో కీటకనాశిని పడినప్పుడు, వెంటనే ఎక్కువ సిటితో కడగండి. విషప్రయోగం జరిగినట్లు నిర్ధారణ అయినప్పుడు, రక్తపాటును మరియు నాడిని పరిసీలన, గుండెనిదానంగా కొట్టుకోవటం మరియు రక్తపాటు పడిపోవటం సంభవించవచ్చును కృత్రిమ శ్వాస మరియు గుండెకు చక్కగా కొట్టుకొనే ప్రక్రియ చేపట్టాలి. లోనికి మ్రింగిన కీటకనాశినిని ఉప్పుసిటిని త్రాగించి ఉపయోగించి బయటకు రప్పించాలి.

మందులతో చికిత్స: విషలక్షణలను బట్టి మందలు ఇవ్వాలి.

నిల్వచేయుట: కీటకనాశినిని కలిగియున్న ప్యాకింగ్‌ను, యితర పదార్థములు ముఖ్యంగా నిలువచేసే ఆహార పదార్థములను గదులు లేక ఆవరణ నుండి దూరంగా నిలువచేయాలి. కీటకనాశిని నాణ్యత మరియు విలువనుబట్టి, తాళం వేయుటకు అనువైన అల్మారాలలో వుంచాలి. గోదాములుగా వాడే గుదులు, ఆవరణ పటిష్టమైన నిర్మాణంతో, గాలి వెలుతురు ధారాళంగా ప్రసరించే, పొడి ప్రదేశంగా వుండాలి. గదుల వైశాల్యం, కీటకనాశిని నుండి విడుదల అయ్యే విష ఆవిరులు వలన వాతావరణం కలుషితం కానంతర విశాలంగా వుండాలి.

ప్యాకింగ్‌ను వాడిన పెట్టెలు, డబ్బాలు మరియు పరికరములను పాత్రలను కడుగుటకు వాడిన నీటిని, చల్లగా మిగిలిన కీటకనాశనులను నాశనం చేయుట: ప్యాకింగ్‌లను పగులకొట్టి జనావాసాలకు దూరంగా లోతుగా పాతిపెట్టాలి. ఖాళీ డబ్బాలను తిరిగి ఉపయోగించే విధంగా పారవేయకూడదు. వాతావరణము నీటి వనరులు కలుషితం కాని రీతిలో, మిగిలిన విష పదార్థాలను, పరికరాలు పాత్రలు కడుగగా వచ్చిన నీటిని, హానికలుగని విధంగా నిర్మూలించాలి.

రసాయనిక మిశ్రమం:

ఇమిడాక్స్‌ప్రిడ్ మూలపదార్థం (100% భా/భా స్వచ్ఛత)	17.80% భా/భా
అయానిక్/నాన్ అయానికం ఎమల్సిఫయర్స్ మిశ్రమం)	
అయానికం ఎమల్సిఫయరం (ఎథియొక్సిలేటెడం ఆల్కైల్ ఎరైల్ ఫినాల్ డిరవేటివ్)	2.50% భా/భా
పాలివినైల్ పెర్రోలిడోన్-కోపాలైమర్	1.00% భా/భా
డైమిథైల్ సల్ఫాక్సైడ్	38.50% భా/భా
ఎన్-మిథైల్ పైర్రోలిడోన్	చాలినంత
మొత్తం	100.00% భా/భా

హెచ్చరిక : ఈ జతపరచిన లేబల్/కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపైనే ఈ మందును ఉపయోగించవలెను. మిగతాపైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

सनमिडा

इमिडैक्लोप्रिड १७.८% एस एल (व्यवस्थित कीटनाशक)

इस कीटनाशक का उपयोग विभिन्न प्रकार के चूसके कीटों व अन्य महत्वपूर्ण कीटों की रोकथाम के लिए विभिन्न फसलों पर किया जाता है।

सिफारिशें:

फसल	नाशिकीट के सामान्य नाम	ए.आई. (किलो)	प्रति हैक्टर मात्रा सूत्रीकरण ली.में.	पानी में घोल (लिटर)	छिडकाव व फसल के बीच मध्यांतर (दिनों में)
अंगूर	फलिया बीटल	0.०६-0.०८	0.३००-0.४००	१०००	३२
आम	हॉपर	0.४-0.८	२-४ मि.लि वृक्ष	१० लिटर	६४
कपास	कपास लाही,थ्रिप्स व्हाइट फ्लाइ, जैसिड	0.०२०-0.०२४	0.२०-0.१२४	४००-७००	४०
गन्ना	दीमक	0.०७	0.३५०	१८७४	६४
टमाटर	सफेद मक्खी	0.०३-0.०३४	0.१५०-0.१७४	४००	३
धान	ब्राउन प्लान्ट हॉपर हरित पत्ता, हॉपर व्हाइट बेक्ड प्लान्ट हॉपर	0.०२०-0.०२४	0.२०-0.१२४	४००-७०००	४०
नींबू	लीफ माईनर, सिल्ला	0.०१%	0.०४%	-	१४
भिण्डी	माहू, तेला, चुरदा	0.०२०	0.०२०	४००	३
मिर्च	माहू, तेला, चुरदा	0.०२०-0.०२४	0.२०-0.१२४	४००-७००	४०
मूंगफली	माहू, तेला	0.०२-0.०२४	0.१-0.२४	४००	४०
सूरजमूखी	माहू, तेला, चुरदा	0.०२०	0.०२०	४००	३०

उपयोग के लिए निर्देश:

पौध संरक्षण उपकरण: हस्त चलित नैपसेक स्प्रेयर और पौर से चलने वाला नैपसेक स्प्रेयह, ट्रेक्टर माउनटिड स्प्रेयर भी प्रयोग किया जा सकता है।

सावधानियां: १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तनों और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुंह, आँखों, त्वचा को सम्पर्क से बचायें। ३. छिडकाव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचाये। हवा की दिशा में छिडकाव करे। ४. छिडकाव के बाद दूषित कपडो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। ५. छिडकाव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नही चाहिए। ६. छिडकाव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहने।

पौध विशाल्कता : इस की बतायी गई मात्रा का प्रयोग करने पर फसल पर असर नही पडता है।

विष लक्षण: मटोनिया, सांस लेने मे कठिनाई, कंपकपी, मासंपेशियो की एठन हो सकते हैं।

प्राथमिक उपचार: १. यदि निक्षल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराए। यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपडों को उींर दे दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यधि आंखों दूषित हो जाए तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन-साफ पानी में लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ला जयें।

औषध उपचार: विष लक्षण के अनुरुप उपचार किया जाना चाहिये।

भंडारण: दवाई वाले डिब्बों को ऐसे अलग कमरे या जगह में रखना चाहिए , जहां अन्य वस्तुओं को न रखा जाता हो। दवाई वाले डिब्बों को उसके गुण और आकार के अनुसार अलग अलमारी में ताला चाबी लगाकर बंद रखे। दवाई रखे जाने वाले जगह स्थान या कमरों अच्छी तरह मजबूत एवं रोशनी वाले हवादार और समुचित आकर का होना चाहिए ताकि दवाई से निकले हुए वाष्य से दूषित न हो।

पात्रों को नष्ट करना एवं यंत्रों से निकला हुआ पानी और वचा हुआ माल को निपटाना: खाली डिब्बों को तोडकर आबादी से दूर गाड़ देना चाहिए। प्रयोग किए जा जुके डिब्बों को बाहर खुला न छोड़ियें ताकि इसका उपयोग दोबारा न हो सके। डिब्बों को और बची हुई दवा और यंत्रों को साफ करते समय बचा हुआ पानी को इस तरह नष्ट करें ताकि वातावरण और जल दूषित न हो।

रासायिनक संरचना:

इमिडैक्लोप्रिड (१००% भार भार ए. आई. पर आधारित)	:१७.८०% भार भार
ना-आयोनिक इमल्सीफायर	: २.५०% भार भार
(इथोक्सिलेटिड अल्काइल एरिल फेनोल डेरिवेटिव	
पोलिविनाइल पाइरोलिडोन -कोपोलाइमर	:१.००% भार भार
डिमेथिल सल्फोक्साइड	:३८.५०% भार भार
एन-मेथिल पाइरोलिडोन	: क्यु.एस.
कुल	: १००.००% भार भार

चेतावनी : इस लेबल/हस्तपत्रिका मे दी गई फसलो के अलावा अन्य कोईभी फसल पर इसका उपयोग ना करें।

SUNMIDA

IMIDACLOPRID -17.8% SL

(SYSTEMIC INSECTICIDE)

సన్‌మిడా

ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 17.8% ఎస్.ఎల్

(అంతర్వాహిక కీటకనాశిని)

सनमिडा

इमिडैक्लोप्रिड १७.८% एस ए

(व्यवस्थित कीटनाशक)

ಸನ್‌ಮಿಡಾ

ಇಮಿಡಾಕ್ಲೊಪ್ರಿಡ್ 17.8% ಎಸ್.ಎಲ್.

(ಅಂತರವ್ಯಾಪಿ ಕೀಟನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

ಚರಿತ ವಿಷಮು
ज़हर POISON ವಿಷ
YELLOW

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిలను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by :

Aegis™
Agro Chemicals India Private Limited

237, Main Road, Mallepally (V),
Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295. Telangana State.

Customer Care Manager No. +91 8498099536

Email: aegisagrochemicals@gmail.com / www.aegisagro.com

Mfg Licence No: 019/TS-IML/2016

Regn. No.: CIR-111290/2014-Imidacloprid (SL) (344)-105

For Agriculture use only. कवल कृषि उपयोग के लिए।

सनमिडा

इमिडाक्लोप्रिड १७.५% एस.एल.

(रचनात्मक कीटनाशक)

इमिडाक्लोप्रिड-१७.५% एस.एल. एक सिस्टेमिक कीटकनाशक आहे ज्यामध्ये इमिडाक्लोप्रिड सक्रिय घटक संतुलित सहाय्य आमि निष्क्रिय सामग्री असते. वेगवेगळ्या पिकांमधील शोषक आणि इतर कीटकांच्या नियंत्रणासाठी याचा वापर स्प्रे म्हणून केला जातो.

शिफारशी :

पीक	कीटकावे सामान्य नाव	ए.आय कीलो	प्रति हेक्टेयर मात्रा सुत्री करण (लिटर मधे)	सौम्यी करण पाण्यांत (लिटर)	प्रतिक्षा अवधि शेवटची फवारणी आणि कापणी यांत
द्राक्षे	फ्ली बेटल	०.०६-०.०८	०.३००-०.४००	१०००	३२
आंबा	टोळ	०.४-०.८ ग्रा/झाड	२-४ मि.ली/झाड	१० लिटर	४५
कपूस	ॲफिडस,जस्सीड, पांढरी माशी, थ्रिप्स,	०.०२०-०.०२५	०.१०-०.१२५	५००-७००	४०
		०.०२०-०.०२५	०.१०-०.१२५	५००-७००	४०
ऊंस	वाळवी	०.०७	०.३५०	१८७५	४५
टोमॅटो	पांढरी माशी,	०.०३-०.०३५	०.१५०-०.१७५	५००	३
तांदुळ	तपकीरा रंगाचा रोप होळ, हिरवा पणी टोळ पांढऱ्या पाठीचा रोप टोळ	०.०२०-०.०२५	०.१०-०.१२५	५००-७००	४०
निंबू	वर्गीय पानांचा खाण,	०.०१	०.०५	-	१५
ओक्रा	जस्सीड फीड, थ्रिप्स	०.०२०	०.०२०	५००	३०
मिरची	जस्सीड, एफीड थ्रिप्स	०.०२०-०.०२५	०.१०-०.१२५	५००-७००	४०
शेंगदाणा	एफीड, जॅसिड	०.०२-०.०२५	०.१-०.२५	५००	४०
सुर्यफूल	जस्सीड एफीड, थ्रिप्स	०.०२०	०.०२०	५००	३०

उपयोग के लिए निर्देश:

सावधगिरी : लहान मुलाच्या हाती लागणार नाही अशा रितीने दूर ठेवावे. त्वचा डोळे किवा कपडे यांच्याशी संपर्क टाळावा. प्रयोग करतांना खाणे पिणे अथवा धुम्रपान करू नये आणि असे करण्यापूर्वी हात आणि चेहरा धुवुन घ्यावा. योग्य असे संरक्षक कपडे साधने वापरावेत. जसे हातमोजे, पादणे, पादत्रणे, मळवस्त्र, गॉगल्स, किवा चेहरा झाकणारा, बुरखा. फवारणी पंप, बादल्या आणि अन्य भांडी वापरल्यानंतर दररोज पाण्याने स्वच्छ धुवुन ठेवावीत. हात साबणाने भरपूर पाण्याने धुवावेत आणि प्रयोग संपल्यावर कपडे बदलून टाकावेत तसेच दुषित कपडे धुवुन टाकावेत. ऊरलेले पदार्थ, ओढा, तळे, कालवे इत्यादिमधाये टाकून त्यांना संदुषित करू नयें. फवारणी साठी वापरलेली साधने भरपूर पाणी आणि डीटर्जंटच्या सहाय्याने स्वच्छ धुवुन टाकावीत, संदूषित त्वचा भरपूर पाणी वापररून धुवुन टाकावी संदूषित डोळे, भरपूर जलसिंचन करून धुवावेत दुषित कपडे रोजच्या रोजधुवावेत.

फायटोटॉक्सिसिटी : हे सल्लयानुसार वापरल्यास फायटोटॉक्सिक नाही.

विषबाधेची लक्षणे : औदासिन्य, मायटोनिया, थरकाप, श्वासोश्वास करतांना त्रास, मायोस्पासम, मळमळ, वांती होणे व डोकदुखी. इत्यादि.

प्रथमोपचार : जर कीटनाशक डो ळयांत गेले असेल तर ताबडतोब पाण्याने खळखळून बाहेर काढावे, विषबाधा झाली असल्यास रक्तदाब आणि नाडीचे ठोके वारंवार मोजावे रक्तदाब कमी होण्याची शक्यता असल्याने कृत्रिण श्वसन आणि हृदय संचलन क्रीया करण्याची शिफारस करण्यांत येते. आंत प्रवेश केलेल्या अंशाला बाहेर काठण्यासाढी जढरीय क्रिया आणि लवणीय मृदु विरेचक द्यावे.

औषधोपचार: लक्षणा वंर आधारित औषधोपचार करावेत.

संग्रहण : कीटनाशकाची पॅकेटस् ही स्वतंत्र खोल्यांमध्ये अथवा आवारांत संग्रहित करावीत ती अशा रितीने की ती नेहेमीच्या वापराच्या अन्य वस्तू पदार्थ संग्रहणाच्या खोल्या अगर आवारापासून दूर रहातील विशेषत: खाद्यपदार्थ टेवण्यासाठी वापरात येणाऱ्या. किवा कीटनाशकाचे परिमाण आणि प्रकार लक्षांत घेऊन पॅकेस वेगळया स्वतंत्र कपाटात कडीकुलुप लावून ठेवावेत. ज्या खोल्यांमध्ये अगंर आवारांत कीटनाशकाचे संग्रहण करावयाचे असेल त्या मजबूत बांधणीच्या शुष्क, प्रकाशमय हवादा आणि पुरेश्या आकारच्या असावा जेणे करून बाष्पामुळे होणारे संदुषण टाळता येईल.

डब्बे पॅकेट, साधने धुण्याने पडणारे सांडपाणी आणि अतिरिक्त पदार्थ यांची विल्हेवाट: पॅकेट्स, डब्बे यांची तोडफोड करुन त्यांना वस्तीपासून दूर अशा जमिनीत गाडून टाकावे. वापरलेले पॅकेटस दूर बाहेर असावेत जेणे करून त्यांचा पुनश्च वापर करण्यास प्रतिबंध करता येईल. पॅकेटस, अतिरिक्तित, ऊरलेले पदार्थ तसेच साधने धुण्याने पडलेले पाणी यांची विल्हेवाट सुरक्षित रितीने करावी जेणे करून पर्यावरण आणि पाणी यांचे प्रदूषण टाळता येईल.

रासायनिक संरचना :

इमिडाक्लोप्रिड टेक (१००% व/व ए आय)	: १७.८०% व/व
(ॲनोनिक आणि नॉन आयोनिक चे सॉमिश्रण)	
नॉन आयोनिक फेसाळ मिश्रण	: २.५०% व/व
(एथियोक्सायलेटेड अलकाईल ॲरिल फेनॉल डीरायवेटीव)	
पॉलीविनील पायरोहीडन-कोपोलायमर	: १.००% व/व
डीमेथील सल्फोक्साईड	:३८.५०% व/व
एन मेथिल पायरोलीडन	: क्यू.एस.
एकूण	: १००.००% व/व

खबरदारी : हया लेबल/हस्तपत्रिकेत निवेदित केलेल्यां पीकांखेरीज अन्य कुठल्याहि पीकांवर याचा उपयोग करू नये.

ಸನ್‌ಮಿಡಾ

ಇಮಿಡಾಕ್ಲೊಪ್ರಿಡ್ 17.8% ಎಸ್.ಎಲ್. (ಅಂತರವ್ಯಾಪಿ ಕೀಟನಾಶಕ)

ಇಮಿಡಾ ಕ್ಲೊಪ್ರಿಡ್ 17.8 ಎಸ್.ಎಲ್. ಇಮಿಡಾಕ್ಲೊಪ್ರಿಡ್ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶದ ಮತ್ತು ಜಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳ್ಲಿ ಹೀರುವ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಡಣೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಳಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು:

ಬೆಳೆ	ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ	ಹೆಕ್ಟರ್‌ಗೆಪ್ರಮಾಣ ಸಕ್ರಿಯ ಗ್ರಾಂ.	ಮೂಲಪದಾರ್ಥ ಮೇಲೆ ಹೆಕ್ಟರಗಳಿಗ್ರಾಂ.	ಪ್ರಮಾಣ ನೀರಿನ (ಲೀ)	ಕೊನೆಯ ಭಾರಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪೈರುಕೈಗೆಬರುವ ಕಾಲ (ದಿನಗಳು)
ದ್ರಾಕ್ಷಿ	ಫ್ಲಿಬೆಟಲ್	0.06-0.08	0.300-0.400	1000	32
ಮಾವು	ಎಲೆಸುರುಳಿ ಹುಳು	0.4-0.8	2-4 ಗ್ರಾಂ ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ	10 ಲೀ ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ	45
ಹತ್ತಿ	ನುಸಿಹೇನು,ಬಳಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಹಸಿರು ಸೊಳ್ಳೆ,ಎಲೆ ಸುರುಳಿ	0.020-0.25	0.10-0125	500-700	40
ಕಬ್ಬು	ಬೇರುಹುಳು (ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿದ ಕಬ್ಬನ ಗೆಣಿಕೆ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚುವುದು)	0.07	0.650	1875	75
ಟಮಾಟೆ	ಎಲೆಸುರುಳಿ	0.03-0.035	0.150-0.175	500-700	3
ಭತ್ತ	ತುದಿಒಣಗುವಿಕೆ ದೂಮ ಬಾಧೆಗೆ,ಹಸಿರು ಗೋದಿ ಬಣ್ಣದ ಸೊಳ್ಳೆ	0.020-0.25	0.10-0125	700-700	40
ನಿಮ್ಬ	ಲೀಫ್‌ಮೈನರ್,ಸೈಸಿಲ್ಲ	0.01%	0.05%	-	15
ಬೆಂಡೆಗಿಡ	ನುಸಿಹೇನು, ಹಸಿರು ಸೊಳ್ಳೆ, ಎಲೆ ಸುರುಳಿ	0.020	0.020	500	3
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ	ಹಸಿರು,ಹೇನು ಎಲೆಮುದುರುವಿಕೆ	0.020-0.25	0.10-0125	700-700	40
ನೇಲಗಡ	ನುಸಿಹೇನು, ಹಸಿರುಸೊಳ್ಳೆ	0.02-0.025	0.1-0.25	500	40
ಸೂರ್ಯ	ನುಸಿಹೇನು,	0.020	0.020	500	30
ಕಾಂತಿ	ಹಸಿರು ಸೊಳ್ಳೆ, ಎಲೆ ಸುರುಳಿ				

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ: ಸಸ್ಯರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಕರಗಳು: ಬಕೆಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಯರ್, ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ತುಳಿಯುವಂತಹ ಸ್ಪ್ರೆಯರ್, ಕೈ ಪಂಪು, ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ಕೈ ಪಂಪು ಸ್ಪ್ರೆಯರ್, ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೆಯರ್ ನಂತಹ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ಸ್ಪ್ರೆಯರ್ ಮೂಲಕವು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.

ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಗಳು- ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಇಡಬೇಕು, ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ, ಶರೀರದ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಾ ಕವಚನ, ಬೂಟು, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕವಚ, ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕರ್ ಸುಗಳಂತಹ ಸರಿಯಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಕ್ಕದ್ದು. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪ್ರೆಯರ್, ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸಿರಿ, ಸಿಂಪರಣೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ, ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿರಿ. ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಶುಭ್ರವಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಉಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ, ಕೆರೆಗಳು, ಬಾವಿಗಳು, ಕಾಲುವೆಗಳಂತಹ ನೀರಿಗೆ, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸ್ವೆಯಿಂಗ್ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಕೈ ಪಂಪು, ಅಥವಾ ಸ್ವೆಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಔಷಧಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸಿರಿ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಗೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಬದಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ವಿಷಲಕ್ಷಣಗಳು : ಉದಾಸೀನತೆ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ತಳಮಳ, ನಡುಕದ ಲಕ್ಷಣ, ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಕರ, ಮೂರ್ಛೆ, ವಿಕಾರತೆ, ವಾಕರಿಕೆ ಅಥವಾ ವಾಂತಿ-ತಲೆನೋವು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ, ವಿಷ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧಾರವಾದ್ದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ನಾಡಿ ಬಡಿತ, ಹೃದಯ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಹೃದಯಬಡಿತ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನುಂಗಿದ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಸುವದರಿಂದ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು.

ಔಷಧಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ವಿಷ ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಧರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕು.

ಶೇಖರಿಸುವಿಕೆ : ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿವ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಹತ್ತಿರ ಇಡಕೂಡದು, ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ದೂರ ಭದ್ರಸಿಬೆಸ್ ಬೇಕು. ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ನಾಣ್ಯತೆ, ಹಾಗೂ ಅದರ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಮಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಬೇಕು. ಉಗ್ರಾಣ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಬೀಸುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಬೇಕು. ಹವೆಯಾಡುವ ಪ್ರದೇಶ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಆ ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಲಬೇಕು. : ಹಾಗೂ ಆ ಪಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಗೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೂಳಬೇಕು. ಖಾಲಿಯಾದ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ವಾತಾವರಣ, ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ತೊಳದಂತೆ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಕಲುಷಿತವಾಗದಂತೆ ಅದನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಪ್ರಮುಖ್ಯ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಣ:

ಇಮಿಡಾಕ್ಲೊಪ್ರಿಡ್ ಮೂಲ ಪದಾರ್ಥವು (100% ಭಾ/ಭಾ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆಧಾರಿತ)	:17.80% ಭಾ/ಭಾ
ಆಯಾನಿಕ್ / ನಾನ್ ಆಯಾನಿಕ್ ಎಮ್‌ಲ್ಸಿಫರ್ ಮಿಶ್ರಣ)	
ಆಯಾನಿಕ್ ಎಮ್‌ಲ್ಸಿಫರ್ ಫೆನಾಲ್ ಡಿರ್‌ವೆಟಿಟ್)	:2.50% ಭಾ/ಭಾ
ಪಾಲಿವಿನೈಲ್ ಪೆರ್‌ಲಿಡನ್ - ಕಪಾಲಮ್ಮರ್	:1.00% ಭಾ/ಭಾ
ಡೈಮಿಥೆಯಲ್ ಸಲಾಕ್ಸೈಡ್	:38.50% ಭಾ/ಭಾ
ಎನ್. ಮಿಥಿಲ್ - ಪೈರೋಲಿಡೋನ್	ಸರಿಯಾಗುವಷ್ಟು
ಒಟ್ಟು	:100%ಭಾ/ಭಾ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇತರ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

ஸன்மிடா

இமிடா க்ளோப்ரிட் 17.8% எஸ்.எல். உள்ளோட்ட கிருமிநாசினி

இமிடா கனோப்ரிட் 17.8% எஸ்.எல். (6-கனோரோ-3 பைரிடி. ஐ மிதைல்) என்-நைட்ரோ இமிடா ஜோலிடின்-2 வை.எல்.-இடனியாமைன் எனும் ஘ாரசனை எனும் ஘ாரசயன ஆதார கிருமிநிலையியாகும். இதன் சாதாரண பெயர் இமிடாக்ளோப்ரிட். இதில் 17.8% எடை/எடை இமிடாக்ளோப்ரிட் மூலப் பொருள் உள்ளது.

லைப் பயன்படுத்தப் பரிந்துரைகள் :

பயிர்	நெல்லை-ருக்குத் சாதாரணபெயர்	மூலப்பொருள் (கிராம்களில்)	தேவையான (லிட்டரில்) பயிரின்மீது	ப்புக்கும் தெளிக்க தயரிக வடிவில் (கிராம்களில்)	இறுதித்டுதல் அறுவடைக்கும் இடையே இருக்கவேண்டிய இடை வெளி
கிரான்சை	பிளேனிள பெட்டில்	0.06-0.08	0.300-0.400	1000	32
மா	தத்துப்புழச்சி	0.4-0.8	2-4 கிராம்/மரத்துக்கும்	10 மி.லி/மரத்துக்கும்	45
பருத்தி	அசுவுணி,தத்துப்புழச்சி, வெண்புழச்சி, இலைப்பேன்	0.020-0.025	0.10-0.125	500-700	40
நெல்	பழுப்பு இலைத்தத்துப்புழச்சி பச்சைத்தத்துப்புழச்சி வெண் , முதுகுகுத்துப்புழச்சி	0.020-0.025	0.10-0.125	500-700	40
கரும்பு	பேரிமைட்	0.07	0.350	1875	45
தக்காளி	வெள்ளை ஈ	0.030.035	0.1500.175	500	3
மிளகாய்	தத்துப்புழச்சி அசுவுணி இலைப்பேன்	0.020-0.050	0.10-0.125	500-700	40
சிட்ரஸ்	பழங்கள்	0.1%	0.05	15	
வெண்டை	அசுவுணி வெண் புழச்சி, தத்துப்புழச்சி	0.020	0.5	500	3
ம்ளகாய்	அசுவுணி வெண் புழச்சி	0.025-0.05	0.125-0.250	500-700	40
நிலக்கண்	டலை அ.ப்பிட்ட், ஜாசிட்	0.02-0.025	0.1-0.25	500	40
சூரியகாந்தி	அசுவுணி வெண் புழச்சி, தத்துப்புழச்சி	0.020	0.10	500	30

சால்களில் சிறுவெடிகளின் மீதுதெளித்துமண் அணைக்கவும்.

பயிர்ப் பாதுகாப்புக் கருவிகள் :- இமிடா கனோப்ரிட் 17.8% எடை/எடை பூச்சிக் கொல்லி மருந்தைப் பயிர்கள் மீது தெளிக்க, பக்கெட் தெளிப்பான், கைலால் மிதித்து இயக்கும் தெளிப்பான், வில் பாரோதெளிப்பான், கனாப்-சாக் தெளிப்பான், பாட்டரியின் உதவியால் செயற்படும் ஆஸ்பி க்னாப்சாக் தெளிப்பான், பவர் தெளிப்பான், முதலி கருவிகளைப் பயன் படுத்தலாம். டிராக்டர் தெளிப்பானையும் பயபடுத்தலாம்.

முன்னெச்சரிக்கைகள் : குழந்தைகளில் எட்டா உயரத்தில் இம் மருந்தை வையுங்கள். மருந்து தோலின்மீதும், கண்களின் மீதும் ஆடைகள் மீதும் படக்கூடாது. மருந்தைத் தெளிக்கும்போது எதையும் உண்ணவோ, புகைப்பிடித்தலோ, குடிப்பதோ கூடவே கூடாது. கைகளையும் முகத்தையும் நன்கு சோப்பைப் போட்டு கழுவிய பின்னரே மேற்கூறியவற்றைச்செய்ய வேண்டும். மருந்தைத் தனிக்கும் போது கையுறைகள், பூட்ஸ், ஆடைகளின் மேலான மேலாடை முக்கும் கண்ணாடி அல்லது முகமூடி போன்ற பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணியவும். தெளிப்புப்பணிமுடிந்ததும் தெளிப்பான்களையும், பக்கெட் முதலான பாத்க்களையும் தினமும் நன்கு நீரால் கழுவவும். தெளித்துமுடிந்ததும் உடனடியாக தினமும் நன்கு நீரால் கழுவவும். தெளித்துமடித்ததும் உடனடியாக பயன்படுத்திய ஆடைகளைக் களையவும். சோப் போட்டு நன்கு குளிக்கவும். ஆடைகளைத் சுத்தமாகத் துலைக்கவும். மற்ற பொருட்களால் குளங்கள், குட்டைகள், சிற்றறிநுகள், கால்வாய் போன்ற நீர்நிலைகள் மாசடையாமல் பார்க்கவும்.

மருந்து தெளித்த பின்னர் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கைகள் : தெளப்புப் பணி முடிந்ததும் பம்புகளையும், கருவிகளையும்சோப்பால் நன்கு நீர்விட்டுக் கழுவுங்கள். மருந்து விழுந்த தோற்பகுதிகளைக் கழுவவும். ஒருவேளை கண்களில் மருந்து விழுந்தால் அதிக அளவில் சுத்தமான நீரைக் கொண்டு வெகு நேரம் கழுவவும். மருந்து விழுந்த ஆடைகளைத் தினமும் மாற்றவும்.

பைட் டோபாக்ஸிட்டி : பரிந்துரைகளின்படி பயன அபடுத்தினால் பைட்டோபாக்ஸிட்டிகிடையாது.

விஷத் தன்மைகள் : உணர்ச்சியின்மை, மனக்கிளர்ச்சி, வெறும் பார்வை, உடல்நடுக்கம், சுவாசித்தலில் கடினம், மயக்கம், அதுவரப்பு, வாந்துயாதல், தலைவலிஉண்டாகுதல்.

முதலுதவி : கண்களில் கிருமிநாசினி மருந்து விழுந்தால் உடனடியாக அதிக நீரைக் கொண்டு நன்கு கழுவுங்கள். விஷப்பிரயோகம் நடந்ததுஎன்பது உறுதியானால் இரத்த அழுத்தம், நாடித் துடிப்பை அடிக்கடி அளந்து பார்க்கவும். இதயத் துடிப்பு நிதானமாதல், இரத்த அழுத்தம் குறைதல் ஏற்படக்கூடும். அதனால் செயற்கை சுவாசம், இதயத்துடிப்பைட் சீராக்கும் முறைகளைக் கடைபிடிக்கவும். விழுங்கப்பட்ட மருந்தை உப்பழுறைக் குடிப்பித்தோ அல்லது பேதிமருந்தைக் கொடுத்தோ வெளியேற்ற வேண்டும்.

மருந்துகளால் சிகிட்சை : விஷத் தன்மையைப் பொருத்து மருந்தளிக்க வேண்டும்.

பாதுகக்கும் முறை : கிருமிநாசினி மருந்துள்ள பாக்கேட்களை பிறபொருட்கள், முக்கியமாக உணவுப் பொருட்கள் பத்துபடுத்தும் அறைகள் அல்லது இடங்களுக்கு மிக தூரத்தில் பத்தாப்படுத்துங்கள். கிருமிநாசினி தாத்தறையும், மதிப்பையும் பொருத்து பூட்டுவதறியுள்ள அலமாரிகளில் வைக்கவும். இடங்குளாகப் பயன்படுத்தப் படும் அறைகள், நன்குபதிதாமக கட்டல்பட்டதாகவும் காற்றோட்ட வசதியுள்ளதாகவும், ஈரமற்றபகுதியாகவும் இருக்க வேண்டும். அறைகளின் பாப்பளவு, இருமிநாசினி மருந்துகளினு வெளிப்படும் விஷ ஆவித்தன்மையாய் சூழற்கை மாசடையா வண்ணம் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும்.

இதைப் பாக்கிக் செய்யப்பட்ட பெட்டிகள், டப்பாக்கள், கருவிகள், பலத்திரங்களைக் கழுவப் பயன்படுத்திய நீரையும் தெளித்தமின்னர் மீதமான மருந்தையும் அழிக்கும் முறை : பாக்குகட்டுகளை டப்பாக்களை உடைத்து மக்கள் வாழ்விடங்களுக்கு வெகுதூரத்தில் ஆழமாக புதைத்துவிடவேண்டும். காலி டப்பாக்களை மீண்டும் பயன் படுத்துமாறு வெளியிடங்களில் வீசியெறியக்கூடாது.

சுற்றுச் சூழ்நிலை, நீர்நிலைகள் மாசுஅடையா வண்ணம், மிதமான மிவு மருந்து பொருட்களையும், கருவிகள், பாத்தாவ்களையும் கழுவிய நீரையும் கெடுதல் வராவண்ணம் அழிக்கவும்.

இரசாயனக் கலவை:

இமிடா கனோப்ரிட் நூட்ப மூலப் பொருள் (100% எடை/எடை சுத்தம் ஆதாரமாக)	: 17.80% எடை/எடை
(அயானிக் மற்றும் ஆன் ஆயானிக்)	
நான் அயானிக் திரவப் பெருள்	: 2.50% எடை/எடை
மிதியோ ஆக்ஸிலேடட் ஆல்கல் அரைல் பினால் டிரைவேடிவ்)	
பாலிவினைல் பைரோலிடோன். கோபாலிமர்	: 1.00% எடை/எடை
டைமிதைல் சல்ப்பாக்ஸைட்	: 38.50% எடை/எடை
என்-மிதைல் பைரோலிடோன்	போதுமான அளவு
ஆக மொத்தம்	100.00% எடை/எடை

எச்சரிக்கை: இணைக்கப் பட்டுள்ள துண்டு பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பயிர்கள்மீது மட்டுமே இம் மருந்தைப் பயன் படுத்தவும். பிற பயிர்கள் மீது பயன்படுத்தக் கூடாது.

સન મડિા

ઇમિડાક્લ્ર'પ્રિડ 17.8% એસ.એલ.

(અન્તર્વાહી કીટનાશક)

ઇ હ'લ એવિધ સર્વાંઙ્વાહી કીટનાશક ય'ત આછે સક્રિય ઉપાદાન ક્રપે ઇમિડાક્લ્ર'પ્રિડ 17.8% આક્ર વાકીખિનિ સહાયક ઉપાદાન આક્ર નિષ્ક્રિય પદાર્થ। એ કમ વિષાક્ત હ્રય। એ વિભિન્ન શસ્ય વસ શુઇ ખોયા આક્ર આન કિછુમાન કીટ પતઙ્ગ નિયન્ત્રણ વાવે વ્યવહાર કવિવ પાવિ। યદિહે ઇયાક ભાલ કૃષિ પદ્ધતિ અનુયાયી સઠિકભાવે વ્યવહાવે કવા હય, તેવે ઇ "એકીકૃત કીટ વ્યવસ્થાપન્ન" ર વાવે યોગ્ય।

અનુમોદન :

હેક્ટેર પ્રતિ માત્રા

શસ્ય	કીડાના સાધાવણ નામ	સ.ત. (કિ.ગ્રામ)	ફર્મુલેશન (મિ.લિ.)	જલે મિશ્રણ (લિટાર)	શેષ સ્પ્રે ઓ ફસલ કાટાવ મધ્યે વિઙામ (દિન)
કપાછ	માહૂ, તેલા, ચુર્દા સફેદ માથી	0.020-0.025	0.10-0.125	500-700	40
ધાન	ભૂવા પોથાર ફૂદકા સફેદ પોથાર ફૂદકા હરા પાતાર ફૂદકા	0.020-0.025	0.10-0.125	500-700	40
મિર્ચ	સેલા, માહૂ, ચુર્દા	0.025-005	0.125-0.250	500-700	40
આથ	ઉઇપોકા	007	0.350	1875	45
આથવ	ફૂદકા	0.4-08ગ્રા/વૃક્ષ	2-4 મિ.લી. વૃક્ષ	10 લિટાર	45

ક્ષેતેર પરિયાર કરે છિટિય આતે માટિ ઢાપ દિન।

પ્રયોગ કવા સઁજુલિ : ન્યાપસેક ફૂટ સ્પ્રેયાવ, કમ્પ્રેશાન ન્યાપસેક સ્પ્રેયાવ, કમ્પ્રેશન ન્યાપસેક વ્યાટવી સ્પ્રેયાવ આક્ર એ.એસ.પી.ઇ.-એચ.ટી.પી. પાવવ સ્પ્રેયાવ।

વિયક્રિયાવ લક્ષણસમૂહ : ઉદાસીનતા, માયોટનિયા, કંપનિ, ઉશાહવ કષ્ટ આક્ર માઇઅ'સ્પેજમ આદિ।

પ્રાથમિક ચિકિત્સા : યદિ કીટનાશક ચોખે યાય, સઙ્ગે પ્રચુર જલેર ઝાપટા દિયે ચોખ ધુયે ફેલાવેન। વિષ ભેતરે ગિયે થાકલે અનવરત રક્તચાપ ઓ નાડિ પરીક્ષા કરતે થાકવેન। યદિ બ્રાડિકાર્ડિસ કરે રક્તચાપ નેવે આસાર ઉપસર્ગ લક્ષ્ય કરેન તાહલે કૃત્રિમ શ્વાસપ્રશ્વાસ દેઓયા ઓ હદ યન્ત્રેર કાજ કૃત્રિમભાવે ચાલાવાર વ