

SUNPRID

Acetamiprid 20% S.P. Insecticide

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/Leaflet".

It is a soluble powder containing Acetamiprid ingredient 20% w/w and balance other relevant ingredients. It is used to control Aphids, Jassids and whiteflies of cotton crops.

Recommendations:

Table with columns: Crop, Common name of pests, Dosage/Ha., Wetting Period between Spray to last Harvest (Days). Rows include Cotton, Cabbage, Okra, Rice, and Chilli.

Equipments used in application : Knapsack sprayer, Foot sprayer.

Signs and symptoms of poisoning : Nausea, headache, lacrimation, tremors & convulsions. First aid measures: 1. Wash contaminated skin and cloths with soap and clean water...

Laminations and Cautions for use: Do not use in those situations if there is possibility of harming bees and fish. Storage : 1. The packages containing the insecticide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles...

Chemicals Composition: Acetamiprid a.i. : 20.00% w/w, Blend of sodium dodecyl benzene sulfonate, sodium sulfate & sodium alkylate : 4.50% w/w, Sodium citrate, Dihydrate : 30.00% w/w, Calcium hydrogen phosphate dihydrate : 0.10% w/w, Colouring agent (Brilliant Blue) : 0.05% w/w, Lactose monohydrate : Q.S., Total : 100.00% w/w.

సన్ప్రైడ్

ఎసిటమిప్రిడ్ 20% ఎస్.పి. కీటకనాశని

స్వాచ్ఛరిత : అభవరచన కరషత్రమతో పేటిస్సై ప్రైడ్ మే ఈ మందును ఉపయోగించవలెను. మిగతా ప్రైడ్లపై ఉపయోగించరాదు.

ఎసిటమిప్రిడ్ 20% శాతం ఎసిటమిప్రిడ్ మూలపదార్థం కలిగియుండి, సిటికో పుగ్గిగా కరిగి రూపంలో అభిండు కీటకనాశని.

Table with columns: పంటలు, కీటకములు, మూల పదార్థం (గ్రా.), సాధారణ మోతాదు (గ్రా.), నిత్య వివరించిన మందుచల్లిన తరువాత కోత కోయబడు వ్యవధి (కోణాలు). Rows include పత్తి, క్యబేజి, పండ్లు, వరి, మిరియలు.

వాడుకలో ప్రయోజనాలన్నిటినీ పొందేటట్లుగా ఉపయోగించాలి. కాలివోలొక్కునపు, బ్యాటెట్ నడచు, ఎకరీలి పీడనముతో సిటికో చల్ల గ్రోయరు మరియు పిస్టా-హెన్.పి.పి. చవర్ స్ప్రెయర్.

ముందు జాగ్రత్తలు - 1. ఆహారపదార్థాలకు, వసతిగ్రాహాలకు మరియు తిండి పదార్థాలకు నిల్వ చేసే ఖాళి ప్రాంతం దూరంగా ఉంచాలి. 2. నోటికి, కండ్లకు శరీరభాగాలకు తాకినయినప్పుడు, 3. చర్మి మందు తుంపరలను పిల్చినప్పుడు, గాలి పిచిడితో పానిని తీయాలి. 4. కీటకనాశనితో కలుషితమైన బట్టలను శుభ్రంగా వుండని ప్రాంతం, శరీరభాగాలను నెట్టు, సిటికో కడగండి రి చేయుటప్పుడు పానీ పిల్చాలి, పానియాలు సేవించటం, ఎడైన నమలటం చేయరాదు. 6. కీటకనాశని కలిపినప్పుడు మరియు చల్లబప్పుడు రక్షక దుస్తులను ధరించాలి. మొక్కలపై విషప్రభావం-సానికలను చేసే విధంగా వైపు వాడనప్పుడు, కీటకనాశని మొక్కలపై ఎటువంటి చెడు ప్రభావమును చూపదు.

सनप्रिड

एसिटामिप्रिड २०% एस.पी. कीटनाशक

चेतावनी : इस लेबल/हस्तपत्रिका वी ची गई फसलो के अलावा अन्य कोईभी फसल पर इसका उपयोग ना करें ।

एह एक घुलनशील पावडर है। जिसमें भार के हिसाब से सक्रिय तत्व 20% एसिटामिप्रिड है। बाकी अन्य सहयोगी पदार्थ हैं। इस कीटनाशक का उपयोग कपास के चेपा, हरा तेला और सफेद भविष्यका कीटों की रोकथाम के लिए किया जाता है।

Table with columns: फसल, कीटों के सामान्य नाम, स.त. ग्राम, मात्र प्रति हेक्टर, पानी कि मात्रा, आखिरी छिडकाव तथा फसल काटने में अन्तर दिनों में. Rows include कापूस, कोबी, भेंडी, मिरची.

उपयोग में आनेवाले यन्त्र : नेपसेक स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर, जहर जढने के लक्षण : सिरदर्द, मिचली, उल्टी, चक्कर कपकपी, पेट में दर्द आंखों में पानी आना दौरे पड़ना । प्राथमिक चिकित्सा : 1. दूषित त्वचा और कपड़ों को अच्छी तरह राबूर और पानी से धो डालें। रोगी को दूषित वातावरण से दूर रखें। 2. अगर आंखों में पडक्र गयी हो तो स्वच्छ पानी से अच्छी तरह धो डालें। औषधि चिकित्सा: लक्षणानुसार इलाज करें। सावधानियां : 1. घोल बनाते समय कीटनाशक के होते त्वचा अथवा आंखें में न पड़ने दे। कीटनाशक के स्प्रसे के बंच। 2. नंगे हाथों कीटनाशक का उपयोग न करें। 3. उपयोग करते समय खाना पीना तथा धूम्रपान करना नगा है। 4. उपयोग करने का बाद दूषित त्वचा और कपड़ों को धो डालें। प्रयोग की सीमायें तथा सावधानी : मधुमक्खीयां पालतू जानवरों चिड़ियो तथा जगली पक्षियों तथा जानवर को नुकसान होने की संभावना हो कीटनाशक का प्रयोग करें। संग्रह : 1. कीटनाशक के डिब्बों को अलग अलग कमरों या आलमारियों में जेंकि अन्य कमरों तथा आलमारि से, जिनमें अन्य करते विशेषकर खाद्य पदार्थ या पशुआहर संग्रहित किए जाते हैं से दूर अन्य कमरों से दूर अलग अलग कमरों में या आलमारियों में ताला चावी में बंद रखें। 2. जिन कमरों या आलमारियों में कीटनाशक का भण्डारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाशयुक्त, हवादार व पर्याप्त लम्बा जौडा होना चाहियें ताकि कीटनाशक भाप से वातावरण प्रदूषण होने का डर न हों। खाली डिब्बों का निपटारा : 1. बची हुई कीटनाशक तथा यन्त्रों के घोनको इस प्रकार निपटारा करें कि जिससे आसपास के वातावरण तथा पीने का पानी विषोला न हों। 2. उपयोग के बाद खाली डिब्बों को खुला हुआ बाहर न छोडें। 3. कीटनाशक निर्माताओ का कर्तव्य है कि डिब्बों या पात्रों को तोड़फोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाडत्र देना चाहिए। रासायनिक संघटन : एसिटामिप्रिड स.त. : 20.00% भार/भार सोडियम डाइसाइल बेजिन सल्फोनेट, सोडियम सल्फेट व सोडियम अल्काइलेट का मिश्रण : 4.50% भार/भार सोडियम साइट्रेट, डाईहाइड्रेट कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डाईहाइड्रेट : 30.00% भार/भार कैल्शियम हाइड्रेट, फॉस्फेट डाईहाइड्रेट : 0.10% भार/भार रंग लाने वाले घटक (ब्रिलियन्ट ब्लू) : 0.50% भार/भार लैक्टोज मोनोहाइड्रेट : पर्याप्त मात्रा कुल : 100.00% भार/भार



SUNPRID ACETAMIPRID 20% S.P. INSECTICIDE

సన్ప్రైడ్ ఎసిటమిప్రిడ్ 20% ఎస్.పి. కీటకనాశని

सनप्रिड एसिटामिप्रिड २०% एस.पी. कीटनाशक

सन्प्रीड

ఎస్.పి. 75% ఎస్.పి. కీటకనాశక

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/Leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN పిల్లలకు దూరంగా ఉంచండి. బఘో సే దూ రక్షిణి! మర్కశిగి సిగడంకె దుంపవిడి.



READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్ను పఠింయు కరవత్తుమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును. ఇస్త్రోమాలు కరనే సె పుటెలె సారి పర్చో పూి తరళ పుటెలె.

Manufactured & Marketed by : Aegis Agro Chemicals India Private Limited

237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295. Telangana State. Customer Care Manager No. +91 8498099536 Email: aegisagrochemicals@gmail.com / www.aegisagro.com



