Read enclosed leaflet before use. ఉపయోగించుటకు ముందు జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి.

రుద్రా- ప్రొఫెనోఫాస్ 40% + సైపర్‌మెథ్రిన్ 4%ఇ.సి. కీటకనాశని

రసాయనిక సమ్మేళనం : ప్రొఫెనోఫాస్ మూలపదార్థం ... 40.00% భా/భా, సైపర్‌మెథ్రిన్ మూలపదార్థం ..4.00% భా/భా, పాలిథైలాన్ ఈథర్ 36/40 రూపములో ఆముదము ...9.75% భా/భా, డొడెసైల్ బెంజిన్ సల్ఫోనిక్ ఆమ్లము యొక్క కాల్షియం ... 5.25% భా/భా, సోయాబీన్కు సూచి (బంగారు/తేనెరంగు రూపంలో) ... 1.00% భా/భా, సాల్వెంట్ సి-9 (డ్రమ) కాలేజినింగ్ మిశ్రమం .... 100.00% భా/భా, వాడుటకు సూచనలు- జతపరచబడిన సవివరాల కరపత్రమును హార్వెస్ట్ మందునట్లేయండకు ముందే వాడండి. ముందు జాగ్రత్తలు : 1. మందును ఆహారపదార్థములు భారీ పాత్రలు మరియు పశుగ్రాసాలకు దూరంగా ఉంచండి. 2. మందును ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు తగల నీయకద్దు. 3. మందును పీల్చనద్దు. గాలి వాలూ పిచికారి చేయకలేము. 4. కలుషిత దుస్తులు మరియు చర్మమును బాగా శుభ్రపరచకోనవలెను. 5. పిచికారి చేయునపుడు తాగుట లేదా త్రాగడం, తినడం మరియు పిల్లల నములుట వంటివి చేయకూడదు. 6. మందు ద్రావణం కలుపునపుడు మరియు పిచికారి చేయునపుడు మరక్షణమైన దుస్తులు ధరించవలెను. పిచుగుడు – 1. నిషధప్రయోగానికి గురియైన రోగికి వెంటనే ఎట్రోపిన్ యిన్జక్షన మొదలు పెట్టాలి. మరల 5–10 నిమిషాల వ్యవధిలో, 2–4 మి.గ్రా. మోతాదులో కొన్ని గంటల పాటు కొనసాగించాలి. 2. ఎట్రోపిన్ యిన్జక్షన కొనసాగించటం, విష ప్రయోగ లక్షణాలు తీవ్రతను గమనించి నిర్ణయించాలి. ఒకరోజులో 25 నుండి 50 మి.గ్రా. ఎట్రోపిన్ యిన్జక్షనలో వుంటుంది. వొంగ కాక్సీతీవ్రతబట్టి ఎట్రోపిన్ మోతాదును నిర్ణయించేందుకు సూచిగా నహోయనుడుతుంది. 2. 1–2 మి.గ్రా. 2–పి.ఎ.మ్. మ 10 మి.లీ. పరిశుభ్రమైన నీటితో కడిగి రక్తనాళాలలోకి నెమ్మదిగా నిధానంగా 10–15 నిముషములు సమయం తీసుకొని ఇంజెక్ట్ యిన్నాలి. అయిన్లేదన్నతిమయము అరికట్టుటకు అంటే హెర్పెమైనకు అందించవచ్చును. ప్రథమ చికిత్స : దయచేసి కరపత్రమును చూడవలెను. విషప్రకులు : దయచేసి కరపత్రమును చూడవలెను. హెచ్చరికలు- దీనిని ప్రత్యేకించు ఆశించు ఉన్నికముల్లిన కాయ తొల్చుపురుగులను అరికట్టుటకు ఉపయోగించవలెను. హెచ్చరిక: జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైన్నదానే ఈ మందును ఉపయోగించవలెను. మగళాపైగ్రస్థ ఉపయోగించరాదు.

రుద్రా – ప్రోఫెనోఫోస ४०%+ సాయపరమెథిన ४% ई.सी. कीटकनाशक

रासायनिक संघटन : प्रोफेनोफोस स.तत्व. ... ४०.००% भार/भार, साइपरमेथ्रिन स.तत्व ... ४.००% भार/भार, अरंडी तेल पाली ग्लाइकोल ईथर ३६/४० ग्रेड ... ९.७५% भार/भार, डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैलशियम साल्ट ... ५.२५% भार/भार, सोयाबीन तेल इपाक्सीडाइज्ड ... १.००% भार/भार, सोलवेंट सी-९ .. पर्याप्त मात्रा%, योग ... १००.००% भार/भार. उपोयग के लिये निर्देश : उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढें । प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानियाँ : १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के बारे से दूर रखें । २. मुँह, त्वचा और आंखों के संम्पर्क से बचायें । ३. छिडकाव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें । हवा की दिशा मे छिडकाव करें । ४. छिडकाव के बाद दूषित कपडों और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं । ५. छिडकाव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए । ६. छिडकाव करते या प्रयोग समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें । चिषनाशव : १. रोगी को तुरन्त एट्रोपिन दीजिए और इसकी २ से ४ मि.ग्रा. तक की खुराक ५ से १० मिनट के अन्तराल पर अन्त:शिरा द्वारा लगातार देते हुए पूर्ण एट्रोपिनाइज रखिए । एक दिन में एट्रोपिन सल्फेट की अधिक से अधिक २५ से ५० मि.ग्रा. तक की मात्रा की आवश्यकता पड़ सकती हैं । एट्रोपिन सल्फेट की और मात्रा लक्षणों के बरकरार रहते दी जा सकती हैं । एट्रोपिन की कितनी खुराक देनी चाहिए इसके लिए मुँह से निकलने वाली लार एक लाभदायक कसौटी हैं । २. ५ से ३ ग्राम २ पी.ए.एम. १० मि.ली. आसुत जल में घोलकर अन्त:शिरा द्वारा बहुत धीरे धीरे १० से १५ मिनट मे देना चाहिए । ३. एलर्जी के लिए एन्टीहिस्टेमिन्स दिये जा सकते हैं । प्राथमिक चिकित्सा : कृपया संलग्न लीफलेट देखें । लक्षण :कृपया संलग्न लीफलेट देखें । उपोयग : इसका उपयोग कपास की डोड की सुंडियों की रोकथाम के लिये किया जाता है । चेतावनी : इस लेबल / इस्तापत्रिका मे दी गई फसलो के अलावा अन्य कोइंभी फसल पर इसका उपयोग ना करें ।

రుద్రా– ప్రొఫేనోఫాస్ 40% + సైపర్‌మెథ్రిన్ 4% ఇ.సి. కీటనాశక

రాసాయనిక సంయోజనమే : ప్రొఫెనాఫాస్ ఎ.ఐ. ... 40.00% తూకశ/తూకశ, సైపర్‌మెథ్రిన్ ఎ.ఐ. ... 4.00% భా/భా. కిడెల ఎత్లీ పాలియోగ్లైసల్ ఇథర్ 36/40గ్రేడ్ .... 9.75% తూకశ/తూకశ, డొడెక్సైల్ బేంజిన్ సల్ఫునిక్ ఆసిడ్ సాల్ట్... 5.25% తూకశ/తూకశ, సోయాబిన్ ఎత్లీ సంస్కరిత . . . . 1.00% తూకశ/తూకశ, సాల్వంట్ సి-9 సరిదూగునవే బేకాదద ప్రమాణదల్లో ఓట్టు..100.00%తూకశ/తూకశ. ఉపయోగిసువ విధాన : -ఉపయోగిసువవే మున్న కరపత్రమన్న చీన్నా ఓదికొళ్ళబేకు. ముంజాగ్రతే క్రమ: 1. ఆహార వస్తుగళు, ఏళసువ వస్తుగళు మత్తు పశు ఆహార బదాథగళింద దూర ఇరిసబేకు. 2.బాయి కణ్ణు మత్తు చర్మక్కే స్పర్శిసదంతే జాగ్రతెవహిసబేకు. 3. మూగిసిదంద మూసువుదు, హాగూ గాళి బిసువ దిక్కిన విరుద్ధ సింపరణే మాడుబారదు. 4 . సింపరణేయద నంతర బాలి జబ్బుగళు, బాలి పాత్రెగళన్నన్న సిన్నియగుళిసి, సింపరణే పరికరగళన్న శుభ్రవాగి తొళెయబేకు. 5. సింపరణే సమయదల్లి ధూమపాన, కుడియువుదు, తిన్నువుదు, బాయియల్లి ఏనన్నాదరూ ఆగియువుదు మాడబూరదు. 6. మిశ్రగ హాగూ సింపరణే మాడువాగ కైగళగే హాగూ దేహక్కే స్పర్శిసదంతే నిలువదంగి, ముంశాదవుగళన్న బళసువుదు మత్తు ఉపయోగిసబేకు. వైద్యకీయ చికిత్స : - 1. 2-4 .మి.గ్రా. 5 రింద 10 నిమిషగళ అంతరదల్లి గంటేగే ఒందు బారి ఎట్రిఫిన్ కొడబేకు. దినక్కే 25- 50 మి.గ్రా. బేకాగుత్తదే. మేదలు నరగళ మూలక హాగూ మాంసఖండదగళ మూలక కణ్ణు రెప్పేగళు సాధారణవాగి బరువవరగే కొడబేకు. విష లక్షణవన్న ఎట్రిఫిన్ ప్రమాణద మేలే నిర్ణయిసబేకాగుత్తదే. 2. 1 రింద 2 గ్రా.. 2 పి.ఎ.ఎం న్ను 10 మి.లీ. శుద్ధసువ నరగళ మూలక నిధానవాగి 10 రింద 15 నిమిషగళ అవధియల్లి కొడతక్కద్దు. ఎంటిహిస్టామిన్స్‌ను 3. అలర్జీ ప్రభావ ఇద్దల్లి నీడిదరే అదన్ను నియంత్రిసబహుదు. ప్రథమ చికిత్స :దయవిట్టు లిగత్రినేదలాద కరపత్రమన్న జాగురుకతెయింద ఓదిద నంతర ఔషధియ ఉపయోగగళన్న మాడి. విషప్రకృగళు: దయవిట్టు లిగత్రినేదలాద కరపత్రమన్న జాగురుకతెయింద ఓదిదనంతర ఔషధియ ఉపయోగగళన్న మాడి. ఉపయోగిసువ బేళగళు: - తత్రియల్లి బరువ కాయికొంరక హుళుగళన్న నివారిసలు ఉపయోగిగళకక్కల్లు. ఎచ్చరికే : లగత్రిసలాద కరపత్రదల్లియ సూచిసలాద బేళగళ మేలేయే ఔషధియన్ను ఉపయోగిగళబేకు. ఇతర బేళగళ మేలే ఇదన్ను ఉపయోగిగళబారదు.

రుద్ర – பரொஃபெனோபாஸ் 40% + ஸைபர்மெத்ரின் 4% இ.ஸி. பூச்சிக்கொல்லி

இரசாயனக் கலவை : பரொஃபெனோபாஸ் மூலப்பொருள் ... 40.00%எம்/எம், ஸைபர்மெத்ரின் மூலப் பொருள் ... 4.00%எம்/எம், ஆமணக்கெண்ணெய் பாலிகிளைகால் ஈதர் 36-40 ... 9.75%எம்/எம், டோடெஸில் பெஞ்சீன் ஸல்போனிக் ஆசிட் கால்ஸியம் சால்ட் ... 5.25%எம்/எம், சோயாபீன் எண்ணெய் எபோக்ஸைடைஸ்ட் ... 1.00%எம்/எம், கரைப்பர் பொருள் சி-9 ...போதுமானஅளவு, மொத்தம் ... 100.00%எம்/எம். பயன்படுத்த குறிப்புகள் - பயன்படுத்துவதற்கு முன்னர் இருத்த துண்டு பிரசுரத்தை விழிப்பாக, நன்கு படிக்கவும். முன்னெச்சரிக்கைகள்: 1. உணவுப் பண்டங்கள், உணவுப் பொருட்கள் இருத்த காலிடப்பாக்கள் மற்றும் கால்நடை தீவனங்கள் இருக்கும் இடத்தை விட்டு தூரமாக வைக்கவும். 2. வாய், கண்கள் மற்றும் சருமத்தின் மீது படுவதைத் தவிர்க்கவும். 3. ஸ்ப்ரே மிஸ்ட்டை உள்ளுக்குள் முகர்வதைத் தவிர்க்கவும். காற்று வீசும் திசையோக்கி ஸ்ப்ரே செய்யவும். 4. மருந்தை ஸ்ப்ரே செய்து முடித்ததும் மருந்து பட்ட துணிகள் மற்றும் சருமப் பகுதிகளை நன்றாக தண்ணீரில் அலசிக் கழுவவும். 5. மருந்தை ஸ்ப்ரே செய்யும்போது புகைக்கவோ, குடிக்கவோ, சாப்பிடவோ, எதையும் மெல்லவோ கூடாது. 6. மருந்தை கலக்கும்போதும், ஸ்ப்ரே செய்யும்போதும் பாதுகாப்பு உடைகளை அணிந்து கொள்ளுங்கள். விஷமுறுவது உடனடியாக நோயாளிக்கு அட்ரோபினை மீண்டும் மீண்டும் 2-4 மி.கிராம் அளவுக்கு 5-10 நிமிட இடைவெளியில் மணிக்கணக்கில் தந்து இருத்தத்தில் அட்ரோபின் அளவைச் சரிசெய்யவும். நோயின் அறிகுறிகளுக்கேற்ப மீண்டும் அட்ரோபின் மருந்தளவைப் பயன்படுத்தவும். 2. 1-2 கிராம், 2 பி.ஏ.எம்-ஐ 10 மி.லீட்டர் நீரில் கரைத்து நரம்பு வழியாக 10-15 நிமிடநேரம் எடுத்துக்கொண்டு நரம்பு வழியாக மெதுவாக ஊசி மூலம் உட்செலுத்தவும். முதலுதவி : உபயோகிக்குமுன் இணைத்துள்ள பிரசும் மற்றும் லைபினை முழுமையாகப் படிக்கவும். அறிகுறிகள் : உபயோகிக்குமுன் இணைத்துள்ள பிரசும் மற்றும் லைபினை முழுமையாகப் படிக்கவும். பரிந்துரைகள் : பருத்தி பயிரின்தைத் தாக்கும் காய்ப் புழுக்களை அழிக்க இது பரிந்துரைக்கப் படுகிறது. எச்சரிக்கை: இந்த லேபிள்/பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பயிர்கள் தவிர மற்ற பயிர்களில் பயன்படுத்தக் கூடாது.

In Case of any Consumer Complaints Contact, **"Manager Customer Care" Cell No.: +91 84980 99536**
Email : aegisagrochemicals@gmail.com | Website : www.aegisagro.in
AEGIS AGRO CHEMICALS PRIVATE LIMITED
237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295. Telangana State

Aegis™

Rudra

PROFENOFOS 40% + CYPERMETHRIN 4% E.C.

INSECTICIDE



A product of Aegis™

RUDRA - Profenofos 40% + Cypermethrin 4% EC- INSECTICIDE

Chemical Composition : Profenofos a.i. .... 40.00% w/w, Cypermethrin a.i. ... 4.00% w/w, Caster Oil Poly glycol ether 36/40 grade ... 9.75% w/w, Dodecyl Benzene sulfonic Acid calcium salt ... 5.25% w/w, Soyabean Oil, Epoxydised ... 1.00% w/w, Solvent C-IX ... Q.S.% Total.... 100.00% w/w. Direction for Use: Please read enclosed leaflet before use. Precautions: 1.Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2.Avoid contact with mouth, eyes and skin.3.Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind.4.Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. Antidote : 1. Atropinize the patient immediately and maintain full atropinization by repeated doses of 2 to 4 mg. of atropine sulphate intravenously at 5 to 10 minutes interval. As much as 25 to 50 mg. of atropine may be required in a day. The need for further atropine administration is guided by the continuance of symptoms. Extent of salivation is a useful criterion for dose adjustment. 2. Dissolve 1-2 gm of 2 PAM in 10ml distilled water and inject intravenously very slowly for 10-15 minutes. 3. Antihistamines may be given to control allergic manifestation. First Aid : Please see enclosed Leaflet. Symptoms :Please see enclosed Leaflet. Recommendations : It is used to control Bollworm complex of cotton crops. Caution : "Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet".

Manufactured & Marketed by :

Aegis™
Agro Chemicals India Private Limited
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY
 # 237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295. Telangana State.

For Agricultural Use Only
Keep out of reach of children
जहर
ఎచ్చరిక
చేదన ఎచ్చరిక
POISON
Read the enclosed leaflet carefully before use
ఉపయోగించుటకు ముందు జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి
पढ़ने से पहले संलग्न पत्रक पढ़ें

Regn.No / రిజి నం.ఎ.నం. : **CIR-113826/2014-Profenofos+Cypermethrin (EC) (348)-101**
Mfg.Lic.No / ఉత్పాదక లైసెన్స్.న.: మాన్యుఫాక్చరింగ్ లైసెన్సు నం. : **019/TS-IML/2016 Dt. 23-7-2016**

Net Content : **1ℓ**
ఉత్పత్తి సామగ్రి నికర పరిమాణము :

Batch No :
బేచ్ నం . బ్యాచ్ నెం. :

Mfg.Date :
ఉత్పాదన తిథి .తయారీ తేదీ. :

Exp.Date :
నిరుపయోగమైన తిథి:
గడువు తేదీ:

Max.Retail.Price ₹ :
అధికతమ ఖుదరా మూల్య ₹ :
గరిష్ఠ అమ్మకపు ధర:
(Inclusive of all taxes)
(सभी करों सहित)
(అన్ని రకాల పన్నులు కలుపుకొని)

Unit Sale Price ₹ per ml :
యూనిట్ విక్రయ మూల్య ₹ ప్రతి మి.లీ.
ప్రతి ఎం.ఎల్. రేటు ₹

EMPTY PACKAGES / CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.
ఠండి, శుష్క జగహ మే రఖో. గర్మీ और खुली लौ से दूर रखें।