Read enclosed leaflet before use. उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। ఉపయోగించుటకు ముందు జతచేరిన కరపత్రమును చదవండి.

క్లోర్‌పైరిఫాస్ 20% ఇ.సి. - కీటకనాశని

రసాయనిక మిశ్రమము : క్లోరిపైరిఫాస్ టెక్ని. (94% భా/భా, సం.ప. ఆధారిత) ... 21.5% భా/భా, సాల్వెంట్ (ఏరోమెక్స్) ... 72.5% భా/భా, ఇమల్సిఫైయర్ (కాల్షియం ఆల్కైల్ ఆరైల్ సల్ఫోనేట్ నాన్ ఆయానిక్ (పోలి ఆక్సి ఇథైలీన్ ఈథర్) ... 6.0% భా/భా, మిశ్రమం ... 100.0% భా/భా. ఉపయోగించుటకు సూచనలు : ఆకుచరుచ కరపత్రమును చాదుకుని ముందు చదవవలెను. ముందు జాగ్రత్తలు : 1. మందును ఆహారపదార్థములు ఛాలీ పాత్రలు మరియు పశుగ్రాసాలకు దూరంగా ఉంచండి. 2. మందును ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు తగులు కొనకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవలెను. 3. మందును పిచికారు చేయునపుడు, తాగు నీరు, తినుట లేదా పొగ త్రాగుట చేయరాదు. 4. కలుషిత దుస్తులు మరియు చర్మమును బాగా శుభ్రపరచుకొనవలెను. 5. పిచికారి చేయునపుడు పొగత్రాగరాదు, త్రాగరాదు, తినరాదు మరియు ఏదైన సమయంలో మందిని పిచికారి చేయరాదు. 6. మందు ద్రావణం కలుపునపుడు మరియు పిచికారి చేయునపుడు సురక్షితమైన దుస్తులు ధరించవలెను. విరుగుడు : 1. అట్రోపిన్ రోగికి చెంబెన మన్నంది. 2-4 మి.గ్రా. అట్రోపిన్ సల్ఫేట్ మోతాదు నరాలద్వారా 5-10 ని.లు. విరుగుమందులో మన్నంది. రోజుకి 25-50 మి.గ్రా. అట్రోపిన్ అవసరమకావచ్చును. అట్రోపిన్ నిమంత్రణ రోగి లక్షణములను బట్టి చేయండి. చాలాజలస్తెతిని బట్టి మోతాదు చూచుకొనవలెను. 2. 1-2 గ్రా. లవ్ ని.ఎ.ఎమ్. 10 మిలీ. వడబోసిన కలిని నరాలద్వారా చాలా నెమ్మదిగా 10-15 ని.లలో ఇవ్వండి. 3. అయిదీయస్థులకుమందును అరికట్టుటకు యాంటి హిస్టమైన్లను అందించవచ్చును. ప్రథమ చికిత్స : ప్రథమ చికిత్స : 1. మెద చెనుక చెక్కిలిగిలి పెట్టి వాంతులు చేయించండి. మందు పూర్తిగా బయటకు వచ్చే వరకు వాంతి చేయించండి. 2. శరీరం పై పడితే, ధారాళంగా నీటితో మరియు సబ్బుతో శుభ్రం చేయాలి. 3. మందు కళ్ళల్లో పడితే 10-15 ని. నిమ్ము నీటితో కళ్ళు శుభ్రపరచండి. 4. విష నాయువును నిలిపిన వ్యక్తిని స్పృహైన గాలి పీల్చే ప్రదేశానికి తీసుకువెళ్ళండి. సిఫారసులు : ఇది వరిపైరు తప్పించి ఇతర పంటలకు తెగుళ్ళు, పురుగులు, నత్తలు, ఎలుకలు, చెదలు, పుట్టలు, ఆకుచుట్టు పురుగు, కాండం తొలుచు పురుగు, కాయతొలుచు పురుగు, గ్రుడ్డు పైరును ఆశించు సునుకలు, కాయతొలుచు పురుగు, తెల్లదోమ, కట్టులేమ, కొరగాయలు, పండ్లతోటలు పైర్లను ఆశించు అన్నిరకములైన కీటకములను మరియు భూనములలో చెదలను, అరికట్టుటకు ఉపయోగించవలెను. హెచ్చరిక : ఆకుచరుచ కరపత్రములో సేర్చిన పైర్లు పైపైర్లే ఈ మందును ఉపయోగించవలెను. మిగతా పైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

ಕ್ಲೋರ್‌ಪಾಯರಿಫೋಸ್ ೨೦% ಈ.ಸಿ. - ಕೀಟನಾಶಕ

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯಾ : ಕ್ಲೋರಿಪೈರಿಫಾಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ (ಭಾರಾನುಸಾರ ೯೪% ಶ.ತ. ಪರ ಆಧಾರಿತ) ... ೨೧.೫% ಭಾ/ಭಾ, ಘೋಲಕ: ಏರೋಸೆಕ್ಸ ... ೭೨.೫% ಭಾ/ಭಾ, ಇಮಲಿಷಾಯರ ಎನಿಯೆನಿಕ (ಕೆಲ್ಸಿಯಂ ಡಾಡಾಡಾ ಏರಾಡಾ ಸಲ್ಫೊನೇಟ್) ನೆಂ ಆಯನೆಸಿಕ (ಪೆಲಿ ಆಕ್ಸಿ ಇಥೈಲೀನ್ ಈಥರ್) ... ೬.೦% ಭಾ/ಭಾ, ಮಿಶ್ರಣ ... ೧೦೦.೦% ಭಾ/ಭಾ ಬಳಕೆಯ ಸೂಚನೆಗಳು : ಇದು ವರಿಪಾಯಿ ಅಕಿಂಯ ಕಾಟಾಕು ತಿನುಲು, ಆಕುಮಚ್ಚ ಪುರುಗು, (ರಾಯು) ಪಟ್ಟಿಪೋಡ, ಕಾಂಡಮು ತೊಲುವ ಪುರುಗು, ಕಾಯತೊಲುವ ಪುರುಗು, ಗ್ರಡ್ಡಿ ಪೈರುನು ಆಕಿಂಯ ನೆಸುಲಂಂಡಿ, ಕಾಂಡತೊಲುವ ಪುರುಗು, ತೆಲ್ಲದೋಮ, ಕಟ್ಟುಪೆಮ, ಕೊರಗಾಯಲು, ಪಂಡ್ಲತೋಟಲು ಪೈರ್ಲನು ಆಕಿಂಯ ಅನ್ನಿರಮಮುನಿ ಕೀಟಕಮುಲನು ಮರಿಯು ಭೂನಮುಲಲ್ ವಿವಿಧನು, ಅರಿಕಟ್ಟುಟಕು ಉಪಯೋಗಿಂಚವಲೆನು. ಹೆಚ್ಚರಿಕ : ಆಕುವರುಚ ಕರಪತ್ರಮುಲ್ ಪೆರ್ಕ್ಕಾನ್ನ ಪೈರ್ಲು ಪೈಪೈರ್ಲೆ ಈ ಮಂದುನು ಉಪಯೋಗಿಂಚವಲೆನು. ಮಿಗತಾ ಪೈರ್ಲಪೈ ಉಪಯೋಗಿಂಚರಾದು.

க்ளோர்பைரிஃபாஸ் 20% இ.சி. - பூச்சிக்கொல்லி

ரசாயன கலவை : க்ளோர்பைரிஃபாஸ் டெக்னி. (94% எ/எ, ஸ.ப ஆதாரமானது) ... 21.5% எ/எ, கூம்மமாக்கியாக (அல்கைல் அரைல் ஸல்போனேட் பாஸி ஆக்ஸி இதைலின் சுதர் ப்லெயன்ட்) ... 6.0 % எ/எ, கரைப்பான் (ஆரோமெக்ஸ்) ... 72.5% எ/எ, மொத்தம் ... 100.00% எ/எ. பயன்படுத்தக் குறிப்புகள் : இந்த மருந்தைப் பயன் படுத்துவதற்கு முன்னர் இதனுடன் இணைத்துள்ள துண்டு பிரசுரத்தை நன்கு கவனமாகப் படிக்கவும். முன்னெச்சரிக்கைகள் : இந்த மருந்தைச் சுவாசிக்கதிர்கள் தோல் பகுதிகள் மீது படவிடாதிர்கள். காலி டப்பாக்களை உடனே அழித்து விடவும். மாற்று மருந்தாக : அட்ரோபின் முறிவு மருந்தாகும். நோயாளிக்கு ஒவ்வொரு 5-10 நிமிடங்களுக்கு ஒருமுறை 2-4 மி.கிராம் அளவுடன் மீண்டும் நரம்பு ஊசிமூலம் அட்ரோபினைத் தரவேண்டும். நுரை தள்ளுதல் குறைவதைப் பொருத்து அட்ரோபின் மருந்து அளவை நிர்ணயிக்கவும். நாள் ஒன்றுக்கு 25-50 மி.கிராம் அட்ரோபின் தேவைப்படலாம். 2. பி.ஏ.எம்பை 10 மிலீட்டர் நீரில் கலரத்து (1-2 கிராம்) ஊசிமூலம் இரத்தக் குழாய் வழி மெதுவாக 10-15 நி மிட காலம் எடுத்துக் கொண்டு உட் செலுத்தவேண்டும். எச்சரிக்கை : மருந்தின் தன்மையால் நரம்புகள் சுவாதீனம். இல்லாமற்போகும் தன்மை நோயாளிக்கு நேரபடும் பாய்ப்பு உள்ளது. எனவே விழிப்பாகப் பயன் படுத்த வேண்டும். பரிந்துரைகள் : நெற்பயிரைத்துக்கும் உறிஞ்பா வண்டுக்களையும் இலைச் சுருட்டுப் புழுக்கள், ஆனைக் கொம்பன் ஈக்கள், தண்டு துளைப்பான்கள் முதலியவற்றையும், மீன்ஸ் பயிரை அழிக்கவல்ல அசுவுணி, குருத்துப் புழுக்களையும் பருத்திப் பயிரைத் தாக்கும் உறிஞ்பா வண்டுகள், காய்ப்புழுக்கள், வெள்ளை ஈக்கள் மற்றும் துண்டாக்கும் புழுக்களையும், கடுகு பயிரைத் தாக்கும் அசுவுணியையும், கருமிபு, பருப்புப் பயிர்கள், வேர்க்கடலை, காய்கறிகள், பழங்கள் மற்றும் பிற பயிர்களை அழிக்கும் புழு பூச்சிகளையும் இந்த மருந்து மிகத் திறமையாக அழிக்கும். எச்சரிக்கை: இணைக்கப்பட்டுள்ள துண்டு பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பயிர்களிலும் மட்டுமே இம் மருந்தைப் பயன் படுத்தவும். பிற பயிர்கள் மீது பயன்படுத்தக் கூடாது.

Aegis™

# sunchlor

## Chlorpyriphos 20% E.C.

Insecticide

Keep out of reach of children.
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి
ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಡಿರಿ
बच्चों की पहुंच से दूर रखें

A product of Aegis™

**CHLORPYRIPHOS 20% E.C. - INSECTICIDE**

Chemical Composition : Chlorpyriphos Tech. (Based on 94% w/w A.I.) ... 21.5% w/w, Solvent (Aromex) ... 72.5 % w/w, Emulsifier Anionic (Calcium Alkyl aryl sulphonate) Non Ionic (Poly oxyethylene ether) ... 6.0%w/w, Total...100.0% w/w. Directions for use: Please read enclosed leaflet before use. Precautions : 1.Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2.Avoid contact with mouth, eyes and skin.3.Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4.Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.5.Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.6.Wear full protective clothing while mixing and spraying Antidote : 1. Atropinize the patient immediately and maintain full atropinization by repeated doses of 2 to 4 mg. of atropine sulphate intravenously at 5 to 10 minutes interval. As much as 25 to 50 mg. of atropine may be required in a day. The need for further atropine administration is guided by the continuance of symptoms. Extent of salivation is a useful criterion for dose adjustment. 2. Dissolve 1-2 gm of 2 PAM in 10 ml distilled water and inject intravenously very slowly for 10-15 minutes. First Aid : 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomit us is clear. Do not induce vomiting if the the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled take th patient in fresh air. Symptoms of poisoning : Headache, giddiness, blurred vision, diarrhoea, nervousness, vomiting, nausea, sweating, excessive lacrimation and salivation, vertigo. Recommendations: It is recommended to control hispa, leaf-roller, gall midge, stem borer of paddy, aphid, bollworms, whitefly & cutworm of cotton, insects of vegetables, fruits and to control termite in building and wood and seed treatment & soil treatment. Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

Regn.No / రిజి నం. : **CIR-111269/2014-Chlorpyriphos (EC) (344)-74**

Mfg.Lic.No / उत्पादक लायसैंस. न. : **019/TS-IML/2016 Dt. 23-7-2016**

Manufactured & Marketed by :

Aegis™

Agro Chemicals India Private Limited
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY
# 237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295. Telangana State.

In Case of any Consumer Complaints Contact, "Manager Customer Care" Cell No.: +91 84980 99536
Email : aegisagrochemicals@gmail.com
Website : www.aegisagro.in
(Address as of Aegis Agro Sangareddy Dist, T.S.)

Net Contents : **1ℓ**
उतशुद्ध सामग्री :

Batch No :
बैच नं. :

Mfg.Date :
उत्पादन तिथि :

Exp.Date :
निष्प्रभावी होने का तिथि:

Max.Retail.Price ₹ :
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
(Inclusive of all taxes)
(सभी करों सहित)

**For Agricultural Use Only**

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. ठंडी, शुष्क जगह में गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।

**EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE**