Aegis™

Killer-505

Chlorpyriphos 50% + Cypermethrin 5% EC

Insecticide

POISON

Keep out of reach of children.
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి
मक्खे कैगे सिगदंते भद्रवागी इडिरी
बच्चों की पहुंच से दूर रखें

READ LEAFLET BEFORE USE

A product of Aegis

KILLER 505 - Chlorpyriphos 50% + Cypermethrin 5% EC - Systemic and Contact Insecticide

Chemical Composition : Chlorpyriphos a.i. Min. purity 94% ... 50.00 % w/w, Cypermethrin a.i. Min. purity 92% ... 5.00 % w/w, Emulsifier A (Blend of Cal. Salt of Alkyl benzene sulphonic acid & poly oxy ether of nony phenol ... 5.60 % w/w, Emulsifier B : Blend of Cal. Salt of Alkyl Benzene Sulphonic Acid & Polyethonoxy Propoxy ether of Fatty alcohol) ... 2.40 % w/w, Aromatic Hydrocarban solvent (like Aromax) ... Q.S. %, Total : 100.00 % w/w. **Directions of Use :** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions :** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote :** 1. Atropinize the patient immediately and maintain full atropinization by repeated doses of 2 to 4 mg. of atropine sulphate intravenously at 5 to 10 minutes interval. As much as 25 to 50 mg. of atropine may be required in a day. The need for further atropine administration is guided by the continuance of symptoms. Extent of salivation is a useful criterion for dose adjustment. 2. Dissolve 1-2 gm of 2 PAM in 10 ml distilled water and inject intravenously very slowly for 10-15 minutes. 3. Antihistamines may be given for allergic manifestation. **First Aid :** Please see enclosed leaflet. **Symptoms :** Please see enclosed leaflet. **Recommendations :** It is recommended to control Aphid, Jassid, Thrips, Whitefly, American bollworm, Spotted bollworm, Pink bollworm, Spodoptera litura of cotton and stem borer and leaf folder of paddy. **CAUTION : "NOT TO BE USED ON CROPS OTHER THAN SPECIFIED ON THIS LABEL/LEAFLET".**

Regn.No / रजि नं. :

CIR-141662/2017-Chlorpyriphos + Cypermethrin (EC)(377)-421

Mfg.Lic.No / उत्पादक लायसेंस. न. : **019/TS-IML/2016 Dt. 23-7-2016**

Manufactured & Marketed by :

Aegis™
Agro Chemicals India Private Limited
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY
237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295. Telangana State.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" Cell No.: +91 8498099536
Email: aegisagrochemicals@gmail.com / Website : www.aegisagro.com
(Address as of Aegis Agro Sangareddy Dist, T.S.)

Net Contents : **1 ℓ**
उतशुद्ध सामग्री :

Batch No :
बैच नं .:

Mfg.Date :
उत्पादन तिथि:

Exp.Date :
निष्प्रभावी होने का तिथि:

Max.Retail.Price ₹ :
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
(Inclusive of all taxes)
(सभी करों सहित)

For Agricultural Use Only

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. ठंडी, शुष्क जगह में गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

కిల్లర్ 505 - క్లోర్‌పైరిఫాస్ 50% + సైపర్‌మెథ్రిన్ 5% ఇసి. (అంతర్వ్యాపిత & స్పర్శవిషగుణ కీటకనాశిని)

మిశ్రమము: క్లోర్‌పైరిఫాస్ (టెక్నికల్) (మూలపదార్థం 94% భా/భా ఆధారంగా) ... 50.00% భా/భా, సైపర్‌మెథ్రిన్ (టెక్నికల్)... 5.0% భా/భా (మూలపదార్థం 92% భా/భా ఆధారంగా), ఎమల్సిఫయిఎర్ -ఎ (బ్లెండ్ ఆఫ్ బనానిక్ & నాన్-బనానిక్), బ్లెండ్ ఆఫ్ బనానిక్ & నాన్-బనానిక్), బ్లెండ్ ఆఫ్ కాల్షియం, సాల్ట్ ఆఫ్ ఆల్కైల్, బెంజీన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ & పాలీ ఎథిలిన్ ఈథర్, నానయిలో ఫీనైల్ ... 5.6% భా/భా, ఎమల్సిఫయిఎర్-బి (బ్లెండ్ ఆఫ్ బనానిక్ & నాన్-బనానిక్), బ్లెండ్ ఆఫ్ కాల్షియం, సాల్ట్ ఆఫ్ ఆల్కైల్, బెంజీన్, సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ & ఎథిలిన్ ప్రొపైల్ ఈథర్ ఆఫ్ ఫాటీ ఆల్కహాల్ ... 2.4%... భా/భా, ఆరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్ సాల్వెంట్ (ఎరోమాక్స్)... క్యు.ఎస్., మొత్తం... 100.00% భా/భా. ఉపయోగించవలసిన విధానము : జతపరచిన కరపత్రమును పూర్తిగా చదవండి. ముందు జాగ్రత్తలు: 1. మందును ఆహారపదార్థములు, ఖాళీపాత్రలు మరియు పశుగ్రాసముల మంచి మూసివుంచి భద్రపరుచుకోవలెను. 2. ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు అంటనీయరాదు. 3.మందును పీల్చరాదు. 4. ఉపయోగించిన తరువాత కలుషితమయ్యిన మరియు శరీరభాగములను బాగుగా శుభ్రపరుచుకోవలెను. 5. పొగత్రాగుట, త్రాగుట, తినుట మరియు పిల్లల సమీపంలో పంటిని మందును ఉపయోగించువున్నపుడు చేయరాదు. 6. మందు ప్రాణాలను కలుపువుండు మరియు ఉపయోగించువున్న సందర్భమున దుస్తులను ధరించవలెను. విషప చికిత్స: రోగికి వెంటనే ఎట్రోపిన్ మోతాదు ఇవ్వాలి. అనేక గంటలవరకు 5 మంచి 10 మిచివాల వ్యవధిలో 2-4 మి.గ్రా.ల ఎట్రోపిన్ ఇంజెక్షన్లు ఇంకా కొనసాగిస్తూ ఎట్రోపిన్ ఇవ్వాలి ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒకరోజుకు 25 మంచి 50 మి.గ్రా. ఐ ఆవసరం కావచ్చును. ఎట్రోపిన్ మోతాదుని వేటి మంచి లాంటలం ఎలింగా ఐయుటికి పద్ధతిని అవ్వడానికి బట్టి నిర్ణయించవచ్చును. 1-2 గ్రా. 2 పి.ఎ.పి.ఎమ్. 10 మి.లీ.ల పిళ్ళలో కరిగించి, 5-10 నిమిషాల వ్యవధి తీసుకుంటూ మెల్లమెల్లగా నరాలలోకి ఎక్కించవచ్చును. ప్రత్యేక చికిత్స: జతపరచిన కరపత్రమును పూర్తిగా చదవండి. నిరుపయోగ: ప్రత్యేకించి ఫళాన విరుగుడు అంటూ సిఫారిదు. విషలక్షణాలు బట్టి చికిత్స జరిపించాలి. విషలక్షణాలు : జతపరచిన కరపత్రమును పూర్తిగా చదవండి. సిఫారిసులు: పైత్రికి ఆశించే చిమ్మదోష, దీనుపు పురుగు, తెల్లదోష, అమెరికన్ బోల్ వర్మ్స్, స్పాటెడ్ బోల్‌వర్మ్ వంటి కీటకాలను సమర్థవంతంగా అరికడుతుంది. హెచ్చరిక: జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపై ఈ మందును ఉపయోగించవలెను. మిగతా పైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

కిల్లర్ ५०५ - क्लोरोपैरिफास ५०% + सैपरमेत्रिन ५% ई.सि. (अंतप्रहावी एवं स्पर्शीय कीटनाशक)

रासायनिक संरचना : क्लोरपायरिफॉस टेक्निकल : न्यूनतम शुद्धता ९४ प्रतिशत ... ५०.०० % भार/भार, सायपरमेथ्रिन स.त.: न्यूनतम शुद्धता ९२ प्रतिशत ... ५.०० % भार/भार, इमल्सिफायर (अ) : क्लैंड ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ अल्काईल बेन्जीन सल्फोनिक एसिड एण्ड पॉली ऑक्सी ईथर ऑफ नोनी फिनॉल ... ५.६० % भार/भार, इमल्सिफायर (ब) : क्लैंड ऑफ कैल्शियम सात्ट ऑफ एलकाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड एण्ड पॉली इथोनॉक्सी प्रोपॉक्सी इथर ऑफ फैटी अल्कोहॉल ... २.४० % भार/भार, एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन घोलक (एरोमैक्स) : पर्याप्त मात्रा %, योग... १००.०० % भार/भार । उपयोग के लिए निर्देश : उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ: खाद्यसामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुंह, त्वचा और आंखों के संपर्क से बचाएं। ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचाएं। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपडो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६.छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें। सुरक्षात्मक कपडे पहनो विषनाशक :१. रोगी को तुरंत एट्रोपिन दीजिए और इसकी २ से ४ मि.ग्रा. तक की खुराक ५ से १० मिनट के अंतराल पर अंत:शिरा द्वारा लगातार देते हुए पूर्ण एट्रोपिनाइज़न रखिए। एक दिन में एट्रोपिन सल्फेट की अधिक से अधिक २५ से ५० मि.ग्रा. तक की मात्रा की आवश्यकता पड़ सकती है। एट्रोपिन सल्फेट की और मात्रा लक्षणों के बरकरार रहते दी जा सकती है। एट्रोपिन की कितनी खुराक देनी चाहिए इसके लिए मुँह से निकलने वाली लार एक लाभदायक कसौटी है। २. १ से २ ग्राम. २ पी.ए.एम. १० मि.ली. आसुत जल में घोलकर अंत:शिरा द्वारा बहुत धीरे धीरे १० से १५ मिनट में देना चाहिए। ३. एलर्जी के लिए एंटीहिस्टेमिंस दिए जा सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा : कृपया संलग्न लीफलेट देखें। लक्षण : कृपया संलग्न लीफलेट देखें। उपयोग : इस कीटनाशक का उपयोग कपास के माहु, तेला, चुरदा, सफेद मक्खी, अमेरिकन डोंडे की सूंडी, चित्तीदार डोंडे की सूंडी, गुलाबी डोंडे की की सुंडी, तम्बाकु की सूंडी तथा धान के तना छेदक व पत्ता मोड़क की रोकथाम के लिए किया जाता है। चेतावनी : इस लेबल /हस्तपत्रिका मे दी फसलो के आलावा अन्य किसी भी फसल पर इसका उपयोग न करें।

ಕಿಲ್ಲರ್ 505-ಕ್ಲೋರ್‌ಪೈರಿಫಾಸ್ 50%-ಸೈಪರ್‌ಮೆಥ್ರಿನ್ 5% ಇಸಿ (ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪಿಕ, ಸ್ಪರ್ಶಚರ್ಯಗಳ ಕೀಟನಾಶಕ)

ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಣಃ ಕ್ಲೋರ್‌ಪೈರಿಫಾಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್... 50.00%ಭಾ/ಭಾ, (ಮೂಲಪದಾರ್ಥ 100%ಭಾ/ಭಾ ಆಧಾರವಾಗಿ), ಸೈಪರ್‌ಮೆಥ್ರಿನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್...5.00% ಭಾ/ಭಾ (ಮೂಲಪದಾರ್ಥ 100%ಭಾ/ಭಾ ಆಧಾರವಾಗಿ), ಎಮಲ್ಸಿಫಿಯರ್-ಎ...5.6% ಭಾ/ಭಾ, (ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಫ್ ಐನಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಐನಾನಿಕ್), ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಲ್ಕೈಲ್, ಬೆಂಜೀನ್, ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಯಾಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಪಾಲೀಎಥಿಲೀನ್ ಈಥರ್, ನಾನಯಿಲ್ ಫಿನೈಲ್, ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯರ್-ಬಿ...2.40% ಭಾ/ಭಾ, (ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಫ್ ಐನಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್-ಐನಾನಿಕ್), ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಲ್ಶಿಯಂ, ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್, ಬೆಂಜೀನ್, ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಯಾಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಪಾಲೀಎಥಿಲೀನ್ ಈಥರ್ ಆಫ್ ಪಾಟೀ ಆಲ್ಕಹಾಲ್, ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೊಕಾರ್ಬನ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ (ಎರೋಮಾಕ್ಸ್)...ಕ್ಯುಎಸ್, ಮಾತ್ರ...100.00% ಭಾ/ಭಾ. ಔಷಧೋಪಚಾರಃ ರೋಗಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಅಟ್ರೋಪಿನ್ ಕುಡಿಸಿ 2 ರಿಂದ 4 ಮಿ.ಗ್ರಾ. 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ದಿನಕ್ಕೆ 45 ರಿಂದ 50 ಮಿ.ಗ್ರಾ. ಅಟ್ರೋಪಿನ್ ಬೇಕಾಹಬಹುದು. 1-2ಗ್ರಾಂ. 2 ಪಿ.ಎ.ಎಮ್. ಅನ್ನು 10 ಮಿ.ಲೀ. ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀರಿಸಿ, 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಭಿದಮನಿಯ ಮೂಲಕ ಶರೀರ ಸೇರುವಂತೆ ಸೋಡಿಕ್ಯೂಳ್ಳಿ. ಅಳಸಲು ಮುಚ್ಚಿರಿಕೆಗಳು: ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರಸುವಾಗ ತುಳುಕಿ, ಚಿಲ್ಲಿ ಮೈಮೇಲಿ ಬೀಳದರಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಖಾಲಿಯಾದ ಡಬ್ಬ, ಕಂಟೈನರ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಹೋಗಬಿಡಿ.ಸೊಚನೆಃ ಹತ್ತಿಯ ಬೆಳೆಯನ್ನಾಶ್ರಮಿಸುವ ಗಿಡಹೇನು, ಜಾಸಿಡ್ ಸಸ್ಯಕೀಟ, ಹತ್ತಿಕಾಯಿ, ಕೆಂಪಿನೆಯ ಹತ್ತಿಕಾಯಿ ಪರಿಣಾಮಕರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಈ ಲೇಬಲ್/ವಿವರಣಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಲಾದ ಹೊರತಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬಾರದು.

கில்லர் 505- க்ளோர்பைரிட்:பாஸ் 50% + சைபர்மெத்ரின் 5% EC (கணடுறுவும் மற்றும் தொடர்பு பூச்சிக்கொல்லி)

இரசாயனகலவை : க்ளோர்பைரிபோஸ் a.i. குறைந்தபட்சதூய்மை 94% .... 50.00% w/w, சைப்பர்மெத்ரின் a.i. குறைந்தபட்சதூய்மை 92%....5.00% w/w, எமுல்சிபையர் A (கால்சியம், பென்சைனல் சல்ஃபோனிக் அமில உப்பு மற்றும் நோனி பினாலின் பாலி ஆக்சி ஈதர் .... 5.60% w/w, எமுல்சிபையர் B : (கால்சியம், ஆல்கைல் பென்சைனல் சல்ஃபோனிக் அமிலம் மற்றும் ஃபேட்டி ஆல்கஹாலின் பாலிஎதனாக்சி பிராபாக்சி ஈதர் கலவை) .... 2.40%w/w, நறுமணமிக்க ஹைட்ரோகார்பன் கரைசல் (அரோமேக்ஸ் போன்று) .... Q.S.%, மொத்தம் : 100.00% w/w. **உபயோகிபயத்தகானவழிகாட்டு நெதிகள்** : உபயோகிக்குமுன், இணைக்கப்பட்டுள்ள சிற்றேட்டை படிக்கவும். **முன்னெச்சரிக்கைகள்:** 1. உணவுப்பண்டங்கள், காலி உணவுப்பண்ட கொள்கலன்கள் மற்றும் விலங்கு தீவனங்களிலிருந்து தூரமாக வைக்கவும். 2. வாய், கண்கள் மற்றும் சருமத்துடன் தொடர்பு உண்டாவதை தவிர்க்கவும். 3. ஸ்ப்ரே புகையை முகர்வதை தவிர்க்கவும். காற்று வீசும் திசையில் ஸ்ப்ரே செய்யவும். 4. ஸ்ப்ரே செய்தபின்னர், கலைபட்ட துணிகள் மற்றும் உடல் பாகங்களை நன்றாக கழுவவும். 5. ஸ்ப்ரே செய்யும் போது புகை பிடிக்கவோ,ஏதையும் சாப்பிடவோ அல்லது மெல்லவோ கூடாது. 6. கலக்கும்போதும், ஸ்ப்ரே செய்யும் போதும், முழு பாதுகாப்பு உடைகளை அணியவும். **விஷ முறிவு** : 1. நோயாளியை உடனடியாக ஆட்ரோபைனைஸ் செய்து, அதன் பிறகு 5-லிருந்து 10 நிமிட இடைவேளையில், நரம்புவழி மூலம் 2-லிருந்து 4 மிகி. அட்ரோபைன் சல்பேட் -ஐ மீண்டும் மீண்டும் செலுத்துவது மூலம் முழு அட்ரோபைனைசேஷனை பராமரிக்கவும். ஒரு நாளைக்கு 25-லிருந்து 50 மிகி. அட்ரோபைன் தேவைப்படலாம். அறிகுறிகள் தொடர்வதற்கேற்ப,இன்னும் அதிக அட்ரோபைன் உபயோகிப்பது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. வாயில் எவ்வளவு எச்சில் ஊறுகிறது என்பதை பொறுத்து டோஸ் அட்ஜஸ்ட் செய்யப்படுகிறது. 2. 10மிலி. டிஸ்டில்ட் தண்ணீரில் 2 PAM -ன் 1-2 கிராமை கரைத்து, மிகவும் மெதுவாக, நரம்புவழி மூலம் 10-15 நிமிடங்களுக்கு உள்ளுக்கு செலுத்தவும். 3. ஒவ்வாமை வெளிப்பாடுகளுக்கென, ஆன்டிஹிஸ்டாமைன்ஸ்-ஐ தரலாம். **முதலுதவி:** தயவுசெய்து இணைக்கப்பட்ட சிற்றேட்டை பார்க்கவும். **அறிகுறிகள்:** தயவுசெய்து இணைக்கப்பட்ட சிற்றேட்டை பார்க்கவும். **பரிந்துரைகள்:** அசுவணி, வெள்ளை இலைதத்துப்பூச்சி, பேன்கள், வெள்ளை ஈ, அமெரிக்க பருத்திக்காய் புழுக்கள், புள்ளி பருத்திக்காய் புழுக்கள், பருத்தியின் ஸ்பாடோட்ப்டெரா லிட்டுரா மற்றும் நெல்லின் தண்டு துளைப்பான் மற்றும் இலை சுருட்டுப் புழு போன்றவற்றை கட்டுப்படுத்தஉபயோகிக்கப்படுகிறது. **எச்சரிக்கை:** "இந்த லேபிள் / சிற்றேட்டில் குறிப்பிடப்பட்டவற்றறவிடுத்து வேறுஎந்தபயிர் மீதும் உபயோகிக்கக் கூடாது".