Chloro-10G_1kg_Size : Open Size : 254X187mm (Without Pasting) Ref : Soldier 3_Aegis

CHLORPYRIPHOS 10% GR
CHLORO-10G
INSECTICIDE

Read enclosed leaflet before use. उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े । ఉపయోగించుటకు ముందు జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి.

क्लोरो -10 जी - क्लोरपायरिफॉस 10% जी.आर. (कीटनाशक)

रासायनिक संरचना : क्लोरपायरिफॉस स.त. ... 10.000% भार/भार, सॉल्वेंट एरोमैक्स (उत्पादन के दौरान उड जाता है) ... 2.000% भार/भार, इनर्ट ग्रेन्यूल्स बेंटोनाइट 850/420 माइक्रोंस : पर्याप्त मात्रा % भार/भार, योग : 100.000% भार/भार । **उपयोग के लिए निर्देश :** उपयोग के लिए संलग्न लीफलेट पढें । **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ :** 1. खाद्यसामग्री, खाद्यसामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें । 2. मुँह, त्वचा और आंखों के संपर्क से बचाएं । 3. प्रयोग करते समय सांस द्वारा अंदर जाने से बचाएं । 4. प्रयोग करने के बाद दूषित कपडों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं । 5. प्रयोग करते समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नही चाहिए । 6. प्रयोग करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें जैसे दस्ताने, जूते, मास्क, रबड एप्रन, टोप आदि पहनने चाहिए । **विषनाशक :** 1. रोगी को तुरंत एट्रोपिन दीजिए और इसकी 2 से 4 मि.ग्रा. तक की खुराक 5 से 10 मिनट के अंतराल पर अंत:शिरा द्वारा लगातार देते हुए पूर्ण एट्रोपिनाइज रखिए । एक दिन में एट्रोपिन सल्फेट की अधिक से अधिक 25 से 50 मि.ग्रा. तक की मात्रा की आवश्यकता पड सकती है । एट्रोपिन सल्फेट की और मात्रा लक्षणों के बरकरार रहते दी जा सकती है । एट्रोपिन की कितनी खुराक देनी चाहिए इसके लिए मुँह से निकलने वाली लार एक लाभदायक कसौटी है । 2. 1 से 2 ग्राम 2 पी.ए.एम. 10 मि.ली. आसुत जल में घोलकर अंत:शिरा द्वारा बहुत धीरे धीरे 10 से 15 मिनट में देना चाहिए । **प्राथमिक चिकित्सा :** कृपया संलग्न लीफलेट पढें । **लक्षण :** कृपया संलग्न लीफलेट पढें । **उपयोग :** धान के तना-छेदक, पत्ता लपेटक व गालमिज कीटों की रोकथाम के लिए किया जाता है । **सावधानी : लेबल / पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलवा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है ।**

క్లోరో - 10జి - క్లోరోపైరిఫాస్ 10 % జి.ఆర్. (కీటకనాశని)

రసాయన మిశ్రమము : క్లోరోపైరిఫాస్ ఎ.ఐ. ... 10.000 % భా/భా, సాల్వెట్ ఆరోమాక్స్ (ఎవాప్రేటెడ్ డ్యూరింగ్ మాన్యుపాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ... 2.000% భా/భా, ఇనర్ట్ గ్రాన్యుల్ (బెంటోనేట్) (850/420 మైక్రాన్స్) ... క్యూ.యస్.% భా/భా, మొత్తం ...100.00% భా/భా. **ఉపయోగించుటకు సూచనలు :** దయచేసి జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి. **ముందు జాగ్రత్తలు :** 1. మందును ఆహారపదార్థములు, ఖాళీపాత్రలు మరియు పశుగ్రాసముల నుండి దూరముగా భద్రపరచవలెను. 2. ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు అంటనీయరాదు. 3. మందును పీల్చరాదు. 4. ఉపయోగించిన తరువాత కలుషితదుస్తులు మరియు శరీరభాగములను బాగుగా శుభ్రపరుచుకొనవలెను. 5. పొగత్రాగుట, త్రాగుట, తినుట మరియు ఏదైన నములుట వంటివి మందును ఉపయోగించునప్పుడు చేయరాదు. 6. మందు ద్రావణమును కలుపునపుడు మరియు ఉపయోగించునపుడు సురక్షితమైన దుస్తులను ధరించవలెను. **ప్రథమచికిత్స:** జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి. **విరుగుడు :** 1) వెంటనే రోగికి అట్రోపినైజేషన్ చేయాలి. అలా పూర్తి అట్రోపినైజేషన్ అయ్యేంతవరకూ 2 నుండి 4 మి.గ్రా అట్రోపిన్ సల్ఫేట్‌ను నరాల్లో గుండా 5 నుండి 10 నిమిషాల వ్యవధినిస్తూ తిరిగి తిరిగి ఎక్కిస్తూ వుండాలి. అలారోజుకు 25 నుండి 50 మి.గ్రా. అట్రోపిన్ మోతాదు అవసరం వుంటుంది. ఒకవేళ అలా లక్షణాలు కనబడుతూవుంటే, ఇంకా అట్రోపిన్ ఎక్కించాల్సిన అవసరం ఉంది. అంతేగాక నోటినుండి సొంగకారడం కూడా అట్రోపిన్ మోతాదు సర్దుబాటు చేసుకోడానికి అవసరమవుతుంది. 2) 10 మి.లీ. డిస్టల్డ్ వాటర్‌లో 1-2 గ్రాముల 2 పి.ఎ.ఎమ్.ను కలిపి నెమ్మదిగా 10-15 రోజుల వరకూ నరాల్లోగుండా ఎక్కించాలి. **లక్షణాలు :** జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి. **సిఫారసులు :** క్లోరిపైరిఫాస్ 10% జిఆర్. వరి పంటను ఆశించు కాండం తొల్చు పురుగు ఆకుమచ్చ, ముడుత, సుడిదోమ, ఆకుచుట్టు ,ఉల్లికోడు, మిడుతలను సమర్థవంతంగా అరికట్టు కీటకనాశని. గమనిక : **ఈ లేబుల్ / లీఫ్‌లెట్‌లో** నిర్దేశించబడ్డ పంటలకు తప్ప మరి దేనికి వాడరాదు.

ಕ್ಲೋರೀ - 10 ಜಿ - ಕ್ಲೋರಿಪೈರಿಫಾಸ್ 10% ಜಿಆರ್ (ಕೀಟನಾಶಕ)

ರಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ :ಕ್ಲೋರಿಪೈರಿಫಾಸ್ ಸ.ಪ. ... 10.000%ತೂಕ/ತೂಕ, ದ್ರಾವಕ ಆರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ (ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ) ... 2.000%ತೂಕ/ತೂಕ, ಜಡ ಕಣಗಳು (ಬೆಂಟೋನೈಟ್) (850/420ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್) ... ಕ್ಯುಯಸ್%, ಒಟ್ಟು ... 100.000%ತೂಕ/ತೂಕ. **ಬಳಕೇಯ ದಿಕ್ಕುಗಳು:** ದಯವಿಟ್ಟು ಬಳಕೆಯ ಮೊದಲು ಸುತ್ತುವರಿದ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ. **ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು:** 1) ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಖಾಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. 2) ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 3) ಬಳಸುವಾಗ ಉಸಿಪಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 4) ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. 5) ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದು, ಕುಡಿಯುವುದು, ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಆಗಿಯಬೆಡಿ. ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. **ಪ್ರತಿಕಾಯ:** 1) ರೋಗಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಟೋರೋನ್ಯೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 4 ಮಿಗ್ರಾ. ಗಳಷ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಟೋಪ್ಪಿನ್ಯೆಸೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಮಧ್ಯಂತರಪದಿಲ್ಲಿ ಅಚಟ್ರೋಪ್ವರಿನ್ ಸಲ್ಪೇಟ್ ನ ಒಳಚರ್ಮನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 25 ರಿಂದ 50 ಮಿಗ್ರಾಂ ಅಟ್ರೋಪಿನ್ ಆಗತ್ಯವಿರಬಹುದು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಟ್ರೋಪ್ವರಿತ್ ಆಡಬಳಿತದ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಉಸಿರಾಟದ ವಿಸ್ತಾಪವು ಡೋಸ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. 2) 2 ಪಿಎಂನ 1-2 ಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು 10 ಮಿಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೇಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. **ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ:** ಸುತ್ತುವರಿದ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ. **ಲಕ್ಷಣಗಳು:** ಸುತ್ತುವರಿದ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ. **ಶಿಫಾರಸುಗಳು:** ಇದು ಸ್ಟೀಮ್ ಬೋರರ್, ಲೀಫ್ ರೋಲರ್ ಗ್ಯಾಲ್ ಮಿಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಭತ್ತ ಆನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. **ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಈ ಲೇಬಲ್ /ವಿವರಣಾ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಲಾದ ಹೊರತಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬಾರದು.**

In Case of any Consumer Complaints Contact, : **"Manager Customer Care" Cell No.: +91 84980 99536**
Email : aegisagrochemicals@gmail.com | Website : www.aegisagro.in
AEGIS AGRO CHEMICALS INDIA PRIVATE LIMITED
237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295. Telangana State

---

Aegis™

CHLORPYRIPHOS 10% GR
CHLORO-10G
INSECTICIDE

క్లోరో-10 జి क्लोरो-10जी ಕ್ಲೋರೋ-10 ಜಿ



Keep out of reach of children
बच्चों की पहुँच से दूर रखें।
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

Please read attached leaflet before use.
Keep in a Cool & Dry Place.
Keep away from Heat & Open Flame.
If swallowed or if symptoms of poisoning occurred call physician immediately.

Net Weight :
1 Kg.

CHLORPYRIPHOS 10% GR
CHLORO-10G
INSECTICIDE

CHLORO -10 G - Chlorpyriphos 10 % GR (Insecticide)

Chemical Composition : Chlorpyriphos a.i. ... 10.000% w/w, Solvent Aromax (Evaporated during manufacturing process) ... 2.000% w/w, Inert granules (Bentonite) (850/420 microns) ... Q.S. %, Total : 100.000% w/w. **Directions of Use :** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions :** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation while using. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after broadcasting. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while broadcasting. 6. Wear full protective clothing while broadcasting. **Antidote :** 1. Atropinize the patient immediately and maintain full atropinization by repeated doses of 2 to 4 mg. of atropine sulphate intravenously at 5 to 10 minutes interval. As much as 25 to 50 mg of atropine may be required in a day. The need for further atropine administration is guided by the continuance of symptoms. Extent of salivation is a useful criterion for dose adjustment. 2. Dissolve 1-2 gm of 2 PAM in 10 ml distilled water and inject intravenously very slowly for 10-15 minutes. **First Aid :** Please see enclosed leaflet. **Symptoms :** Please see enclosed leaflet. **Recommendations :** It is used to control Stem Borer, Leaf roller Gall midge of Rice. **Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.**

Keep out of reach of children. बच्चों की पहुंच से दूर रखें।
जहर
விஷம்
ವಿಷ విషము
POISON
పిల్లలకు అందకుండా ఉంచండి ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಡಿರಿ

Regn.No / रजि नं. : **CIR-273759/2023-Chlorpyriphos (GR) (444)-819**

Mfg.Lic.No / उत्पादक लायसैंस. न. : **019/TS-IML/2016 Dt. 23-7-2016**

Manufactured & Marketed by :
Aegis™
Agro Chemicals India Private Limited
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY
# 237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M),
Sangareddy Dist - 502295. Telangana State.

Net Weight / कुल भार: : **1kg**
Batch No / बैच नं. :
Mfg.Date / उत्पादन तिथि :
Exp.Date / निष्प्रभावी होने का तिथि: :
Max.Retail.Price ₹ / अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
(Inclusive of all taxes) (सभी करों सहित)
Unit Sale Price : Per ml ₹ / (यूनिट बिक्री मूल्य: प्रति मिली.रु.) ₹ :

For Agricultural Use Only
Keep in cool, dry place away from heat and open flame. ठंडी, शुष्क जगह में गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE