Chlorpyriphos 10% GR
(Insecticide)

Chlorpyriphos 10% Granules is used to control for Rice insects which contains 10% Chlorpyriphos active ingredient.

Recommendation :

Crop (s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
		AI (gm)	Formulation (Kg)		
Rice	Stem Borer, Leaf Roller, Gall midge	1000	10	-	30

Cautionary statement: Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets. Destroy the container after use as directed on leaflet.

Direction Of Use: P.P. Equipment:- Recommended dosage for granules should be broadcasted using hand operated granule applicator or mechanical dispenser. For application in Rice 2-3 cm standing water should be available in the field. Keep water impounded for 2-3 days after application.

Precaution: 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation while using. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after broadcasting. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while broadcasting.

Phytotoxicity: The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Symptoms Of Poisoning: Headache, giddiness, vertigo, nausea, vomiting, blurred vision, diarrhoea, convulsions sweating. excessive lacrimation and salivation may occur.

First Aid: 1.If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Antidote : 1. Atropinize the patient immediately and maintain full atropinization by repeated doses of 2 to 4 mg. of atropine sulphate intravenously at 5 to 10 minutes interval. As much as 25 to 50 mg. of atropine may be required in a day. The need for further atropine administration is guided by the continuance of symptoms. Extent of salivation is a useful criterion for dose adjustment. 2. Dissolve 1-2 gm of 2 PAM in 10 ml distilled water and inject intravenously very slowly for 10-15 minutes.

Disposal Of Used Container : 1. Empty containers shall be broken & burried away from habitation. 2. The user should container or packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages or surplus material & washings should be disposed off in a safe manner as to prevent environmental or water pollution.

Storage Conditions : 1. The packages containing the material shall be stored in separate rooms or premises away from the room or premises for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock key depending upon the quantity and nature off material. 2.The room or premises meant for storing the material shall be well built, dry well-lit, ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapours.

Chemical Composition:

Chlorpyriphos a.i:	10.000% w/w
Solvent Aromax (Evaporated during manufacturing process):	2.000% w/w
Inert granules (Bentonite) (850/420 microns)	Q.S. to make 100
Total:	**100.000% W/W**

क्लोरपायरिफॉस १० प्रतिशत जी.आर.
(कीटनाशक)

यह एक दानेदार कीटनाशक है जिसमें क्लोरपायरिफॉस १० प्रतिशत सक्रिय तत्व मिलें है जिससे चावल के कीट समूह की रोकथाम होती है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टर मात्रा		पानी की मात्रा (लीटर)	अंतिम छिडकाव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिनो में)
		स.तत्व (ग्राम)	संरचना (कि.ग्रा.)		
चावल	तना छेदक पता लपेटक गाल मिज़	१०००	१०	–	३०

सावधानियां : लेबल और पर्ची पर जो अभिदत्त है, उससे भिन्न और अन्य प्रयोजन में उपयोग के लिए नही । पर्ची के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात् आद्यान को नष्ट करें।

उपयोग के लिये निर्देश: हाथ से चलाने वाला ग्रेन्युल एप्लिकेटर, लीफहोर्ल एप्लिकेटर, मशीन से चलने वाला डिस्पर्सर या रबड के दस्ताने पहन कर हाथ से।

प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानियाँ : १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें। २. मुंह, त्वचा और आंखों के संम्पर्क से बचायें। ३. प्रयोग करते समय सांस द्वारा अन्दर जाने से बचाये। ४. प्रयोग करने के बाद दूषित कपडो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। ५. प्रयोग करते समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. प्रयोग करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें जैसे दस्ताने जुते मास्क रबर एप्रान टोप आदि पहनीने चाहिये।

पौध विशाक्तता: सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविशाक्त नहीं हैं।

विष के लक्षण: सिरदर्द, चक्कर आना, धुंधला दिखना, मितली, उल्टी, दस्त, झटके (मिरगी) अधिक पसीना आना, आंसू आना और लार टपकना हो सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा: १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। २. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपड़े उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग १०–१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

विष नाशक : रोगी को तुरन्त एट्रोपिन दिजिए और इसकी २ से ४ मि.ग्रा. तक की खुराक ५ से १० मिनट के अन्तराल पर अन्त:शिरा द्वारा लगातार देते हुए पूर्ण एट्रोपिनाइज रखिए। एक दिन में एट्रोपिन सल्फेट की अधिक से अधिक २५–५० मिग्रा. तक की मात्रा की आवश्यकता पड सकती हैं। एट्रोपिन सल्फेट की और मात्रा लक्षणों के बरकरार रहते दी जा सकती हैं। एट्रोपिन की कितनी खुराक देनी चाहिए इसके लिए मुंह से निकलने वाली लार एक लाभदायक कसौटी हैं। २. १ से २ ग्राम पी.ए.एम. १० मि.ली. आसुत जल में घोलकर अन्त:शिरा द्वारा बहुत धीरे धीरे १० से १५ मिनट मे देना चाहिए।

खाली डिब्बो का निपटारा : कीटनाशक निर्माताओं या उपयोग कर्ता का कर्त्तव्य हैं कि पैकेज, मशीन की धुलाई बची हुई सामग्री आदि की निकासी की व्यवस्था ऐसी सुरक्षित से करना चाहिए, ताकि इनसे पानी, वातावरण व चारे दुषित न हो। खाली डिब्बों और पैकेज को तोडकर आबादी से दूर गाढ देना चाहिए। खाली डिब्बों को तोडकर जमीन में ५० से.मी. नीचे गाढ दे, जहां भूमिगत पानी न हो। खाद्य पदार्थ और पानी रखने के लिए खाली डिब्बों का उपयोग न करे। खाली डिब्बों को दुबारा काम में लेना रोकने लिए बाहर न छोडे।

संग्रहण की शर्तें: १. कीटनाशक के पैकजों को अलग–अलग कमरों या जगहों में खाद्य पदार्थ रखें जाने वाले कमरो अथवा जगहो से अलग–अलग आलमारियों में ताला चाबी के अंदर रखा जाना चाहिए। २. जिस जगह या कमरे में कीटनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, हवादार, प्रकाशयुक्त, व पर्याप्त लम्बा चौडा होना चाहिए जिससे कि कीटनाशक के भाप प्रदूषण होने का डर न होने पाये।

रासायनिक संरचना :

क्लोरपायरिफॉस स.त.:	१०.०००% भार/भार
सोलवेंट एरोमेक्स (उत्पादन के दौरान उड़ जाता हैं):	२.०००% भार/भार
इनर्ट ग्रेन्यूलस 'बेन्टोनाइट' '८५०/४२० माइक्रोन्स'	पर्याप्त मात्रा
योग:	**१००.०००% भार/भार**

క్లోరిపైరిఫాస్ 10%జిఆర్
(కీటకనాశని)

క్లోరిపైరిఫాస్ 10% గుళికలు పరిలో వచ్చే కీటకాలని నియంత్రించడానికి వాడతారు, ఇందులో 10% క్లోరిపైరిఫాస్ క్రియాశీల పదార్ధం ఉంటుంది.

సిఫారసులు:

వంట (లు)	కీటకం పేరు	మోతాదు/ హెక్టారుకు		నీటి మోతాదు (లీ)	చివరి పిచికారి నుండి కోత వరకు వేచి ఉండు కాలం (రోజులు)
		ఏఐ (గ్రాములు)	ఫార్ములేషన్ (కిగ్రా)		
వరి	కాండం తొలుచు పురుగు, ఆకు చుట్టు పురుగు, ఉల్లి కోడు	1000	10	-	30

హెచ్చరికలు : లేబుల్ మరియు కరపత్రంపై పేర్కొన్నవి కాకుండా ఇతర వాటికి వాడరాదు. వాడిన తర్వాత లీఫ్‌లెట్‌లోనూచించిన విధంగా డబ్బాని నాశనం చేయాలి.

ఉపయోగించే విధానం: పిపి ఉపకరణాలు: గుళికల కోసం సిఫారసు చేసిన మోతాదుని చేత్తో ఆపరేట్ చేసే గ్రాన్యూల్ అప్లికేటర్ లేదా మెకానికల్ డిస్పెన్సర్‌ని ఉపయోగించాలి. వరి పంట 2–3 సెంమీ పెరిగాక నీరు నిలకడగా పంట పాలంలో ఉన్నపుడు ఉపయోగించాలి. గుళికలు వెదజల్లిన తర్వాత నీరు 2–3 రోజులు నిల్వ ఉండేలా చూసుకోవాలి.

జాగ్రత్తలు : 1. ఆహార పదార్థాలకి, ఖాళీ ఆహారపు డబ్బాలకి మరియు జంతు ఆహారానికి దూరంగా ఉంచాలి. 2. నోటికి, కంటికి మరియు చర్మానికి తాకరాదు. 3. స్ప్రే రేణువులను పీల్చరాదు. గాలి వీచు దిశలో స్ప్రే చేయాలి. 4. మందు అంటుకున్న దుస్తులని మరియు శరీర భాగాలని శుభ్రంగా కడగాలి. 5. స్ప్రే చేస్తున్నపుడు పొగత్రాగరాదు, తినరాదు మరియు నమలరాదు. 6. పిచికారి చేసేటపుడు రక్షణనిచ్చే దుస్తులని వేసుకోవాలి.

ఫైటోటాక్సిసిటీ : సిఫారసు చేసిన విధంగా పాలంలో వాడినట్లయితే ఈ ప్రొడక్ట్ పంటకు హానికరం కాదు.

విషపు లక్షణాలు : తలనొప్పి, కళ్ళు తిరగడం, మైకం కమ్మటం, అలసట, వాంతులు, మూపు సరిగా లేకుండుట, డయేరియా, నీరసం, చెమటలు, కళ్ళనెంట నీరు కారటం మరియు మింగలేకపోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి.

ప్రథమ చికిత్స : 1. మింగినట్లయితే వాంతులు జరిగేలా చేయండి. వాంతులు పూర్తిగా అయ్యేలా చూడండి. రోగి స్పృహలో లేకుంటే ఇలా చేయకండి. 2. చర్మానికి, బట్టలకి అంటుకున్నట్లయితే, అంటుకున్న చర్మాన్ని , బట్టలని ఎక్కువ నీటితో మరియు సబ్బుతో కడగాలి. 3. కళ్ళలో పడితే కళ్ళని సెలైన్/శుభ్రమైన నీటితో 10 నుండి 15 నిమిషాల పాటు కడగాలి. 4. మింగినట్లయితే, రోగిని స్వచ్ఛమైన గాలిలోకి తీసుకెళ్ళాలి.

విరుగుడు: 1. యాట్రోపినైజేషన్‌ని క్రమబద్ధంగా ఉంచడానికి యాట్రోపినైజ్‌ని రోగికి 2 నుండి 4 మి.గ్రా మోతాదులో మళ్ళి మళ్ళి యాట్రోపైన్ సల్ఫేట్ 5 నుండి 10 నిమిషాల వ్యత్యాసంతో ఇవ్వాలి. 25 నుండి 50 మి.గ్రా. యాట్రోపైన్ రోజుకు అవసరం అవుతుంది. లక్షణాలను బట్టి మరింత యాట్రోపైన్ ఇవ్వాలో అక్కర్లేదో నిర్ణయించబడుతుంది. 2. 1–2 గ్రా 2 ఔఅకి 10 మిలీ శుద్ధమైన నీటిలో కలిపి 10–15 నిమిషాల వ్యత్యాసంలో నెమ్మదిగా ఇంజెక్ట్ చేయాలి.

ఖాళీ డబ్బాలని పారేయుట: 1. ప్యాకేజీలు లేదా మిశ్రమం మరియు మెషీన్ల నుండి కడుగుతున్నపుడు లేదా డబ్బాలనుండి పారేసేటపుడు సురక్షితమైన ప్రదేశాన్ని చూడాలి, పరిసరాలకు దూరంగా పారేయాలి లేదా నీటి కాలువ్యం కాకుండా చూడాలి 2. వాడిన ప్యాకేజీలని తిరిగి వాడటానికి బయట ఉంచరాదు. 3. ప్యాకేజీలని విరగొట్టి మరియు పరిసరాలకు దూరంగా పాతిపెట్టాలి.

నిల్వ పరిస్థితులు : 1. కీటకనాశినిలుగల ప్యాకేజీలను ఇతర వస్తువులను, ప్రత్యేకించి ఆహార వస్తువులను నిల్వ ఉంచే గదులకు లేదా పరిసరాలకు దూరంగా వేరే గదులలో లేదా పరిసరాలలో నిల్వ ఉంచాలి మరియు కీటకనాశిని పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని అనుసరించి తాళం మరియు తాళం చెవులుగల వేరే అల్మారిలలో ఉంచాలి. 2. కీటకనాశినిలను నిల్వ ఉంచే గదులను లేదా పరిసరాలను మెరుగుగా నిర్మించాలి, పాడిగా మరియు వెలుతురు కలిగి ఉండాలి మరియు గాలి పీసిలా ఉండాలి మరియు తేమతో కలుషితం కాకుండా ఉండేందుకు కావలసినంత వైశాల్యం కలిగివుండాలి.

రసాయన మిశ్రమం:

క్లోరిపైరిఫాస్ ఏ.ఐ:	10.000%బ/బ
సోల్వెంట్ అరోమాక్స్ (తయారీ ప్రక్రియ సమయంలో ఆవిరైపోతుంది):	2.000% బ/బ
ఇనెర్ట్ గరఆన్యూల్స్ (బెంటోనైట్) (850/420మైక్రోన్స్)	తయారీకి చాలినంత 100
మొత్తం:	**100.000% బ/బ.**

CHLORO-10G
Chlorpyriphos 10% GR
(Insecticide)
క్లోరో–10 జీ
క్లోరపాయరిఫాస్ ౧౦ ప్రతిశత జీ.ఆర్.
(కీటనాశక)
క్లోరో–10 జి
క్లోరిపైరిఫాస్ 10%జిఆర్
(కీటకనాశని)
క్లోర్పైరిపోస్ 10% జిఆర్ (కీటనాశక)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/Leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.
बच्चों से दूर रखिए।
మక్కళిగీ సిగదంతే దూరవిడి.

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.
इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढ़िये।

Manufactured & Marketed by :

Aegis™
Agro Chemicals India Private Limited
237, Main Road, Mallepally (V),
Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502 295. Telangana State.
Customer Care Manager No. +91 8498099536
Email: aegisagrochemicals@gmail.com / www.aegisagro.in
Mfg Licence No: 019/TS-IML/2016
Reg.No.: CIR-273759/2023-Chlorpyriphos (GR) (444)-819
For Agriculture use only. केवल कृषि उपयोग के लिए।

କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ୧୦% ଜିଆର

(କୀଟନାଶକ)

ଚାଉଳ କୀଟମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ୧୦% ଗ୍ରେନୁଲ୍ସ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେଉଁଥିରେ ୧୦% କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ସକ୍ରିୟ ଉପାଦାନ ରହିଛି ।

ସୁପାରିଶ:

ଫସଲ	କୀଟର ସାଧାରଣ ନାମ	ମାତ୍ରା/ହେକ୍ଟର		ଜଳରେ ମିଶ୍ରଣ	ଶେଷ ସିଞ୍ଚନରୁ ଶସ୍ୟ ଅମଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଅବଧି
		ଏଆଇ (ଗ୍ରାମ୍)	ଫର୍ମୁଲେଶନ୍ (କେଜି)	(ଲିଟର)	(ଦିନରେ)
ଧାନ	ଜାଷ୍ଟରିଆ, ପତ୍ରମୋଡା, ଗାଲ୍ ମିଜ୍	୧୦୦୦	୧୦	–	୩୦

ସାବଧାନତା: ଲେବଲ୍ ଏବଂ ଲିଫଲେଟ୍ ଉପରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେତୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନୁହଁ । ଲିଫଲେଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ଉପଯୋଗ ପରେ କଣ୍ଟେନରକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ।

ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ: ପି.ପି. ଉପକରଣ:– ଗ୍ରେନୁଲ୍ସ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ଡୋଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଚାଳିତ ଗ୍ରେନୁଲ୍ ଆବେଦନକାରୀ କିମ୍ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିତରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ପକାଇବା ଉଚିତ । ଧାନରେ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଖେତରେ ୨–୩ ସେମି ଛିଡା ହୋଇଥିବା ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ୍ । ପ୍ରୟୋଗ ପରେ ୨–୩ ଦିନ ପାଣି ଜମାକରି ରଖନ୍ତୁ ।

ପୂର୍ବତର୍କତା : ୧. ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ରଖାଯାଇଥିବା ଖାଲି ପାତ୍ର ଓ ପଶୁଚାରା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ । ୨. ଦୁଗ୍ଧ, ଆଖୁ ଓ ତ୍ୱଚା ସଂସର୍ଗରେ ଆସିବା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ । ୩. ସିଞ୍ଚନ କଣ ଶ୍ୱାସରେ ଯିବା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ । ପବନ ବୋହୁଥିବା ଦିଗରୁ ହିଁ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ୪. ସିଞ୍ଚୁା ପରେ ସଂକ୍ରମିତ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଭଲକରି ଧୁଅନ୍ତୁ । ୫. ସିଞ୍ଚନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧୂମପାନ କରିବା, ଖାଇବା, ପିଇବା କିମ୍ବା ଚୋବାଇବା ମନା । ୬. ପ୍ରସାରଣ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ।

ବିଷାକ୍ତତା : କ୍ଷେତ୍ର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଉତ୍ପାଦ ଫିଟୋଟକ୍ସିକ୍ (ବିଷାକ୍ତ) ନୁହେଁ।

ବିଷଗ୍ରସ୍ତତାର ଲକ୍ଷଣ : ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ମାନସିକ ଉତ୍ତେଜନା, ମୁଣ୍ଡ ଘୁଲାଇବା, ଡିଡିଡିଆ, ବାନ୍ତି, ଜାଇଜାଲୁଆ ଦେଖାଯିବା, ଡାଇରିଆ, କମ୍ପନ, ଝାଳ ବାହାରିବା, ଅତିରିକ୍ତ ଲାଳ୍ରିମେସନ୍ ଏବଂ ଲାଳ ଖରଣ ଘଟି ପାରେ।

ପ୍ରଥମୋପଚାର : ୧. ପେଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତତ୍କ୍ଷି ସାଙ୍ଗଲେଇ ବାନ୍ତି କରାନ୍ତୁ । ବାନ୍ତି ସଫା ଦିଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୋହରାନ୍ତୁ । ରୋଗୀ ଅଚେତ ଥିଲେ ବାନ୍ତି କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ । ୨. ଯଦି କପଡ଼ା ଓ ତ୍ୱଚା ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ କପଡ଼ା ବଦଳାନ୍ତୁ ଓ ସଂକ୍ରମିତ ତ୍ୱଚାକୁ ସାବୁନ ଲଗେଇ ପ୍ରଚୁର ପାଣିରେ ଧୁଅନ୍ତୁ । ୩. ଆଖି ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲେ, ୧୦–୧୫ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚୁର ସାଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ସାଧା ପାଣି ଛାଟନ୍ତୁ । ୪. ଶ୍ୱାସରେ ଗଲେ, ରୋଗୀକୁ ଖୋଲା ପବନକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ।

ବିଷଘ୍ନ : ୧. ତୁରନ୍ତ ରୋଗୀକୁ ଏଟ୍ରୋପିନାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ୫ ରୁ ୧୦ ମିନିଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ୨ ରୁ ୪ ଏମ୍ଜି ଏଟ୍ରୋପିନ୍ ଡୋଜ୍ ଶିରା ମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଟ୍ରୋପିନାଇଜେସନ୍ ବାଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଦୈନିକ ସର୍ବାଧିକ ୨୫ ରୁ ୫୦ ଏମ୍ଜି ଏଟ୍ରୋପିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ। ଛାରି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକକ୍ଷ ଏଟ୍ରୋପିନ୍‌ର ଆବଶ୍ୟକତା ଗାଇଡ୍ ହୋଇଥାଏ। ଲାଳଖରଣ ପରିସର ଡୋଜ୍ ଏଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ ଉପକାରୀ ମାନଦଣ୍ଡ ଅଟେ। ୧.୧୦ ମି.ଲି. ବିଶୋଧିତ ଜଳରେ ୨ ପିଏଏମ୍ ୧–୨ ଗ୍ରାମ୍ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ୧୦–୧୫ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟ୍ରାଭେନସଲୀ (ଶୀରାମଧ୍ୟରେ) ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ।

ବ୍ୟବହୃତ ପାତ୍ରର ବିନାଶ: ୧. ହର୍ବିସାଇଡ୍ ଫର୍ମୁଲେଟର୍‌ସ ବିନିର୍ମାତା ଏବଂ ଅପରେଟର ପରିବେଶ ତଥା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ବା ବଳକା ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ମେସିନ୍ ତଥା ପାତ୍ରକୁ ସଫା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିରାପଦ ଉପାୟରେ କରିବା ଉଚିତ୍ । ୨. ପୁନର୍ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପାତ୍ର ବା ପ୍ୟାକେଜ୍ ବାହାରେ ରଖିବା ଅନୁଚିତ୍ । ୩. ପ୍ୟାକେଜେସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଭାଙ୍ଗି ପୋତିବା ଉଚିତ୍ ।

ସଂରକ୍ଷଣ ଅବସ୍ଥା : ୧. କୀଟନାଶକ ଗଚ୍ଛିତ ପ୍ୟାକ୍‌ରୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବହାରିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଜିନିଷଠାରୁ ଦୂରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କକ୍ଷ ଅଥବା ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲମୀରାରେ ବନ୍ଦକରି ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ କି (ଚାବି) କୀଟନାଶକର ପରିମାଣ ଓ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ୨. କକ୍ଷ ଅଥବା ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ଏକ ଉତ୍ତମ ନିର୍ମାଣ, ଶୁଷ୍କ, ସହଜରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ବାୟୁ ସଞ୍ଚାଳନ ହୋଇ ପାରୁଥିବା ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ପରିସର ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ହେବା ଉଚିତ ।

ରାସାୟନିକ ସଂରଚନା:

କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍.ଆଇ:	୧୦.୦୦୦% ଭା/ଭା
ଦ୍ରବଣକାରୀ ଆରୋମାକ୍ସ (ବିନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ବାଷ୍ପୀଭୂତ):	୨.୦୦୦% ଭା/ଭା
ଇମଲ୍ସିଫାଇଡ୍ ଗ୍ରେନୁଲ୍ସ (ବେଣ୍ଟୋନାଇଟ୍)	
(୮୫୦/୪୨୦ ମାଇକ୍ରନ୍ସ୍)	୧୦୦ କରିବାକୁ କ୍ୟୁ.ଏସ.
ମୋଟ:	**୧୦୦.୦୦୦% ଭା/ଭା**

క్లోరోపైరిఫాస 10% GR

(కీటనాశక)

సక్రియ 10% క్లోరోపైరిఫాస ఆంశ హొందిరువ 10% క్లోరోపైరిఫాస కణగళన్ను భత్తద కీటగళన్ను నియంత్రిసువుదక్కే బళసలాగుత్తదే.

శిఫారసు:

బెళ (గళు)	కీటగళ సామాన్య హేసరు	ప్రమాణ/హే సక్రియ ఘటక (గ్రామ్)	ఫార్మ్యులేషన్ (కేజి)	ఎష్టునీరు సేరిసబేకు (లీ)	కొనేయ సింపడికెయింద కొయ్యున తనక కాయబేకాద అవధి (దినగళల్లి)
భత్త	కాండ కొరయువ హుళు ఎలి సురళి హుళు	1000	10	-	30

విశేషత సూచనే: లేబల్ మత్తు కరపత్ర-గళ మేలే నమూదిసిరువు హొరతాగి యావుదే ఇతర ఉద్దేశగళిగే బళసువ హాగిల్ల. కరపత్రదల్లి నిర్దేశిసిరువ హాగే డబ్బియన్ను బళసిద నంతర నాశగొళిసి.

బళసువ విధాన: పి ప సాధన: శఫారస్సు మాడలాద కణగళ ప్రమాణవన్ను కృయింద నిర్వహిసల్పడువ కణగళ లేపక అథవా యాంత్రిక వితరకదింద ఎరబబేకు. భత్తదల్లి ఇదన్ను బళసలు హూలదల్లి 2–3 సే మీ నింతిరువ నీరు లభ్యవిరబేకు. బళసిద నంతర 2–3 దినగళు నీరన్ను హిడిదిట్టుకొళ్ళి.

మున్నెచ్చరికే: 1. ఆహార పదార్థ, ఆహార పదార్థద బరిదాద కంటైనర్‌గళు మత్తు పశుగళ మేలినింద దూరవిరిసి. 2. బాయి, కణ్ణుగళు మత్తు త్వచేగే సంపర్కవాగదంతే తడెయిరి. 3. సింపరణా తుంతురు శ్వాశదొళగే హోగదంతే తప్పిసిరి. గాళి బీసువ దిక్కినత్త సింపడిసిరి 4. సింపరణెయ నంతర కల్మశగూండ బట్టి మత్తు శరీర భాగగళన్ను తొళెయిరి. 5. సింపడిసువాగ ధూమపాన మాడబేడి, ఏనన్నూ కుడియ బేడి. తిన్న బేడి మత్తు జగియబేడి. 6. మిశ్ర మాడువాగ మత్తు సింపడిసువాగ సంపూర్ణ సంరక్షక ఉడుపు ధరిసిరి.

సస్యక్కే హానికారక: శిఫారసినంతే ఉపయోగిసిదాగ ఈ కీటనాశక సస్యక్కే హానికారకవల్ల.

విష తగిలిద లక్షణగళు : తలేనోవు, తలేసుత్తు, బవళి, వాకరిక, వాంతి, మసుకు దృష్టి బేంధి, సేళెత, బేవరు సురిత, ఆధిక కణ్ణీరు సురిత మత్తు జొల్లు సురిత ఉంటాగబహుదు.

ప్రథమ చికిత్సే : 1. ఒందూవేళె నుంగిదల్లి గంటలిగే బరళు హాకి వాంతియాగువంతే ప్రేరిపిసిరి. రోగియు మూర్ఛావస్థయల్లిద్దరే వాంతియాగువంతే ప్రేరిపిసబేడి. 2. బట్టుబరగళు అథవా త్తళియు కల్మశనూండిద్దరే బట్టియన్ను కళబిరి మత్తు త్తళియన్ను సాబూను మత్తు నీరినింద తొళెయిరి. 3. కణ్ణుగళు కల్మశగూండిద్దరే, సుమారు 10 రింద 15 నిమిషగళ తనక ధారాళ సల్యూన్/ స్టుళ్ళ నీరు చిముకిసిరి. 4. ఒందు వేళె శ్వాసదొందిగే ఒళ హూగిద్దరే రోగియన్ను కుదుగాళిగే ఒయ్యిరి.

ప్రత్యౌషధ : 1. బాధితరిగే కూడలే ఆట్రోపిన్ నీడిరి. 5 రింద 10 నిమిషగళ అంతరగళల్లి 2 రింద 4 గ్రాం ఆట్రోపిన్ సల్ఫేట్ డోస్‌గళన్ను ఇంట్రావేనస్ విధానదల్లి పదే పదే నీడువ మూలక పూర్ణ ఆట్రోపినైజేశన్ మాడబేకు. దినవొందక్కే 25రింద 50 మి.గ్రా.ఆట్రోపిన్ బేకాగబహుదు. ఆట్రోపిన్ నీడువికే ముంచువరిసబేకే అథవా బేడవే ఎన్నువుదు లక్షణగళ ముంచువరికెయన్ను అవలంబిసిరువుదు. డోస్ హొందాణికే,జొల్లు, సురియువ మత్తు ప్రమాణ ఒందు ఉత్తమ సూచకవాగిదే. 2. 1–2 గ్రాం పిఏంఎస్ను 10 మి.లీ.డిష్టిల్డ్ నీరల్లి కరగిసి,ఇంట్రావేనస్ ఇంజక్షన్ మూలక,తుంబ నిధానవాగి 10–15 నిమిషగళవరెగే నీడిరి.

ఉపయోగిసిద కంటైనర్‌న విసర్జనే : 1. ప్యాకేజ్‌గళన్ను అథవా మిక్కుళిద పదార్థగళన్ను మత్తు యంత్రగళ హాగూ కంటేనర్‌గళ తొళెద నీరన్ను , పరిసర హాగూ జల మాలిన్య ఉంటాగద రీతియల్లి సురక్షితవాగి విసర్జిసువుదు కళినాశక ఉత్తాదకర, ఫార్ములేషన్ సిద్ధగొళిసువవర కర్తవ్యవాగిదే. 2. బళసిరువ ప్యాకేజ్‌గళ మరుబళకే కెడెయలు అవుగళన్ను,హూరగే హాగేయి బిట్టుబిడబారదు. 3. ఖాలి ప్యాకేజ్‌గళన్ను తుండరిసబేకు మత్తు జనవసతియింద దూరదల్లిహూళిబేకు.

శేఖరణా పరిస్థితిగళు : 1. కీటనాశకవన్ను ఒళగొండిరువ ప్యాకేజుగళన్ను ఇతర పదార్థగళన్ను శేఖరిసిదలు ఉపయోగిసలాగువ కోణెగళు అథవా కట్టడగళింద దూరవాగి వ్యక్తిగళ కోణె అథవా కట్టడగళల్లి శేఖరిసిడబేకు అథవా కీటనాశకద ప్రమాణ మత్తు స్వభావవన్ను అవలంబిసి వ్యక్తిగళ అలమారినల్లి బీగ హాకి భద్ర పడిసి ఇడబేకు. 2. కీటనాశకగళన్ను శేఖరిసువ కోణె అథవా కట్టడగళు బేన్నుగి కట్టల్పట్టిరబేకు. ఒళేయ బేళకు ఇరబేకు. శుష్కవాగిరబేకు, గాళి ఇరబేకు మత్తు హబేయింద మలినవాగదంతిరలు విశాలవాగిరబేకు.

రాసాయనిక సంయోజనే:

క్లోరోపైరిఫాస్ బ.జీ:	10.000% డబ్ల్యు / డబ్ల్యు
ద్రావక ఆరోమ్యాక్స్	
ఉత్పాదనా ప్రక్రియయల్లిఆవియాగుత్తదే):	2.000%డబ్ల్యు / డబ్ల్యు
జడ కణగళు (బెంటోనైట్)	
(850/420 మైక్రాన్‌గళు)	కి.ఖ.100 మాడలు
ఒట్టు:	100.000% డబ్ల్యు / డబ్ల్యు

ಕ್ಲೋರ್‌ಪೈರಿಫಾಸ್ 10% GR

(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಸಕ್ರಿಯ 10% ಕ್ಲೋರೋಪೈರಿಫಾಸ ಆಂಶ ಹೊಂದಿರುವ 10% ಕ್ಲೋರೋಪೈರಿಫಾಸ ಕಣಗಳನ್ನು ಭತ್ತದ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆ (ಗಳು)	ಕೀಟಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಮಾಣ/ಹೆ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕ (ಗ್ರಾಮ್)	ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಷನ್ (ಕೆಜಿ)	ಎಷ್ಟುನೀರು ಸೇರಿಸಬೇಕು (ಲೀ)	ಕೊಸೆಯ ಸಿಂಪಡಿಕೆಯಿಂದ ಕೊಯ್ಲಿನ ತನಕ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
ಭತ್ತ	ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು ಎಲೆ ಸುರಳಿ ಹುಳು	1000	10	-	30

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರ-ಗಳ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿರುವು ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಂತರ ನಾಶಗೊಳಿಸಿ.

ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ: ಪಿ ಪಿ ಸಾಧನ: ಶಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಕಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಕಣಗಳ ಲೇಪಕ ಅಥವಾ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿತರಕದಿಂದ ಎರಚಬೇಕು. ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು ಹೊಲದಲ್ಲಿ 2–3 ಸೆ ಮೀ ನಿಂತಿರುವ ನೀರು ಲಭ್ಯವಿರಬೇಕು. ಬಳಸಿದ ನಂತರ 2–3 ದಿನಗಳು ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ: 1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದ ಬರಿದಾದ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪಶುಗಳ ಮೇವಿನಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿ. 2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತ್ವಚೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಿರಿ. 3. ಸಿಂಪರಣಾ ತುಂತುರು ಶ್ವಾಡೊಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಪ್ಪಿಸಿರಿ. ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಸಿಂಪಡಿಸಿರಿ 4. ಸಿಂಪರಣೆಯ ನಂತರ ಕಲ್ಮಶಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಶರೀರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. 5. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಏನನ್ನೂ ಕುಡಿಯ ಬೇಡಿ. ತಿನ್ನ ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಜಗಿಯಬೇಡಿ. 6. ಮಿಶ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂರಕ್ಷಕ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿರಿ.

ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ: ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಈ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲ.

ವಿಷ ತಗಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ತಲೆನೋವು, ತಲೆಸುತ್ತು, ಬವಳಿ, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಮಸುಕು ದೃಷ್ಟಿ ಬೇಧಿ, ಸೆಳೆತ, ಬೆವರು ಸುರಿತ, ಆಧಿಕ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿತ ಮತ್ತು ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : 1. ಒಂದೂವೇಳೆ ನುಂಗಿದಲ್ಲಿ ಗಂಟಲಿಗೆ ಬರಳು ಹಾಕಿ ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರಿಪಿಸಿರಿ. ರೋಗಿಯು ಮೂರ್ಚಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರಿಪಿಸಬೇಡಿ. 2. ಬಟ್ಟೆಬರೆಗಳು ಅಥವಾ ತ್ವಚೆಯು ಕಲ್ಮಶನೊಂದಿದ್ದರೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಳಚಿರಿ ಮತ್ತು ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. 3. ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಲ್ಮಶಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ತನಕ ಧಾರಾಳ ಸಲ್ಯೂನ್/ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿರಿ. 4. ಒಂದು ವೇಳೆ ಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಒಳ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ರೋಗಿಯನ್ನು ಕುದುಗಾಳಿಗೆ ಒಯ್ಯಿರಿ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ : 1. ಬಾಧಿತರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಆಟ್ರೋಪಿನ್ ನೀಡಿರಿ. 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 4 ಗ್ರಾಂ ಆಟ್ರೊಪಿನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಡೋಸ್‌ಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರಾವೆನಸ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣ ಆಟ್ರೋಪಿನೈಜೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ 25ರಿಂದ 50 ಮಿ.ಗ್ರಾ.ಆಟ್ರೋಪಿನ್ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆಟ್ರೋಪಿನ್ ನೀಡುವಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೆ ಎನ್ನುವುದು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದು. ಡೋಸ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ,ಜೊಲ್ಲು, ಸುರಿಯುವ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. 2. 1–2 ಗ್ರಾಂ ಪಿಏಎಮ್‌ಎನ್ನು 10 ಮಿ.ಲೀ.ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ,ಇಂಟ್ರಾವೆನಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ,ತುಂಬ ನಿಧಾನವಾಗಿ 10–15 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ನೀಡಿರಿ.

ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕಂಟೈನರ್‌ನ ವಿಸರ್ಜನೆ : 1. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಗಳ ಹಾಗೂ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು , ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು ಕಳಿನಾಶಕ ಉತ್ಪಾದಕರ, ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವವರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. 2. ಬಳಸಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳ ಮರುಬಳಕೆ ತಡೆಯಲು ಅವುಗಳನ್ನು,ಹೂರಗೆ ಹಾಗೆಯೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬಾರದು. 3. ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ತುಂಡರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನವಸತಿಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು.

ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು : 1. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿದಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವ ಕೋಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಲಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಭದ್ರ ಪಡಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. 2. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಒಳೆಯ ಬೆಳಕು ಇರಬೇಕು. ಶುಷ್ಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಗಾಳಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೆಬೆಯಿಂದ ಮಲಿನವಾಗದಂತಿರಲು ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಕ್ಲೋರೋಪೈರಿಫಾಸ್ ಟಿ.ಜಿ:	10.000% ಡಬ್ಲ್ಯು / ಡಬ್ಲ್ಯು
ದ್ರಾವಕ ಆರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್	
ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ):	2.000%ಡಬ್ಲ್ಯು / ಡಬ್ಲ್ಯು
ಜಡ ಕಣಗಳು (ಬೆಂಟೋನೈಟ್)	
(850/420 ಮೈಕ್ರಾನ್‌ಗಳು)	ಕಿ.ಖ.100 ಮಾಡಲು
ಒಟ್ಟು:	100.000% ಡಬ್ಲ್ಯು / ಡಬ್ಲ್ಯು

ക്ലോറോപൈറിഫോസ് ൧൦% ജിആർ

(കീടനാശക)

ക്ലോറോപൈറിഫോസ് ൧൦% ഗ്രാന്യുഅൽസ് ഹേ ഭാതവരിത കിടകഞ്ച നിയന്ത്രണാസാഠി വാപരലേ ജാതേ, ജ്യാമധ്യേ ൧൦% ക്ലോറോപൈറിഫോസ് ഹാ സക്രിയ ഘടക അസതോ.

ശിഫാരസ :

പീക	കിടകാചേ സാമായിക നാവ	പ്രതി ഹെക്ടർ ഡോസ		പാണ്യാത വിരഘലവണേ (ലിറ്റർസ്)	മാഗീല ഫവാരണീ വ കാഢണീ യാതീല പ്രതിക്ഷ കാലാവധീ (ദിവസ)
		എരായ (ഗ്രം)	മിശ്രണ (കിഗ്രം)		
ഭാത	ഖോട പോഖരണാരീ അലീ,പാന് ഗുംഡാണാരീ അലീ, ഗാദ മാശീ	൧൦൦൦	൧൦	–	൩൦

സാവധഗിരീചാ ഇശാരാ: ലേബല ആണി പത്രകാംവര നമൂദ കേല്യാവ്യാതിരിക്ത അന്യ കോണത്യാഹീ ഹേതൂസാഠീ വാപരലീ ജാഊ നയേ. പത്രകാച്യാ നിർദേശാനുസാര വാപരാനംതര കംടേനര നഷ്ട കരാ.

വാപരാസാഠീ മാർഗദർശന: പീ.പീ. ഇക്വിപമേംട:– ഗ്രാന്യുഅല്സച്യാ ശിഫാരസ കരണ്യാത ആലേല്യാ മാത്രേചേ ഹാതാനേ ചാലവായചാ ഗ്രാന്യുഅല ഓപരേടര കിംവാ മേകാനികല ഡിസ്പെംസരച്യാ പ്രസാരണ കരാവേ. ഭാതാവര വാപരണ്യാസാഠീ ശേതാമധ്യേ ൨–൩ സേം.മീ. പാണീ സാചലേലേ അസാവേ. വാപരാനംതര ൨–൩ ദിവസ പാണീ തസേച തുംബലേലേ രാഹൂ ദ്യാവേ.

ഖബരദാരീ : ൧. അന്നപദാർഥ, അന്നാചീ രികാമീ ഭാംഡീ, പ്രാണ്യാംചേ ഖാദ്യ ഹ്യാപാസൂന ദൂര ഠേവാ. ൨. തോംഡ, ഡോളേ, আണി ത്വചേശീ സംപർക ടാळാ. ൩. വാപരതാനാ ശ്വാസാവാടേ আത জাণ