Read enclosed leaflet before use. उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े । ఉపయోగించుటకు ముందు జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి.

కాలెక్స్ – వాలిడామైసిన్ 3% యల్ – అంతర్వాహిక బ్యాక్టీరియానాశని

రసాయనిక మిశ్రమము : వాలిడామైసిన్ న.ప. ... 3.00% ఘా/ఘా, పాలిఆక్సి ఇథిలిన్ నొన్యల్ ఫినైల్ ఈథర్ (యన్ పి-85) ... 2.00% ఘా/ఘా, సిలికాన్-కెయం-72 ... 0.01%ఘా/ఘా, పొటాషియం సోర్బెట్ ... 0.05% ఘా/ఘా, ఆసిడ్ గ్రీన్ డై ... 0.01% ఘా/ఘా, వాటర్ .. క్యు.ఎస్.%, మొత్తము ... 100.00% ఘా/ఘా. మందును ఉపయోగించుటకు సూచనలు : దయచేసి జతపరిచిన కరపత్రమును మందు ఉపయోగించుటకు ముందు చదవండి. ముందు జాగ్రత్తలు : 1) ఆహార పదార్థాలు, ఖాళీ పాత్రలు మరియు పశు గ్రాసము నుండి దూరముగా ఉంచండి. 2) ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు అంటకుండుట. 3) మంచు ద్రావణమును పీల్చ రాదు. గాలి వాటముగానే పిచికారి చేయండి. 4) కలుషిత దుస్తులు మరియు శరీరభాగములను శుభ్రపరుచుకొనవలెను. 5) పిచికారి చేయునపుడు పొగ త్రాగుట, త్రాగుట, తినుట మరియు ఏమైన నములుట వంటివి చేయరాదు. 6) పిచికారి చేయునపుడు మరియు మందు కలుపునపుడు సురక్షితమైన దుస్తులను ధరించవలెను. ప్రథమ చికిత్స : 1. మందును మింగినచో, గొంతులోనికి వేళ్ళు జొనిపి వాంతి చేయించండి. మందు ద్రావణము పూర్తిగా బయటకు వచ్చేంత వరకు మరల మరల వాంతి చేయించండి. రోగి స్పృహలో లేనపుడు వాంతి చేయించరాదు. 2. దుస్తులు మరియు చర్మము కలుషితమైనచో, దుస్తులు తీసివేసి కలుషిత చర్మమును బాగా నీరు మరియు సబ్బుతో శుభ్రపరుచుకొనవలెను. 3. మందు కళ్ళలో పడినచో శుభ్రమైన నీటితో 10-15 ని. ల వరకు ధారగా కడగవలెను. 4. మందును పీల్చుటవలో రోగిని అరుబయట బాగా గాలివీచు ప్రదేశములోనికి తరలించండి. విషలక్షణములు : తలనొప్పి, మగత, కండరమలబణకు, వాంతులు మరియు ఉర్యుక వంటివి కనబడతాయి. సిఫారసులు : వాలిడామైసిన్ 3% ఎల్. అనునది బ్యాక్టీరియాను నిరోధిస్తుంది. దీనిని వరిపైరునాశించు పొడతెగులు లేక మాగుడు తెగులును అరికట్టుటకు మాత్రమే ఉపయోగించవలెను. హెచ్చరిక : జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైరుపైనే ఈ మందును ఉపయోగించవలెను. మిగతాపైరుపై ఉపయోగించరాదు.

कालेक्स - वालीडामाईसिन ३% प्रतिशत सांद्र - अंतर्प्रवाही प्रतिजैविक

रासायनिक संरचना : वालीडामाईसिन सक्रिय तत्व ... ३.००% भार/भार, पॉली ईथाइलीन नोनाइल फिनाईल ईथर (एन.पी-८५) ... २.००% भार/भार, सिलिकॉन के.एम. ७२ ... ०.०१% भार/भार, पोटाशियम सॉर्बेट ... ०.०५% भार/भार, एसिड हरी डाई ... ०.०१% भार/भार, पानी ... पर्याप्त मात्रा%, कुल ... १००.००% भार/भार । उपयोग के लिये निर्देश : उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट देखे । प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ : १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें । २. मुँह, त्वचा और आँखों के संपर्क से बचाएं । ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अंदर जाने से बचाएं । हवा की दिशा में छिड़काव करें । ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं । ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए । ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें । विष निवारक : कोई भी विशिष्ट निवारक नही हैं । लक्षणानुसार इलाज करें । प्राथमिक चिकित्सा : १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए । यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें । २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो कपडे उतार दे और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं । ३. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सेलैन/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं । ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जाएं । लक्षण : सिर दर्द, चक्कर आना, मितली, उल्टी, घबराहट हो सकते हैं । सिफारिश : केवल धान पर आच्छद अंगमारी रोग के नियंत्रण के लिये प्रभावकारी प्रतिजैविक हैं । चेतावनी : इस लेबल /हस्तपत्रिका मे दी गई फसलो के अलावा अन्य कोई भी फसल पर इसका उपयोग न करें ।

ಕಾಲೆಕ್ಸ್ - ವಾಲಿಡಾಮೈಸಿನ್ 3% ಎಲ್ . - ಅಂತರ್ವಾಹಕ ಪ್ರತಿಜೀವಕ

ರಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಣ : ವ್ಯಾಲಿಡಾಮೈಸಿನ್ ಎ.ಐ. ... 3.00% ತೂಕ/ತೂಕ, ಪಾಲಿಆಕ್ಸಿಇಥಿಲಿನ್ ನೊನಿಲ್ ಫಿನೈಲ್ ಈಥರ್ (ಯನ್.ಪಿ.85) ... 2.00% ತೂಕ/ತೂಕ, ಸಿಲಿಕಾನ್ - ಕೆ.ಎಂ-72 ... 0.01% ತೂಕ/ತೂಕ, ಪೊಟಾಷ್ಯಿಯಂ ಸೋರ್ಬೇಟ್ ... 0.05% ತೂಕ/ತೂಕ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರಿನ್ ಡೈ... 0.01% ತೂಕ/ತೂಕ, ವಾಟರ್ ... ಕ್ಯು.ಎಸ್. ಮೊತ್ತ ... 100.00% ತೂಕ/ತೂಕ. ಔಷಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸೂಚನೆ : ದಯವಿಟ್ಟು ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಓದಿದನಂತರ ಔಷಧಿಯ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಗಳು : 1. ಔಷಧದ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ, ಖಾಲಿಯಾದ, ಆಹಾರ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಪಶುವಿನ ಗ್ರಾಸದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. 2. ಔಷಧಿಯನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗುಲದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆವಹಿಸಬೇಕು. 3. ಔಷಧಿಯನ್ನು ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಗಾಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶ ವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. 4. ಕಲುಷಿತವಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಶುಭ್ರವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 5. ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ, ತಿಂಡಿ ಸೇವನೆ, ಹಾಗೂ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಲುಬುವು ಅಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. 6. ಔಷಧಿ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬೆರೆಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕವಚಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಧರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ : ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಷ ಇಲ್ಲ ರೋಗಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನುಸರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ :ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಔಷಧಿಯ ದ್ರಾವಣಕೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರುವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ರೋಗಿ ಎಚ್ಚರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ವಾಂತಿಮಾಡಿಸ ಬಾರದು. 2. ವಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮವು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಲ್ಲಿ, ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ಕಲುಷಿತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಾಬೂನು ನಿಂದ ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸ ಬೇಕು. 3. ಔಷಧಿಯು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಶುಭ್ರವಾದ ನೀರಿಂದ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸ ಬೇಕು. 4. ಔಷಧಿಯನ್ನು ಶ್ವಾಸದಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅಂಗಡಲ್ಲಿ ಚಿಕಾಸಿ ಗಾಳಿ ಬರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಬೇಕು. ವಿಷಲಕ್ಷಣ : ತಲೆನೋವು, ತರಗಳಲ್ಲಿ ನಡುಕ, ಸುನ್ನು ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಂತಕದಂತಹುವು ಕಾಣಿಸುವವು. ಸಿಫಾರಸು : ವಾಲಿಡಾಮೈಸಿನ್ 3% ಎಲ್. ಎಂಬುದು ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾವನ್ನು ನಿರೋಧಿಸುವುದು. ಇದನ್ನು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ತಗಲುವ ಪುಡಿರೋಗ ಅಥವಾ ಕಾಡಿಗೆ ಕೆಲಗಳನ್ನು ನಿರುಂತ್ರಿಸಲು ಮಾತ್ರವೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇತರ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

காலிஸ் - வலிடாமைசின் 3% எல். ரிக்கெழி ஊடுருவும் :நாx்க்கிருமி கட்டுப்படுத்தி

இரசாயனக் கலவை : வேலிடாமைசின் (எ.ஐ.) ... 3.00% எ/எ, பாலிஆக்ஸி எத்திலீன் நோனைல் ஃபினைல் ஈத்தர் (எனிபி-85) ... 2.00% எ/எ, சிலிக்கோன் கே எம்-72 ... 0.01% எ/எ, பொட்டாசியம் சார்பேட் ... 0.05% எ/எ, அமிலப் பச்சை நிறமி ... 0.01% எ/எ, நீர் ... கூ.எஸ், மொத்தம் ... 100.00% எ/எ. பயன்படுத்தக் குறிப்புகள் : இந்த மருந்தைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்னர் இணைத்துள்ள துண்டு பிரசுரத்தை முழுமையாக, நன்கு படிக்கவும். முன்னெச்சரிக்கைகள் : 1. இந்தக் களைக் கொல்லி மருந்தை உணவும் பொருட்களுக்கும், கால்நடை உணவு பாத்திரங்களுக்கும், மாட்டுத் தீவனங்களுக்கும் மிதத் தொலைவில் வைத்திருக்கவும். 2. கண்கள், வாய், தோல் பகுதிகளில் இந்த மருந்துபடுகையைத் தவிர்க்கவும். 3. தெளிப்பு மருந்தைச் சுவாசிப்பதைத் தவிருங்கள். காற்றோட்ட திசையறிந்து உடல் மீது படாவண்ணம் தெளியுங்கள். 4. தெளிப்புப் பணி முடிந்ததும் மருந்து விழுந்த மாசடைந்த ஆடைகளையும், உடல் பகுதிகளையும் உடனடியாகக் கழுவிச் சுத்தப் படுத்துங்கள். 5. மருந்தைக் கலக்கும் போதும், தெளிக்கும் போதும் எதையும் உண்ணவோ, குடிக்கலோ, புகை பிடிக்கவோ, மெல்லவோ கூடாது. 6. மருந்தைக் கலக்கும் போதும் தெளிக்கும்போதும் முழு பாதுகாப்பான ஆடை களை அணியவும். பரிந்துரைகள் : நெல்லின் இலையுறைக் கருகலைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக மட்டும் உள்ள நோய்க்கிருமி கட்டுப்படுத்தி. எச்சரிக்கை: இணைக்கப் பட்டுள்ள துண்டு பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பயிர்கள்மீது மட்டுமே இம் மருந்தைப் பயன் படுத்தவும். பிற பயிர்கள் மீது பயன்படுத்தக் கூடாது.

Aegis™

CALYX

Validamycin 3% L

Systemic Antibiotic

Keep out of reach of children.
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి
ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಡಿರಿ
बच्चों की पहुंच से दूर रखें

A product of Aegis

READ LEAFLET BEFORE USE

CALYX - VALIDAMYCIN 3% L -SYSTEMIC ANTIBIOTIC

Chemical composition: Validamycin A.I. ... 3.00% w/w, Polyoxy ethylene nonyl phenyl ether (NP-85) ... 2.00% w/w, Silicon-KM-72 ... 0.01% w/w, Potassium sorbate ... 0.05% w/w, Acid green dye ... 0.01% w/w, Water ... Q.S. Total ... 100.00% w/w. Directions for use : Please read enclosed leaflet before use. Precautions : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed. 2.Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3.Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4.Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5.Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6.Wear full protective clothing while mixing and spraying. Antidote : No specific antidote is known. Treat Symptomatically. First Aid : 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. Symptoms of Poisoning : Headache, giddiness, nausea, vomiting and anxiety may occur. Recommendation : It is an antibiotic for the control of rice sheath blight only. **Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".**

Regn.No / रजि नं. : CIR-111300/2014-Validamycin (L) (344)-28

Mfg.Lic.No / उत्पादक लायसेंस. न. : **019/TS-IML/2016 Dt. 23-7-2016**

Manufactured & Marketed by :

Aegis™
Agro Chemicals India Private Limited
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY
237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M),
Sangareddy Dist - 502295. Telangana State.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" Cell No.: +91 84980 99536
Email : aegisagrochemicals@gmail.com
Website : www.aegisagro.in
(Address as of Aegis Agro Sangareddy Dist, T.S.)

Net Contents / उतशुद्ध सामग्री : **1ℓ**

Batch No / बैच नं. :

Mfg.Date / उत्पादन तिथि :

Exp.Date / निष्प्रभावी होने का तिथि :

Max.Retail.Price ₹ / अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :

(Inclusive of all taxes)
(सभी करों सहित)

For Agricultural Use Only

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. ठंडी, शुष्क जगह में गर्मी और खुली लौ से दूर रखो।

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE