Dalapati

Thiamethoxam 12.6%+Lambda-Cyhalothrin 9.5% ZC for indigenous manufacture (Systemic and Contact Insecticide)

Thiamethoxam 12.6%+lambda-cyhalothrin 9.5% ZC is a combination insecticide having quick stomach and contact activity and is recommended to control Aphids, Jassids, Thrips & Bollworms in Cotton, Aphid, Shootfly, steam borer in Maize, Leaf hopper, leaf eating caterpillars in Groundnut, Stem fly, semilooper, girdle beetle in Soyabeen, Thrips & Fruit borer in Chilli, Thrips semilooper, tea mosquito bug in Tea, Thrips, whiteflies, fruit borer in Tomato crop.

Recommendations:

Crop(s)	Common name of pest	Dosage/HA A.I. (g)	Dosage/HA Formulation(ml)	Dilution in Water(L)	Waiting period between To harvest(in days)
Cotton	Aphids, Jassids, Thrips & Bollworms	44	200	500	26
Tea	Thrips, whiteflies, tea mosquito bug	33	150	500	1
Tomato	Thrips semilooper, fruit borer	27.5	125	500	5
Maize	Aphid, Shootfly, steam borer	27.5	125	500	42
Chilli	Thrips & Fruit borer	33	150	500	3
Groundnut	Leaf hopper, leaf eating caterpillars	27.5	125	500	28
Soyabeen	Stem fly, semilooper, girdle beetle	27.5	125	500	48

Direction of Use : Measure out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified through agitation for total coverage of crop with suitable sprayers.

Time of application : The product should not be applied during flowering of the crop. DO NOT use the product where bees are actively foraging. DO NOT allow spray drift to flowering weeds, hedges or flowering crops in the vicinity of the treatment area. DO NOT spray if a high amount of aphid honeydew is present in the treatment area. DO NOT spray on flowering crops between 5 days before start of flowering and end of flowering. Not to be used on crops when honey bees are pollinators/foraging. This product is also toxic to fish.

Precaution: Dot not use cooking utensils for preparing sprays. Use stick for stirring the spray solution. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Also avoid inhalation and contact with eyes. Wear protective clothing, mask, goggles, boots, while spraying and do not expose yourself to spray drift. Do not blow nozzles with mouth. Do not eat, drink of smoke while handling or applying the product. Do not store unused spray solution. Clean sprayers, buckets and other utensils with water daily after use. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Also wash the contaminated clothes.
DO NOT allow spray to drift onto rivers, lakes, ponds, ditches o other waterways. DO NOT allow discharging left over spray material or empty containers to contaminate waterways.

Symptoms : Poisoning symptoms in rodents are non-specific, may cause symptoms of ataxia, salivation, lachrymation and decreased breathing etc.

First Aid: Remove the affected person to a well-ventiated area of fresh air and protect him from undercooling. In Case of suspected poisoning : immediately call a physician. In case of skin contact : remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. In case eye contact: Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. In case eye contact: Rinse eyes with clean water for several minutes. In case of ingestion: Repeatedly administer medicinal charcoal in a large quantity of water. Note: Never give anything by mouth to an unconscious person Do Not induce vomiting.

Phytotoxity : As in comman.

Antidote: No Specific antidote is known Apply symptomatic therapy.

Disposal Of Used Container: 1. It shall be the duty of manufactures formulators and operator to dispose packages or surplus materials and washings from the machine and container shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions : 1. The packages containing the insecticide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the fungicide. 2. The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, airy, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition:

Lambda-cyhalothrin (a.i.)	9.5% w/w
Thiamethoxam a.i.	12.6% w/w
Octadecanoic acid, 12-hydroxy-homopolymer, octadecanoate (Polymer)	0.8% w/w
Styrylphenol polyethoxyester phosphate	1.17% w/w
Sodium lignosulfonate ethoxylated	1.17% w/w
Ammonia	0.25% w/w
Sulfuric acid	0.54% w/w
Lignosulfonate sodium salts	1.04% w/w
Polydimethylsiloxane	0.10% w/w
Copolymer butanol	0.50% w/w
Dodycylbenzenesulfonic acid, sodium salt	0.17% w/w
DL-Propanediol-(1-2)	0.20% w/w
Propane-1-2m3-triol	5.84% w/w
Heteropolysaccharide	0.20% w/w
1,2-benzisothiazolin-3-one	0.28% w/w
Titanium dioxide	0.99% w/w
Isocynic acid, methyl-m-phenylene ester	1.58%w/w
Mixture of aromatic hydrocarbons	7.76%w/w
Water	Q.S.%w/w
Total	100.00%w/w

Caution: Not to be used on crops other than specified on this label/Leaflet.

दलपती

थायामेथोक्साम १२.६%+लॅमडा-सायहऐलोथ्रिन ९.५ प्रतिशत झेडे.सी. (अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक)

थायामेथोक्साम १२.६ प्रतिशत + लॅमडा-सायहऐलोथ्रिन ९.५ प्रतिशत झेडे.सी. एक बहुपयोगी कीटनाशक मिश्रण है जो तीव्र उदरीय तथा संस्पर्शी कियाशीलता रखता है तथा इसकी सिफारिस कपास की फसलपर लगने वाले माहो, तेला, चर्दा, टिडडें की सुंडिया, मक्का में महो, तेला, चुरदा, टिंडे की सुंडियां, मूंगफली में पत्ती का टिड्डा, पत्ता खाने वाली सुंजी, सोयाबीन में स्टेम फ्लाई, अर्दकुंडलक, मिर्च में चुरदा, फल छेदक, झिल्ली, चाय में चुरदा, अर्दकुंडलक, चाय का मच्छर कीट, टमाटर में चुरदा, फल छेदक झिल्ली, सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए की जाती है।

उपयोगः

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टयर मात्रा स.तत्व (ग्रा.)	प्रति हेक्टयर मात्रा संरचना (मि.ली)	पानी कीमात्रा (लीटर)	अन्तिम छिडकाव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)
कपास	माहो, तेला, चर्दा, टिडडें की सुंडिया	४४	२००	५००	२६
चाय	चुरदा, अर्दकुंडलक, चाय का मच्छर कीट	३३	१५०	५००	१
टमाटर	चुरदा, फल छेदक झिल्ली, सफेद मक्षी	२७.५	१२५	५००	५
मक्का	महो, तेला, चुरदा, टिंडे की सुंडियां	२७.५	१२५	५००	४२
मिर्च	चुरदा, फल छेदक, झिल्ली	३३	१५०	५००	३
मूंगफली	पत्ती का टिड्डा, पत्ता खाने वाली सुंजी	२७.५	१२५	५००	२८
सोयाबीन	स्टेम फ्लाई, अर्दकुंडलक	२७.५	१२५	५००	४८

उपयोग के लिये निर्देश : उत्पाद की आवश्यक मात्रा मापें और थोड़े से पानी में इसे अच्छे से मिलाएँ। निर्देशानुसार हिलाते हुए पानी की शेष निर्दिष्ट मात्रा डालें और नेपसैक स्प्रेयर्स या हाइ वोल्यूम स्पेजयर्स से छिड़काव करें।

प्रयोग का समय : फसल पर फल आने की अवस्था पर स्प्रे नही करें। मधुमक्खीयों के सक्रिय समय पर स्प्रे नहीं करें। उपचारित क्षेत्र के नजदीकी फूलवाली फसलें, खरपतवार (फूल की अवस्था) एंव झाडियों को हवा द्वारा फैलने वाले छिड़काव के अवशेष से प्रभावित नही होने दें। माहु द्वारा विकसीत अत्यधिक शहद वाले फसल क्षेत्र को्पचारित नही करें। फूल वाली फसलों मे फूल आने के ५ दिन पहले से फूल बनने की अवस्था पूरी होने तक स्प्रे नहीं करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानिया : स्प्रे तैयार करने के लिए खाना पकाने के बर्तनों का इस्तेमाल मत कीजिए। स्प्रे के घोल को हिलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग कर। त्वचा, आँख, और मुँह को कीटनाशक के संपर्क से बचाये तथा श्वास द्वारा अंदर जाने से रोके। सरक्षात्मक कपड़ें जेसे कि ऐप्रान, दस्तानों, नका और गम बूट आदि पहन कर ही इसका प्रयोग करे। कीटनाशक का प्रयो करते समय, खाना, पीना और धूम्रपान करना नहीं चाहिए। प्रति दिन प्रयोग के बाद, कीटनाशी से प्रभावित हिस्सों को अच्छी तरह धो ले और कपडा बदल ले। दूषित कपडों को अच्छी तरह धो ले।
हवा द्वारा फैलने वाले छिड़काव के अवशेष को नदियों, जलाशय, तालाब एंव अन्य जलसंग्रहण क्षेत्र से प्रभावित नही होने दें। शेष बचे पदार्थ के निस्तारण एंव खाली कास्तरों द्वारा जलाशय को दूषित होने से बचांए।

विषलक्षण: चूहों पर विष का कोई निश्चित तक्षण दिखाई नही दिया, लेकिन असंतुलन, लार टपकना, आँसू आना तथा साँस लेने में कठिनाई, जैसे लक्षण दिख सकते है।

प्राथमिक चिकित्सा : १.प्रभावित व्यक्ति को प्रदूषित जगह से हवादार कमरें या कुली हवा में ले जाए और तापमान से बचाए। २.त्वचा में लगने परः प्रदूषित कपड़ों को उतार दें तथा शरीर के प्रभावित हिरसों को साबून और पानी से अच्छी तरह धोएं। आँखों में चले जाने पर : ३.आँखों को कुछ देर तक साफ परानी से अच्छी तरह छापछपाइए। निगल जाने पस पानी में मेडिशिनल चारकोल की कोफी मात्रा घोलकर बार चार दें। ४.सूचनाः कभी भी मूछिर्त मरीज को मुँह से कुछ भी नही देना चाहिए। उल्टी कराने की कोशिश न करें।

विषनाषक : कोई विशिष्ट विषनाशक नही हैं। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डीब्बों का निपटारा : १) पर्यावरण का प्रदूषण बचाने के लिए खाली डिब्बें, बचा हुआ घोल, मशीनों की धोवन, और डिब्बों का निपटारा सुरक्षित स्थान पर करें। २. खाली डिब्बों का पुनः प्रयोग रोकने के लिए, उन्हें बाहर न छोडें। ३) डिब्बों को तोड-मोडकर आबादी से दूर जमीन में गाढ़ देना चाहिए।

संग्रहण व्यवस्था : १) कीटनाशक के डिब्बों का संग्रहण अन्य सामग्री विशेषकर खाद्य पदार्थो के संग्रहण कक्ष या स्थान से दूर किया जाना चाहिए अथवा अलग अलमारी में ताला-चाबी लगाकर रखें। २) कीटनाशक का संग्रहण कक्ष या स्थान रोशनीदार, मजबूत, सूखा, हवादार तथा प्र्याप्त लम्बाई का होना चाहिए, जिससे वाष्प द्वारा प्रदूषण न हो।

रासायनिक संरचनाः

लॅमडा-सायहॅलोथ्रिन (स.त.)	९.५०%भ/भ
थायामेथोक्साम (स.त)	१२.६%भ/भ
ओक्टडि-कॅनोईक असिड, १२-हाइक्सी होमोपॉलिमर, ओक्टडि कॅनोईट (पॉलिमर).	०.८३%भ/भ
स्टरीलफीनॉल पॉलिईथॉक्सिईस्टर फॉस्फेट...	१.१७%भ/भ
सोडियम लिगनोसलफोनेट ईथ्यॉक्सिलेटेड...	१.१७%भ/भ
अमोनिया	०.२५%भ/भ
सलफ्युरीक असिड...	०.५४%भ/भ
लिगनोसलफोनेट सोडियम सॉल्ट	१.०४%भ/भ
पॉलीडायमिथाईल सिलोक्सेन	०.१०%भ/भ
कोपॉलिसर ब्यट नॉल	०.५०%भ/भ
डोडिसिल बेनझिनसलफोनिक असिड, सोडियम सॉल्ट	०.१७% भ/भ
डिएल-प्रपॅनेडिऑल-(१,२)	०.२०%भ/भ
प्रोपेन-१,२,३-ट्राओल...	५.८४%भ/भ
हेटेरोपॉलिसॅकराईड...	०.२०%भ/भ
१,२-बेन्झिसोथियाझोलिन-३-वन	०.२८%भ/भ
टिटॅनियम जायऑक्साईड	०.९९%भ/भ
आयसोसायनिक असिड मिथाईल-एम-फिनिलीनईसस्टर	१.५८%भ/भ
अरोमॅटिक हायड्रोकार्बन का मिश्रण (सेलवेन्ट सी-१)	७.७६%भ/भ
पान	पर्याप्त मात्रा%भ/भ
योग	१००.००% भ/भ

सावधानीः लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलवा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है।

దళపతి

థయోమెథాక్సామ్ 12.6% + లాంబ్డా-సైహలోత్రిన్ 9.5% జెడ్‌సి (అంతర్వాహిక మరియు స్పర్శచర్యగల కీటకనాశిని)

థయోమెథాక్సామ్12.6% + లాంబ్డా-సైహలోత్రిన్ 9.5% జెడ్.సి. ఉదర మరియు స్పర్శచర్యలు గల మిశ్రమ కీటకనాశిని. ప్రత్తిపంటలలో పేనుబంక, పచ్చదోమ, తామరపురుగులు మరియు కాయతొల్చుపురుగులు, మొక్కజొన్న లోని పేనుబంక, కాండం తొల్చుపురుగు, కాండంతొలిచే ఈగ, వేరుకనగన ఆశించు గడ్డివిలుక, ఆకుతిను పురుగు, సోయాచిక్కుడులోని కాండం ఈగ, దాసరి పురుగు, పెంకుపురుగు, మిరప నాశించు తామరపురుగులు, కాయతొలుచు పురుగులు, తేయాకులోని నల్లి, తామర పురుగు, టమాటాను ఆశించు తెల్లదోమ, కాయతొల్చుపురుగులను సమర్థవంతంగా నియంత్రించును.

సిఫారసులు :

పైరు(లు)	కీటకము యొక్క సాధారణము నామము	మోతాదు/హె. స.వ. (గ్రా)	మోతాదు/హె. మందు ద్రావణము (మిలీ)	నీటి నుండి పరిమాణము (లీటర్లు)	చివరి పిచికారి పైరుకోతమధ్య విరామసమయము (రోజులు)
ప్రత్తి	పేనుబంక, పచ్చదోమ, తామరపురుగు, కాయతొల్చుపురుగు,	44	200	500	26
మొక్కజొన్న	పేనుబంక, కాండం తొల్చు పురుగు, కాండంతొలిచే ఈగ,	33	150	500	1
వేరుకనగ	గడ్డివిలుక, ఆకుతినుపురుగు	27.5	125	500	5
సోయా చిక్కుడు	కాండం ఈగ, దాసరి పురుగు, పెంకుపురుగు	27.5	125	500	42
మిరప	తామరపురుగులు, కాయతొలుచు పురుగు	33	150	500	3
తేయాకు	నల్లి, తామర పురుగు	27.5	125	500	28
టమాటా	కాయతొల్చుపురుగు,తెల్లదోమ	27.5	125	500	48

ఉపయోగింపుటకు సూచనలు: ఉత్పత్తి యొక్క అవసరమైన పరిమాణాన్ని కొలవడం మరియు చిన్న పరిమాణంలో నీరు బాగా కలపడం. నిర్దిన స్ప్రేపర్లతో పంట మొత్తం కవరేజ్ కోసం ఆందోళన ద్వారా పేర్కొనబడిన మిగిలిన నీటిని జోడించండి.

వాడే సమయం: పంట పుష్పించే సమయంలో ఉత్పత్తిని ఉపయోగించరాదు. తేనెటీగలు చురుకుగా పనిచేసే ఉత్పత్తిని ఉపయోగించవద్దు. చికిత్స ప్రాంతం సమీపంలో పుష్పించే కలుపు మొక్కలు, హెడ్జెస్ లేదా పుష్పించే పంటలకు స్ప్రే డ్రిఫ్టు అనుమతించవద్దు. అఫిడ్ హోనీడ్యూ అధిక మొత్తం చికిత్స ప్రాంతంలో ఉంటే ప్రాంప లేదు. పుష్పించే ప్రారంభం మరియు పుష్పించే చివర 5 రోజుల మధ్య పుష్పించే పంటలపై స్ప్రే చేయవద్దు. తేనెటీగలు, సీతాకోకచిలుకలు ఉన్నప్పుడు పంటలపై ఉపయోగించకూడదు. ఈ ఉత్పత్తులను చేపల పెంపకం ఉన్నచోట పిచికారీ చేయరాదు.

ముందు జాగ్రత్త: మందు ద్రావణాన్ని సిద్ధం చేయడానికి వంట సామానులు ఉపయోగించకూడదు. చర్మం తగులకుండా యాప్రాను, చేతి తొడుగులు తొడుగులు, కళ్ళతో తగులకుండా కళ్ళజోడు, రక్షణ దుస్తులు, ముసుగు, కాళ్ళకు బూట్లు వంటి రక్షణ దుస్తులు ధరించాలి. చల్లే సమయంలో శరీరంపై పడకుండా జాగ్రత్త పడాలి. పిచికారీ సమయంలో తినడం, పొగత్రాగడం, ఏదైనా త్రాగడం, నమలటం వంటివి చేయరాదు. ఉపయోగించని ముందు ద్రావణాన్ని నిల్వ చేయవద్దు. రోజువారీ నీటిని వాడటం ద్వారా స్ప్రేయర్లు, బకెట్లు మరియు ఇతర పాత్రలను శుభ్రపరచుకోవాలి. పిచికారీ తరువాత సబ్బుతో మరియు శుభ్రమైన నీటితో బట్టలు శుభ్రంగా కడగాలి. కలుషితమైన నీటిని నదులు, సరస్సులు, చెరువులు, ఇతర జలమార్గాలలో, జలమార్గాలను కలుషితం చేయడానికి పిచికారీ ద్రావకం, లేదా ఖాళీ డబ్బాలను కడిగిన కలుషిత ద్రావణాన్ని కలపరాదు.

విషలక్షణములు: విషపూరితమైన లక్షణాలు నిర్దిష్టంగా లేవు. అటాక్సియా, లాలాజలీకరణం, లాక్రైమేషన్ మరియు శ్వాస తగ్గుదల వంట లక్షణాలకు కారణం కావచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స: బాధిత వ్యక్తిని తాజా గాలిపీల్చే ప్రాంతానికి తరలించాలి. అతనిని ఆరోగ్యపరిస్థితిని పరీక్షిస్తూ ఉండాలి. శాక్ష తీసుకునే విషయంలో అనుమానం ఉంటే వెంటనే వైద్యుడిని పిలవాలి. చర్మం పరిచయం విషయంలో: కలుషితమైన దుస్తులు తీసివేసి సబ్బు మరియు నీటితో శరీరం యొక్క బాధిత భాగాలను బాగా కడగాలి. కంటికి సంబంధించి కలుషితమైన దుస్తులను తీసివేసి సబ్బు మరియు నీటితో శరీర భాగాలను పూర్తిగా కడగాలి. కంటికి పరిచయం: అనేక నిమిషాలు శుభ్రమైన నీటితో కళ్ళు శుభ్రం చేయాలి. తీసుకోవడం విషయంలో: చాలా పెద్ద నీటిలో ఔషధ కర్ర బొగ్గును పునరావృతం చేయాలి.
గమనిక: అపస్మారకస్థితిలో ఉన్న రోగికి నోటి ద్వారా ఏమీ ఇవ్వరాదు, వాంతులకు ప్రేరేపించరాదు.

విరుగుడు : దీనికి ప్రత్యేకమైన విరుగుడు ఏమీలేదు.

వాడిన ఖాళీ డబ్బాల నిర్వహణ : 1. పర్యావరణ మరియు నీటి కాలుష్యం నిరోధించడానికి విధంగా ఇది యంత్రం మరియు కంటైనర్ నుండి ప్యాకేజింగ్ లేదా మిగులు పదార్థాలు మరియు పారవేసేందుకు మరియు ఆపరేటర్లు తయారు బార్యత సురక్షితంగా పద్ధతిలో పారవేయాల్సి ఉంటుంది. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను వారి పునః ఏనియోగిం నివారించడానికి బయట ఉండకూడదు. 3. పాకేజీలు ఏధిన్నుండేసి, నివాస స్థలాల నుండి ఖననం చేయబడతాయి.

నిల్వ నిబంధనలు: 1. క్రిమిసంహారకాలతో కూడిన ప్యాకేజీలను ప్రత్యేకమైన గదులు లేదా ప్రాంగణంలో నిల్వ చేయవలసిన. ఇతర వ్యాసాలను ప్రత్యేకంగా ఆహార పదార్థాలు నిల్వ చేయడానికి లేదా పరిమితి మరియు ప్రకృతిపై ఆధారపడి గడియాపెట్టి తాళంవేసి వేర్వేరు అల్మారాల్లో ఉంచాలి. 2. శిలీంధ్ర సంహారిణిని నిల్వ చేయడానికి ఉద్దేశించిన గదులు లేదా ప్రాంగణంలో బాగా కట్టబడి, అవాస్తవికమైన, బాగా వెలిగించి వెంటిలేషన్ చేయబడతాయి మరియు ఆవిరితో కాలుష్యాన్ని నివారించడానికి తగిన పరిమాణాన్ని కలిగి ఉండాలి

రసాయన మిశ్రమం:

లాంబ్డా-సైహలోత్రిన్ (ఎ.ఐ.)	9.5% భా/భా
థయోమిథాక్సామ్ (ఎ.ఐ.)	12.6% భా/భా
ఆక్టాడెకానోక్ యాసిడ్, 12-హైడ్రాక్సి, హోమోపాలిమర్, ఓక్టాడెకానేట్ (పాలిమర్)	0.8% భా/భా
స్టైరిల్‌ఫెనాల్ పాలిఇథాక్సిఈస్టర్ ఫాస్ఫేట్	1.17% భా/భా
సోడియం లిగ్నసల్ఫోనేట్ ఇథాక్సిలేటెడ్	1.17% భా/భా
అమ్మోనియా	0.25% భా/భా
సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్	0.54% భా/భా
లిగ్నసల్ఫోనేట్ సోడియం సాల్ట్స్	1.4% భా/భా
పాలిడిమెథైలొసొక్సేన్	0.10% భా/భా
కోపాలిమర్ బ్యుటనాల్	0.50% భా/భా
డోడైసైల్‌బెంజన్‌సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ సోడియం సాల్ట్	0.17% భా/భా
డిఎల్-ప్రొపనెడియోల్-(1,2)	0.20% భా/భా
ప్రొపేన్-1-2-3-ట్రయల్	5.84% భా/భా
హెటరోపాలిసచ్చారైడ్	0.20% భా/భా
1,2-బెంజిసోథియోజోలిన్-3-వన్	0.28% భా/భా
టైటానియం డయాక్సైడ్	0.99% భా/భా
ఐసొసైనిక్ యాసిడ్, మిథైల్-ఎం-ఫెనిలెన్ ఈస్టం	1.58% భా/భా
అరోమేటిక్ హైడ్రోకార్బన్స్ మిశ్రమ్ (సెల్వెంట్-9)	7.76% భా/భా
నీరు	క్యు.యస్.% భా/భా
మొత్తం	100% భా/భా

హెచ్చరిక : ఈ కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపైనే ఈ మందును ఉపయోగించవలెను. మిగతాపైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

Aegis™

Dalapati

Thiamethoxam 12.6%+Lambda-Cyhalothrin 9.5% ZC for indigenous manufacture (Systemic and Contact Insecticide)

దళపతి

థయామిథాక్సమ్ 12.6% + లాంబ్డా సైహలోత్రిన్ 9.5% జెడ్‌సి దేశీయ ఉత్పాదన కోసం (అంతర్వాహిక మరియు స్పర్శచర్యగల కీటకనాశిని)

दलपती

थायमेथोक्साम १२.६% + लॅमडा-सायहॅलोथ्रिन ९.५% झेड.सी. (अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक)

ದಳಪತಿ

ಥಿಯಾಮೆಥೋಕ್ಸಾಮ್ 12.6%+ಲಾಂಬ್ಡಾ -ಸಿಹಾಲೋಥ್ರಿನ್ 9.5% ZC ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ (ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಕೀಟನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.
बच्चों से दूर रखिए।
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

ವಿಷ
విషము विष
POISON
Yellow

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.
इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये। ™

Manufactured & Marketed by :

Aegis
Agro Chemicals India Private Limited
237, Main Road, Mallepally (V),
Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502 295. Telangana State.
Customer Care Manager No. +91 8498099536
Email: aegisagrochemicals@gmail.com / www.aegisagro.in

Regn. No.: CIR-185714/2021-Thiamethoxam + Lambda-Cyhalothrin (ZC) (428)-2965

For Agriculture use only. केवल कृषि उपयोग के लिए।

ದಳಪತಿ

ಥಿಯಾಮೆಥೋಕ್ಸಾಮ್ 12.6% + ಲಾಂಬ್ಡಾ ಸೈಹಾಲೋಥ್ರಿನ್ 9.5% ಜೆಡ್‌ಸಿ

(ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಕೀಟನಾಶಕ) ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದಕರಗಾಗಿ

ಥಿಯಾಮೆಥೋಕ್ಸಾಮ್ 12.6% + ಲಾಂಬ್ಡಾ ಸೈಹಾಲೋಥ್ರಿನ್ 9.5% ಜೆಡ್‌ಸಿ ತ್ರಿಂತೆವಾದ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟಿಡಿಸಬಹುದಾದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗೆ ಬರುವ ಆಫಿಡ್, ಜ್ಯಾಸಿಡ್, ಕೊರೆಯುವ ಹುಳ ಮತ್ತು ಹುಳಗಳು, ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಆಫಿಡ್, ರೆಂಭೆ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳ, ನೆಲಕಡಲೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಎಲೆ ಕೊರಕ, ಎಲೆ ತಿನ್ನುವ ಕಂಬಳಿ ಹುಳ, ನೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆಗೆ ಬರುವ ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳ, ಸೆಮಿಲೂಪರ್ ಗ್ರಿಡಲ್ ಬೀಟಲ್, ಮೆಣಸು ಬೆಳೆಗೆ ಬರುವ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಕೊರೆಯುವ ಹುಳ, ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬರುವ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಲೂಪರ್, ಹಾಗೂ ಟೊಮೆಟೋಗೆ ಬರುವ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳ, ಬಿಳಿ ನೋಣಗಳು, ಹಣ್ಣು ಕೊರೆಯುವ ಹುಳ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು:

ಬೆಳೆ (ಗಳು)	ಕೀಟಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಹೋಬೇಜ್ /ಹೆಕ್ಟೆರಿಗೆ ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾಂ)	ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಶನ್	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ (ಲೀ)	ಹಿಂದಿನ ಸಿಂಪರಣೆ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಕೊಯ್ಯುವಿಕೆ ನಡುವೆ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರತಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಬಳಿಕ ಮರು-ಪ್ರವೇಶ (ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ)
ಹತ್ತಿ	ಆಫಿಡ್, ಜ್ಯಾಸಿಡ್, ಕೊರೆಯುವ ಹುಳ, ಬಲ್ ವಾರ್ಮ್	44	200	500	26	-
ಚಹಾ	ಕೊರೆಯುವ ಹುಳ, ಸೆಮಿಲೂಪರ್	33	150	500	1	-
ಟೊಮಾಟೋ	ಕೊರೆಯುವ ಹುಳ, ಬಿಳಿ ನೊಣಗಳು, ಪೃಷ್ಟ್ ಬೋರರ್	27.5	125	500	5	-
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ	ಆಫಿಡ್, ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳ, ರೆಂಭೆ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳ	27.5	125	500	42	-
ಮೆಣಸು	ಕೊರೆಯುವ ಹುಳ, ಹಣ್ಣು ಕೊರೆಯುವ ಹುಳ	33	150	500	3	-
ನೆಲಕಡಲೆ	ಲೀಫ್ ಹಾಪರ್, ಎಲೆ ತಿನ್ನುವುದು, ಮರಿಹುಳುಗಳು	27.5	125	500	28	-
ಸೋಯಾ ಬೀನ್	ಸ್ಟೆಮ್ ಫ್ಲೈ, ಸೆಮಿಲೂಪರ್, ಹುಳು ಜೀರುಂಡೆ	27.5	125	500	48	-

ಬಳಕೆಗಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು: ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ತನ್ನವನ್ನು ಅಳೆದು ನ್ಲಲ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ. ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಟೇರ್ಯರ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸಮಯ: ಬೆಳೆಗಳು ಹೂವು ಬಿಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಜೀನುಗಳು ನಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಡ್ಸಕ್ಟ್ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಶುಶ್ರೂಷೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಬಿಡುವ ಪುಷ್ಪಗಳು ಅಥವಾ ಹೂವು ಬಿಡುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆಗಳಿದ್ದಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಶುಶ್ರೂಷೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಫಿಡ್ ಹನಿಡ್ಯೂ ಆತಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹೂವು ಬಿಡುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹೂವು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೂವು ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ 5 ದಿನಗಳ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಜೀನುಗಳು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಪ್ರೂಡಕ್ಟ್ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ: ಸಿಂಪಡಣೆ ತಯಾರಿನಲು ಆಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ಕದಡಲು ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಕರ್ಮಚಾರಿಕೆ ನೋಂಡದಂತೆ ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಉಸಿರೆಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೋಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ನಂರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಬಟ್ಟೆ, ಮಾಸ್ಕ್, ಕನ್ನಡಕಗಳು, ಬೂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಡ್ರಿಫ್ಟ್‌ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಲ್ವು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಬಾಯಿಯಿಂದ ನಾಜಲ್‌ಗಳನ್ನು ಊದಬೇಡಿ. ಉತ್ತನ್ನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಳಸದ ಸಿಂಪಡಣೆ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ. ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ನಿಶ್ಶೆನ್ನ ನ್ಲೆಯರ್‌ಗಳು, ಬಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ನೋಪ್ ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನಿಂದ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ನೆರೆಯಬೇಡಿ. ಜೀನುನೊಣಗಳು ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ. ವಿಷಾಂಶದ ಯಾವುದೇ ಚಿಹ್ನೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಸಿಂಪರಣೆ ಕ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನದಿ, ನರೋವರಗಳು, ಕಾಲುವೆಗಳು, ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ನೀರಿನ ಹಾದಿಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಳಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಕೊಳಕಾಗುವಂತೆ ಕಂಟೈನರ್ ಗಳನ್ನು ನೀರಿನ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಳೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.

ವಿಷಾಂಶದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು: ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷವೇರಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅರ್ನಿಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಟಾಕ್ಸಿಯಾ, ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಯುವುದು, ಲಾಚ್ರಿಮೆಶನ್ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ವಿಷವೇರಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಬಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಉತ್ತಮ ವಾತಾಯನ ಇರುವ ಕೋಣೆಗೆ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಆಂಡ್‌ಕೊಲೊಗ್‌ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಷಾಂಶ ಶಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಂದಲ್ಲಿ: ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಕರ್ಮಚಾರಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ: ಮಲಿನಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಬಾತ ಭಾಗವನ್ನು ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ: ಹಲವು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಶುದ್ದ ನೀರಿನಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅದ್ದಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಕರ್ಮದೊಳಗೆ ಸೇರಿದರೆ: ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯ ಬಾಕೌಲ್ ಅನ್ನು ಕಾಡೆ ಪದೇ ಪದೆ ಹಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗಮನಿಸಿ: ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಬೇಡಿ. ವಾಂತಿಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಬೇಡಿ.

ಫ್ಟೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ: ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ.

ಪ್ರತಿವಿಷ: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಆಧರಿತ ಧೊರಪಿ ಅಳವಡಿಸಿ.

ಬಳಸದ ಕಂಟೇನರ್ ತೆರವು: 1. ಪ್ಯಾಕೆಜ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮತಿನ್‌ಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಕಂಟೇನರುಗಳನ್ನು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. 2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೆಜ್‌ಗಳ ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊರಗೆ ಎನೆಯಬೇಕು. 3. ಪ್ಯಾಕೆಜ್‌ಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಜನವಾಸಿತ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಬೇಕು.

ನಂಗ್ರಹ ಸ್ಥಿತಿಗಳು: 1. ಪ್ಯಾಕೆಜ್ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮೂಲ ಕಂಟೇನರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಕೆಕ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಬಳಸುವ ಕೋಣೆಗಳು/ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಕೀ ಇರುವ ಪ್ರಕ್ಕೆಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. 2. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ನಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕೋಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶವು ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕು, ತಂಪು, ವಾತಾಯನ, ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಮಿತಿ, ಒಣ ವಾತಾಯನ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಆಯಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೂಗ:

ಲಾಂಬ್ಡಾ - ಸಿಹಾಲೋಥ್ರಿನ್ (ಎ.ಐ)	9.5% ಹೂ/ಹೂ
ಥಿಯಾಮೆಥಾಕ್ಸಾಮ್ (ಎ.ಐ)	12.6% ಹೂ/ಹೂ
ಒಕ್ಟಾಡೆಕನೋಯಲ್ ಆಸಿಡ್, 12-ಹೈಡ್ರೋಕ್ಸಿ - ಹೋಮೋಪಾಲಿಮರ್,	
ಒಕ್ಟಾಡೆಕನೋಯಲ್ (ಪಾಲಿಮರ್)	0.8% ಹೂ/ಹೂ
ಸ್ಟಿರಲ್ ಫೊಸೋಲ್ ಪಾಲಿಥೊಕ್ಸಿಯೈಥರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್	1.17% ಹೂ/ಹೂ
ಸೋಡಿಯಮ್ ಲಿಗ್ನೊಲಲೊಫೊನೇಟ್ ಎಥೋಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್	1.17% ಹೂ/ಹೂ
ಅಮೋನಿಯಾ	0.25% ಹೂ/ಹೂ
ಸಲಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್	0.54% ಹೂ/ಹೂ
ಲಿಗ್ನೊಲಲೊಫೊನೇಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್‌ಗಳು	1.04% ಹೂ/ಹೂ
ಪಾಲಿಡೈಮಿಥೈಲ್ ಸಿಲೋಕ್ಸೇನ್	0.10% ಹೂ/ಹೂ
ಕೋಪಾಲ್ಟಿಯ ಬ್ಯೂಟಾನೋಲ್	0.50% ಹೂ/ಹೂ
ಡೋಡಿಸಿಲ್ಬೆಂಜೀನಸಲ್‌ಫೊನಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಸೋಡಿಯಮ್ ಸಾಲ್ಟ್	0.17% ಹೂ/ಹೂ
ಡಿಎಲ್ - ಪ್ರೋಪಾಲಿಯೋಲ್ (1,2)	0.20% ಹೂ/ಹೂ
ಪ್ರೋಪೆಲೀನ್ - 1, 2, 3- ಟ್ರಿಯೋಲ್	5.84% ಹೂ/ಹೂ
ಹೆಪ್ಟೋಪಾಲಿಸಾಕ್ಸಿರೈಡ್	0.20% ಹೂ/ಹೂ
1, 2 ಬೆಂಜೀಸೋಥಿಯಾಜೋಲಿನ್ - 3- ವನ್	0.28% ಹೂ/ಹೂ
ಟೈಟಾನಿಯಂ ಡಯಾಕ್ಸೈಡ್	0.99% ಹೂ/ಹೂ
ಇಂಡೊಸಿನ್ ಆಸಿಡ್, ಮಿಥೈಲ್ -ಎಮ್-ಫೆನಿಲೀನ್ ಎಸ್ಟರ್	1.58% ಹೂ/ಹೂ
ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಗಳ ಮಿಶ್ರಣ (ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಸಿ-9)	7.75% ಹೂ/ಹೂ
ನೀರು	ಕ್ಯೂಎಸ್% ಹೂ/ಹೂ
ಒಟ್ಟು	100.00 ಹೂ/ಹೂ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲೆಬಲ್/ಭಿತ್ತಿಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

दलपती

थायामेथोक्साम १२.६%+लॅम्डा-सायहेलोथ्रीन ९.५ प्रतिशत झेडे.सी.

(अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक)

थियामेथोक्साम १२.६ टक्के +लॅबडा-सायहेलोथ्रीन ९.५ टक्के झेडसी हे किटकनाशकांचा एक संयोग आहे जो त्वरित पोटद्वारे आणि संपर्कद्वारे क्रिया करतो आणि मावा, तुडतुडे, आणि कापसावरील बोंड अळी यांच्या नियंत्रणासाठी त्याची शिफारस केली जाते.

शिफारस:

पिक	किडीचे सामान्य नाव	मात्रा (ग्रॅम) / हेक्टर स. त. (ग्रॅम)	मिश्रण (मिली)	पाण्यामध्ये द्रावण (ली.)	अंतिम फवारणी ते कापणी दरम्यान प्रतीक्षा कालावधी (दिवसांमध्ये)
कापूस	मावा, तुडतुडे, आणि बोंडअळी	४४	२००	५००	२६
चाय	चुरदा, अर्दकुंडलक, चाय का मच्छर बीट	३३	१५०	५००	१
टमाटर	चुरदा, फल छेदक झिल्ली, सफेद मक्खी	२७.५	१२५	५००	५
मक्का	महो, तेला, चुरदा, टिंडे की सुंडियां	२७.५	१२५	५००	४२
मिर्च	चुरदा, फल छेदक, झिल्ली	३३	१५०	५००	३
मूंगफली	पत्ती का टिड्डा, पत्ता खाने वाली सुंडी	२७.५	१२५	५००	२८
सोयाबीन	स्टम फ्लाई, अर्दकुंडलक	२७.५	१२५	५००	४८

वापरण्यासाठी निर्देश: उत्पादन आवश्यक प्रमाणात मोजून घ्या आणि थोडे पाणी घेऊन त्यात चांगले मिसळा. उर्वरित पाणी सांगितल्यानुसार दवळत राहून घाला म्हणून सुयोग्य स्प्रेयर्सद्वारे संपूर्ण पिकावर फवारणी करता येईल.

वापर करण्याची वेळ: हे उत्पादन फुलोऱ्यावर असलेल्या पिकांवर वापरु नये. मधमाशा सक्रिय. असतील अशा ठिकाणी हे उत्पादन वापरु नये. फवारणीचे धुके फुलोऱ्यावरील तण, कुंपणाची झाडे किंवा फुलोऱ्यावरील पिके यांच्यावर जाऊ देऊ नका. उपचार क्षेत्रात अधिक प्रमाणात अफीड हनीडयू असल्यास फवारणी करु नका. फुलोऱ्यावरील पिकांवर फुलोरा सुरु होण्यापूर्वी ५ दिवस आणि फुलोऱ्याच्या नंतर फवारणी करु नका. मधमाशा परागीकरण/मध संकलन करत असतील तेव्हा फवारणी करु नका. हे उत्पादन माशांसाठी देखील विषारी आहे.

खबरदारी: फवारणी द्रावण तयार करण्यासाठी स्वयंपाकाच्या भांड्याचा वापर करु नका. फवारणी द्रावण दवळण्यासाठी काठी वापरा. त्वचेशी संपर्क टाळण्यासाठी हातमोजे वापरा. तसेच हुंगणे आणि डोळ्यांशी स्पर्श टाळा. सुरक्षात्मक कपडे, मुखवटा, गॉगल्स, बूट्स फवारणी करताना घाला आणि फवारणीच्या धुक्याच्या संपर्कात येऊ नका. नोझल्स तोंडाने फुंकू नका. हाताळताना किंवा उत्पादन वापरताना खाऊ, पिऊ किंवा धूम्रपान करु नका. न वापरलेले फवारणी द्रावण साठवू नका. स्प्रेयर्स, बादल्या आणि अन्य भांडी रोजच्या वापरानंतर पाण्याने स्वच्छ करा. साबण आणि भरपूर पाण्याने हात धुवा आणि काम झाल्यानंतर कपडे बदला. तसेच प्रदूषित कपडे देखील धुवा. फवारणीचे धुके नदी, तळी, डबकी, खेडे आणि इतर जलमार्गांमध्ये जाऊ देऊ नका. शिल्लक द्रावण किंवा रिकामे कंटेनर्स जलमार्गांमध्ये सोडून देऊ नका.

लक्षणे: उंदरांवरील विषबाधेची लक्षणे अ-विशिष्ट आहेत, यामुळे अटाक्सिया, लाळ सुटणे, डोळ्यातून पाणी येणे आणि श्वास मंदावणे इ. उद्भवू शकते.

प्रथमोपचार: बाधित व्यक्तिला चांगल्या हवेशीर क्षेत्रात न्या आणि शरीर अति थंड होण्यापासून संरक्षण द्या. विषबाधेचा संशय असल्यास: तत्काळ डॉक्टरांना बोलवा. त्वचेसोबत संपर्क झाल्यास: प्रदूषित कपडे काढा आणि शरीराचे बाधित भाग साबण आणि पाण्याने स्वच्छ धुवा. डोळ्यांशी संपर्क: डोळे अनेक मिनिटे स्वच्छ पाण्याने धुवा. पोटात गेल्यास: भरपूर पाण्यातून मेडीसिनल चारकोल वारंवार देत राहा. टिप: बेशुद्ध व्यक्तिला कधीही तोंडावाटे काही देऊ नका. उलटी करवू नका.

पिकांसाठी विषकारकता: कॉमनप्रमाणे.

प्रतिउपाय: कोणताही विशिष्ट प्रतिउपाय ज्ञात नाही. लक्षणांनुसार करावेत.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट: १. निर्मात्ता, फॉर्म्युलेटर्स आणि ऑपरेटर्सचे हे कर्तव्य राहील की पाकिटे किंवा शिल्लक साहित्य आणि मशीन आणि कंटेनर धुवणाचे पाणी सुरक्षित पद्धतीने नष्ट करावे जेणेकरुन पर्यावरण आणि पाण्यावर प्रदूषण होणार नाही. २. वापरलेली पाकिटे उघडावर टाकू नयेत म्हणजे त्यांचा पुनर्वापर टाळता येईल. ३. पाकिटे तोडावीत आणि वस्तीपासून दूर पुरुन टाकावीत.

साठवण स्थिती: १. किटकनाशके असलेली पाकिटे स्वतंत्र खोल्या किंवा इमारतींमध्ये अन्य वस्तू विशेषत: अन्नपदार्थ साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा इमारतींपासून दूर साठवावीत किंवा औषधाच्या प्रमाण आणि स्वरुप यांच्यानुसार कुलपबंद अवस्थेत स्वतंत्र कपाटांमध्ये ठेवावीत. २. किटकनाशक साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या चांगल्या बांधलेल्या, हवेशीर, प्रकाशमान आणि पुरेशा आकारमानाच्या असाव्यात जेणेकरुन वाफेसोबत प्रदूषण होणार नाही.

रासायनिक संरचना:

लॅबडा-सायहॅलोथ्रीन (स.त.)	9.5% w/w
थियामोथक्सान स.त.	12.6% w/w
ऑक्टाडेकोनोईक एसिड, १२-हायड्रोक्सी-होमोपॉलिमर, ऑक्टाडेकानोएट (पॉलिमर)	0.8% w/w
स्टायरीफेनॉल पॉलिएथॉक्सीईस्टर फॉस्फेट	1.17% w/w
सोडीयम लिग्नोसल्फोनेट इथोक्सीलेटेड	1.17% w/w
अमोनिया	0.25% w/w
सल्फ्युरिक एसिड	0.54% w/w
लिग्नोसल्फोनेट सोडीयम सॉल्ट्स	1.04% w/w
पॉलिडायमिथिलसिलोक्सेन	0.10% w/w
कोपॉलिमर ब्युटेनॉल	0.50% w/w
डोडीसिलबेन्झीनसल्फोनिक एसिड, सोडीयम सॉल्ट	0.17% w/w
डीएल-प्रोपेनडीयोल-(१-२)	0.20% w/w
१,२-बेन्झीसोथियाझोलिन-३-वन	0.28% w/w
टायटेनियम डायऑक्साईड	0.99% w/w
आयसोसिनिक एसिड, मिथिल-एम-फेनिलिन ईस्टर	1.58% w/w
सुगंधी हायड्रोकार्बन्सचे मिश्रण	7.76% w/w
पाणी	Q.S. %
एकूण	100.00% w/w

इशारा: हे लेबल/पुस्तिकेत नमूद केल्याखेरीज अन्य पिकांवर याचा वापर करु नये.

Dalapati

ಉಲ್ನಾಟ್ಟು ತಯಾರಿಕೆಕನತಿಯಾಮಥಾಕ್ಸಮ್ 12.6% + ಲಂಬ್ಡಾ-ಸೈಹಾಲೋತ್ರಿನ 9.5% ZC ಉಲ್ಲಗಿರುಂತೆ ಪರವು ಮರ್ಗುಂ ಸ್ಪರಿಶ್ಚಿಕಿಕೊಲ್ಲಿ

(ತೈರಾನ ಮರ್ಗುಂ ತೊರ್ಪು ಪ್ಚಿಕಿಕೊಲ್ಲಿ)

ತಿಯಾಮಿಥಾಕ್ಸಮ್ 12.6% + ಲಂಬ್ಡಾ-ಸೈಹಾಲೋತ್ರಿನ್ 9.5% ZC, ಒರು ಇಣ್ಣಾಪ್ಚಿಕಿಕೊಲಿಯಾಗುಂ. ಇದು ವಿಶಾವಾಣವಯಿಗ್ರುಮರ್ಗುಂ ಸ್ಪರಿಸ ಚೆಯಲ್‌ಪಾಟ್ಟಿಡಕ್ ಕೊಣ್ಣುಂಎಲವು ಮರ್ಗುಂ ಪರುತ್ತಿಯಿಲ್ ಅಬವಿಣ್ಣಿ, ತ್ರಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಯ್ಪುಳುಕ್ಕಣ್ಣಿಗಳ್ ಮರ್ಗುಂ ಕಾಯ್ಪುಳುಕ್ಕಣ್ಣಿಗಳ್ ಕಟ್ಟುಪ್ಪಡುತ್ತುವತಿಗಳುಕ್ಕಾಗುಂ.

ಪರಿತ್ತುರೈಕಳ್ :

ಪಯಿರ್	ಪ್ಚಿಮಿನ ಪೆರುಪ್ಪು ಪೆಯರ್	ಅಳವು (ಕಿ) / ಹೆಕ್ಟರ್ A.I (ಕಿಗ್ರಾಮ್)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ (ಮಿಲಿ)	ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ದೆರಿಪ್ಪು ಕುದ್ರತ್ತಲ್ (ಲಿ)	ಕಡೆಸಿ ಸ್ಪರೇಯಿಲಿರ್ನ್ತು ಅಬುವಟ್ಟ ವಣಾಯಾನ ಇಡೆಯಟ್ಟಿಲ್ ಕಾತ್ತಿರುಪ್ಪು ಕಾಲಂ (ನಾಟ್ಕಳ್)
ಪರುತ್ತಿ	ಅಕ್ಕಬಣಿ, ತತ್ತುಪ್ಪುಚ್ಚಿಕಳ್, ಇಲೈಪ್ಪೆಣ್‌ಕಳುಂ ಮರ್ಗುಂ ಕಾಯ್ಪುಳುಕ್ಕಣ್ಣಿಗಳ್	44	200	500	26
ಟೀ	ತ್ರಿಪ್ಸ್, ವೈಟ್-ಫ್ಲೈಸೀಲಸ್ ತೆಕ್ಕಿನ್ ಕೊಕಾಸ್ ಪಿಳ್ಳೈ	33	150	500	1
ತಕ್ಕಾಳಿ	ತ್ರಿಪ್ಸ್ ಸೆಯಿಲ್ಲಾಪ್ಪರ್, ಪಟ್ಟ ತುಣೈಪ್ಪಾನ್	27.5	125	500	5
ಸೋಲಂಪ್	ಅಫಿಟ್, ಷ್ಯಾಟ್‌ಫ್ಲೈಪಿಲೈ, ನ್ರಾಯಿ ತುಣೈಪ್ಪಾನ್	27.5	125	500	42
ಮಿಳಕಾಯ್	ತ್ರಿಪ್ಸ್ & ಪಟ್ಟ ತುಣೈಪ್ಪಾನ್	33	150	500	3
ನಿಲಕ್ಕಡಲೆ	ಇಲೈ ಹಾಪ್ಪರ್, ಇಲೈ ಸಾಪ್ಪಿಟ್ಟುವದು ಕುಂಬಳಿಪ್ಪುಚ್ಚಿ	27.5	125	500	28
ಸೋಯಾ	ಸ್ಟೆಂಪ್ ಫ್ಲೈಪಿಲೈ, ಸೆಮಿಲೂಪರ್, ಇಲೈಪ್ಪುಳು ಜೀರುಂಡೆ	27.5	125	500	48

ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲುಳ್ಳಿರುವ ಕ್ರಿಗಳಿಕಳ್ : ತೇವಯಾನ ಅಳವು ತುಮಾರ್ಪ್ಪಿಯ ಅಳನ್ತು, ಕೊಣ್ಣುಂಪ ತಣ್ಣೀರ್ರಿಲ್ ನಣ್ಣಾ