

Read enclosed leaflet before use. उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। ఉపయోగించుటకు ముందు అతువరచిన కరవత్రమును చదవండి.

DOUBLE ACTION Fipronil 4% w/w + Thiamethoxam 4% w/w SC
(Systemic and Contact Insecticide) Chemical Composition: Fipronil a.i. ... 4.00% w/w, Thiamethoxam a.i. 4.00% w/w, Sunflower Oil (Stabilizer) 4.00% w/w, Monopropylene glycol (Anti freezing agent) 5.00 % w/w, Silicon defoamer (Antifoaming) 1.00% w/w, Blend of Sodium Dodecyl Sulfate (Surfactant 1) 3.00% w/w, Blend of modified Polyethanoxy Ether (Surfactant 2) 3.00% w/w, Xanthan Gum (Thickening Agent) 0.30% w/w, Methyl isothiazolinone (Anti-microbial agent) 0.01% w/w, Demineralized Water (Solvent) Q.S. to make%, Total 100.00% w/w. **Manner & Time of Application:** No. of application: 2 sprays are required at an interval of 15 days, depending season. **Re-entry Period:** Do not allow entry into treated area until spray has dried. **Dosages:** 1100ml/h diluted in 500 liter of water. **Pre-Harvest interval:** 45 days. **Antidote:** No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy. **First Aid:** Please read enclosed leaflet before use. **Symptoms of Poisoning:** It may causes irritability, lethargy and muscle tremors and in extreme cases possibly convulsions may occur. Decrease spontaneous movement, tonic conclusion, ptosis may occur. **Recommendation/ Direction of use:** Please read enclosed leaflet before use. **Caution:** Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet. **Warning:** 1. Not to be used on crops and pests other than mentioned on label and leaflet. 2. No to be used for post harvest application. 3. Do not spray during active bee for aging period of the day 4. More toxic to fish, hence harmful to aquatic organism therefore, not to be used near aquaculture and rice-fish farming. Do not contaminate lakes, rivers, ponds and streams.

డబుల్ యాక్షన్ ఫిప్రోనిల్ 4.0% + థయామిథాక్సామ్ 4.0% ఎస్ఎస్
 (అంతర్జాతీయ మరియు స్పర్శచర్యలుగల కీటకనాశకం). రసాయన మిశ్రమం: ఫిప్రోనిల్ స.ప 4.00% బా/బా, థయామిథాక్సామ్ స.ప 4.00% బా/బా, సులిథిజిన్ సస్పెండ్ అయిల్ 4.00% బా/బా, మోనోప్రోపైలినెక్స్ కార్బోనాట్ (ఫ్రీజింగ్ ఏజెంట్) 5.00% బా/బా, సిలికాన్ డిపిఎర్మేట్ (యాంటి ఫామ్) 1.00% బా/బా, బ్లెండ్ ఆఫ్ సోడియం డోడిసల్ఫేట్ (సర్ఫాక్టెంట్ 1) 3.00% బా/బా, బ్లెండ్ ఆఫ్ మోడిఫైడ్ పాలిఇథానాక్సీథర్ ఇథర్ (సర్ఫాక్టెంట్ 2) 3.00% బా/బా, జాంథాన్ గమ్ (థిక్నింగ్ ఏజెంట్) 0.30% బా/బా, మెథైల్ సోథియాజొలిన్ (యాంటి-మైక్రోబియల్ ఏజెంట్) 0.01% బా/బా, డిమినరలైజ్డ్ వాటర్ (సాల్వెంట్) కు.స.వ. తయారీకి, మొత్తము 100.00% బా/బా. ఉపయోగించుటకు సూచనలు: దయచేసి అతువరచిన కరవత్రమును ముందుగా చదవండి. దశాబ్దం సంఖ్య: పెన్సి ముట్టుడిని బట్టి, 7-14 రోజుల వ్యవధిలో 2-3 స్ప్రేలు అవసరం. ఒక నిజాన్ మూడు స్ప్రేలు ఉండవచ్చు. పునః ప్రవేశం: పెంటల్ పిచికార్ ఎండిపోయి వెంటనే. అప్లికేషన్ సమయం: ఇది ఫాలోయర్ స్ప్రే వర్షం చేయాలి. నిర్ణయ తేల పరిస్థితులు సూచించబడవు. పుష్పించే సమయంలో మరియు సాగుకు ముందు (PHI)ను పరిశీలించిన తరువాత) స్ప్రే చేయవచ్చు. కీటకాలను సమర్థవంతంగా నియంత్రించడానికి అత్యుత్తమ మొత్తం తడిచేలా పిచికార్ చేయవలెను. ముందు జాగ్రత్తలు: ద్రావకం తయారీ, చల్లదలలో రక్షణ దుస్తులను ధరించాలి. కలుషితమైన బట్టలు మరియు శరీర భాగాన్ని శుభ్రపరచుకోవాలి. పిచికార్ సమయంలో త్రాగడం, తినడం, పానీయం చేయకండి. విషజలనాలు: కొద్దిగా చర్మం చీకాకు, మెతుకు పట్టుకు, వికారం, వాంతులు, తలనొప్పి, కడుపు నొప్పి, మైకము, బలహీనత, అనారోగ్యం, బద్దకం, కండర తీవ్రత మరియు మూర్చలు సంభవించవచ్చు. ప్రథమ చికిత్స: దయచేసి అతువరచిన కరవత్రమును ముందుగా చదవండి. విరుగుడు: ప్రత్యేక విరుగుడు ఏదీలేదు. రోగి లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయవలెను. సిఫార్సులు: దయచేసి అతువరచిన కరవత్రమును ముందుగా చదవండి. గమనిక: ఈ లిబెల్/లీఫ్లెట్లో నిర్దేశించబడ్డ సలహాకు తప్పి మరి దేనికీ వాడరాదు. తేనెటీగలు మరియు తిరుగుచోట, కోకల కర్మాగ్ర ఈ మందును పిచికార్ చేయరాదు. చేపల పెంపకం, చెరువులు, కుంటలు, నీటి ప్రవాహం దగ్గరలో పిచికార్ చేయరాదు.

Warning: 1. Not to be used on Crop and Pests other than Mentioned on Label & Leaflets. 2. Not to be used for Post-Harvest Application. 3. Destroy container after use as directed on Leaflet. See leaflet. 4. Very toxic to Fish hence harmful to Aquatic Organism, Therefore, not to be used Near Aqua culture. Do not contaminate Lakes, Rivers, Ponds and Streams.

Fipronil 4% w/w + Thiamethoxam 4% w/w SC



DOUBLE ACTION

Systemic and Contact Insecticide

A product of Aegis

Net Content 1L

డబుల్ యాక్షన్ ఫిప్రోనిల్ 4% + థయామిథోక్సామ్ 4% బా/బా (అంతర్జాతీయ మరియు స్పర్శచర్యలుగల కీటకనాశకం)
రసాయన సంఘటన: ఫిప్రోనిల్ స.ప. 4.00% బా/బా, థయామిథోక్సామ్ స.ప. 4.00% బా/బా, సులిథిజిన్ సస్పెండ్ అయిల్ (స్టేబిలైజర్) 4.00% బా/బా, మోనోప్రోపైలినెక్స్ కార్బోనాట్ (ఫ్రీజింగ్ ఏజెంట్) 5.00% బా/బా, సిలికాన్ డిపిఎర్మేట్ (యాంటి ఫామ్) 1.00% బా/బా, బ్లెండ్ ఆఫ్ మోడిఫైడ్ పాలిఇథానాక్సీథర్ ఇథర్ (సర్ఫాక్టెంట్ 1) 3.00% బా/బా, బ్లెండ్ ఆఫ్ సోడియం డోడిసల్ఫేట్ (సర్ఫాక్టెంట్ 2) 3.00% బా/బా, జాంథాన్ గమ్ (థిక్నింగ్ ఏజెంట్) 0.30% బా/బా, మెథైల్ సోథియాజొలిన్ (యాంటి-మైక్రోబియల్ ఏజెంట్) 0.01% బా/బా, డిమినరలైజ్డ్ వాటర్ (సాల్వెంట్) కు.స.వ. తయారీకి, మొత్తము 100.00% బా/బా. **ఉపయోగం:** దయచేసి అతువరచిన కరవత్రమును ముందుగా చదవండి. దశాబ్దం సంఖ్య: పెన్సి ముట్టుడిని బట్టి, 7-14 రోజుల వ్యవధిలో 2-3 స్ప్రేలు అవసరం. ఒక నిజాన్ మూడు స్ప్రేలు ఉండవచ్చు. పునః ప్రవేశం: పెంటల్ పిచికార్ ఎండిపోయి వెంటనే. అప్లికేషన్ సమయం: ఇది ఫాలోయర్ స్ప్రే వర్షం చేయాలి. నిర్ణయ తేల పరిస్థితులు సూచించబడవు. పుష్పించే సమయంలో మరియు సాగుకు ముందు (PHI)ను పరిశీలించిన తరువాత) స్ప్రే చేయవచ్చు. కీటకాలను సమర్థవంతంగా నియంత్రించడానికి అత్యుత్తమ మొత్తం తడిచేలా పిచికార్ చేయవలెను. ముందు జాగ్రత్తలు: ద్రావకం తయారీ, చల్లదలలో రక్షణ దుస్తులను ధరించాలి. కలుషితమైన బట్టలు మరియు శరీర భాగాన్ని శుభ్రపరచుకోవాలి. పిచికార్ సమయంలో త్రాగడం, తినడం, పానీయం చేయకండి. విషజలనాలు: కొద్దిగా చర్మం చీకాకు, మెతుకు పట్టుకు, వికారం, వాంతులు, తలనొప్పి, కడుపు నొప్పి, మైకము, బలహీనత, అనారోగ్యం, బద్దకం, కండర తీవ్రత మరియు మూర్చలు సంభవించవచ్చు. ప్రథమ చికిత్స: దయచేసి అతువరచిన కరవత్రమును ముందుగా చదవండి. విరుగుడు: ప్రత్యేక విరుగుడు ఏదీలేదు. రోగి లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయవలెను. సిఫార్సులు: దయచేసి అతువరచిన కరవత్రమును ముందుగా చదవండి. గమనిక: ఈ లిబెల్/లీఫ్లెట్లో నిర్దేశించబడ్డ సలహాకు తప్పి మరి దేనికీ వాడరాదు. తేనెటీగలు మరియు తిరుగుచోట, కోకల కర్మాగ్ర ఈ మందును పిచికార్ చేయరాదు. చేపల పెంపకం, చెరువులు, కుంటలు, నీటి ప్రవాహం దగ్గరలో పిచికార్ చేయరాదు.

Mfg. Lic. No. : उत्पादन ला.नं. : 019/TS-IML/2016 Dt. 23-07-2016
 Regn. No. : रजि. नं. CIR-168861/2020-Fipronil+ Thiamethoxam (SC)(413)-3041

Manufactured & Marketed by : **Aegis**
 Agro Chemicals India Private Limited
 AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY
 # 237, Main Road, Malleshwari (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295, Telangana State.
 In Case of any Consumer Complaints Contact: "Manage Customer Care" Call No. +91 94880 99538
 Email : aegisagrochemicals@gmail.com
 Website : www.aegisagro.in
 (Address as of Aegis Agro Sangareddy Dist. T.S.)



- Net Contents : 1L
- उत्तमुद्र सामग्री :
- Batch No :
- बैच नं. :
- Mfg.Date :
- उत्पादन तिथि :
- Exp.Date :
- निष्पामग्री होने का तिथि :
- Max.Retail.Price ₹ :
- अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
- (Inclusive of all taxes)
- (सभी करों सहित)

For Agricultural Use Only
 Keep in cool, dry place away from heat and open flame. नहीं, धुआं जगमग से नहीं और खुली लौ से दूर रखें।
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

