Propineb 70% WP (Contact Fungicide)

Propineb 70 WP is a contact fungicide based on Propineb Technical containing 70% w/w. Propineb as active ingredient and balance auxillaries as inert material. Propineb is used as a foliar spray for the control of fungal diseases in different crops.

Recommendations for use :

Name of Crop	Common name of disease	Doses a.i. (%/gram)	Doses Formul-ation (%/gram)	Dilution in Water (Litre/ha)	Waiting period between last spray to harvest (days)
Apple	Scab	0.21% or 210 gram/ 100 lt. water	0.30% or 300 gram/ 100 lt. water	As required depending upon size of the tree and plant protection equipment used.	30 days
Pomegranate	Leaf and fruit spots	0.21% or 210 gram/ 100 lt. water	0.30% or 300 gram/ 100 lt. water	-do-	10 days
Potato	Early & Late Blight	0.21% or 210 gram/ 100 lt. water	0.30% or 300 gram/ 100 lt. water	As required depending upon crop stage and plant protection equipment used.	15 days
Chilli	Dieback	0.35% or 350 gram/ 100 lt. water	0.5% or 500 gram/ 100 lt. water	-do-	10 days
Grapes	Downy Mildew	0.21% or 210 gram/ 100 lt. water	0.30% or 300 gram/ 100 lt. water	-do-	40 days
Tomato	Buck Eye rot	0.21% or 210 gram/ 100 lt. water	0.30% or 300 gram/ 100 lt. water	-do-	10 days
Rice	Brown Leaf spot (Helminthosporium aryzae Narrow leaf spot (Cercospora anyzae)	1050-1400	1500-2000	500 ltrs/ha.	

Direction of Use : Propineb 70 WP should be applied as protectant fungicide with Knapsack, sprayer fitted with flat fan nozzle.

Precautions : Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. Do not eat, drink, smoke while applying. Avoid contact with eyes and skin. Avoid inhalation the spray mist. Wear protective clothing like long slieeved shirt, long pants, hand, gloves shoes and goggles while handling. Thoroughly wash contaminated clothes and parts of the body.

Symptoms : Nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhoea, if swallowed. When inhaled as find dust, irritation to bronchial tube and lungs tissues, Sedation, reduction in general well being, salivation, anorexia, dyspnea, muscle weakness.

First Aid : Induce vomiting by administering a spoonful common salt in a glass of water or insert finger into the throat. Continue till vomit fluid is clear. Call Physician.

Antidote: No specific antidote. Treat symptomatically.

Disposal Of Used Containers : Empty containers should be broken away from habitation. To prevent their re-use, empty containers should not be left outside. Packages or surplus material and washing should be dispose off in a safe manner so as to prevent environment or water pollution.

Storage Conditions : 1. Packages containing the product should be stored in separate, rooms or premises, away from the rooms or premises used for storing other articles or should be kept in separate alimirahs under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticides shall be well built, dry, well lit, dry, well ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with water and vapour.

Chemical Composition:

Propineb Tech. (Min. 80% purity)	87.500% w/w
Precipitated Silica	8.750% w/w
Kaolin	Q.S. to make
Total	**100.00% w/w**

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

ప్రొపినెబ్ 70% డబ్ల్యుపి(స్పర్శచర్యగల శిలీంద్రనాశని)

ప్రొపినెబ్ 70% అనేది పృర్యద్వారా పనిచేసే ఒక శిలీంద్రనాశని. ఇది 70% బ/బ ప్రొపినెబ్ అనే సక్రియ పదార్థము కలిగియున్న ప్రొపినెబ్ సాంకేతికత మీద ఆధారపడి వుంది. మిగతా సహాకౌషధాలు స్తబ్ధత పదార్థాలుగా కలవు. వివిధ పంటలను ఆశించే ఫంగల్ తెగుళ్ళను అరికట్టుకై ఆకులపై జల్లుటకు వాడబడుతుంది.

సిఫారసులు

పంట	తెగులును సామాన్యంగా పిలిచే పేరు	మోతాదు స.స. (%/గ్రాములో)	మోతాదు సూత్రీకరణ % (గ్రాములో)	కలిగించుబుమ నీరు (లీటర్/ హెక్టారు)	చివరి స్ప్రే నుండి కోత కాలం వరకూ చేపివుండాల్సిన సమయం
ఆపిల్	గజ్జి	0.21% లేదా 210 గ్రాములు/ 100 లీటర్ల నీటిలో	0.30% లేదా 300 గ్రాములు/ 100 లీటర్ల నీటిలో	చెట్టు సైజునుబట్టి మరియు మొక్క సంరక్షణ పరికరాలను వాడుబాన్నిబట్టి ఆధారపడి వుంటుంది	30 రోజుల్లో
దానిమ్మ	ఆకు మరియు కాయ మచ్చలు	0.21% లేదా 210 గ్రాములు/ 100 లీటర్ల నీటిలో	0.30% లేదా 300 గ్రాములు/ 100 లీటర్ల నీటిలో	,,	10 రోజుల్లో
బంగాళ-దుంప	ఆకుమాడు	0.21% లేదా 210 గ్రాములు/ 100 లీటర్ల నీటిలో	0.30% లేదా 300 గ్రాములు/ 100 లీటర్ల నీటిలో	పంట దశమునుబట్టి మరియు మొక్క సంరక్షణ పరికరాలను వాడుబాన్నిబట్టి ఆధారపడి వుంటుంది	15 రోజుల్లో
మిరప	ఎండు తెగులు	0.35% లేదా 300 గ్రాములు/ 100 లీటర్ల నీటిలో	0.5% లేదా 500 గ్రాములు/ 100 లీటర్ల నీటిలో	,,	10 రోజుల్లో
ద్రాక్ష	బూజు తెగులు	0.21% లేదా 210 గ్రాములు/ 100 లీటర్ల నీటిలో	0.30% లేదా 300 గ్రాములు/ 100 లీటర్ల నీటిలో	,,	40 రోజుల్లో
టమాట	బక్ ఐ రాట్	0.21% లేదా 210 గ్రాములు/ 100 లీటర్ల నీటిలో	0.30% లేదా 300 గ్రాములు/ 100 లీటర్ల నీటిలో	,,	10 రోజుల్లో
వరి	గోధుమ మచ్చ ఆకులు (హెల్మింథోస్పోరియం) ఇరుకైన ఆకుల స్పాట్ (సెర్కోస్పోర ఎరియజా)	1050-1400	1500-2000	500 లీ/హెక్టారుకు	

వాడుటకు ఉపయోగించే పరికరాలు: రక్షిత శిలీంద్రనాశనిగా ఫ్లాట్‌ఫ్యాన్ నాజల్ బిగించబడిన న్యాప్‌స్యాక్ స్ప్రేయర్ వాడాలి.

ముందు జాగ్రత్తలు: ఆహారపదార్థములు, పంటసామగ్రి మరియు పశువుల దాణాకు దూరంగా నిల్వచేయాలి. దీన్ని వాడేటప్పుడు ఏదైనా తినడం, త్రాగటం లాంటివి చేయరాదు. కళ్ళలో పడకుండా మరియు శరీరానికి అంటకుండా జాగ్రత్తపడాలి. ఈ మందు పొగమంచును లోనికి పీల్చరాదు. రక్షితదుస్తులైన, పూర్తిగా కవర్ అయ్యేలాచొక్కా, పంట్లూం, చేతులకు తొడుగులు, కాళ్ళకు బూట్లు, కళ్ళకు నల్ల కళ్ళద్దాలు మొదలగునవి ధరించాలి. కలుషితమైన శరీర భాగాల్ని శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి.

విషలక్షణాలు: ఒకవేళ దీన్ని మ్రింగినట్లయితే, వికారము, వాంతులవడం, కడుపులో నొప్పి, అతిసారము లాంటివి సంభవించవచ్చు. ఒకవేళ దీన్ని పీల్చినట్యులితే శ్వాసనాళం మరియు ఊపిరితిత్తులలోని టిష్యూలలో దురద పుట్టవచ్చు.

ప్రథమచికిత్స: 1. ఒక గ్లాసు నీటలో చెంచాడు నింపుగా ఉప్పుచేసి కలిపి పట్టించి వాంతి చేయించాలి లేదా గొంతులో వ్రేలు పెట్టి వాంతి చేయించాలి. అలా వాంతి ఫ్లూయిడ్ సాఫీగా వచ్చేంతవరకూ అలా చేస్తూ వుండాలి. వైద్యుని వెంటనే పిలవండి. 2. శుభ్రమైన నీటిలో కలుషితమైన శరీరాన్ని శుభ్రపరచుకోండి. కళ్ళు కలుషితమైతే 15 నిమిలపాలు శుభ్రమైనీటితో కడుక్కోవాలి. అటుతర్వాత డాక్టర్‌గారిని సంప్రదించాలి.

విరుగుడు: విషలక్షణాలను బట్టి చికిత్స జరిపించాలి.

నిల్వ:1. ఈ శిలీంద్రనాశనిగల ప్యాకేజీలను ఇతర పదార్థాలను నిల్వచేసే గదులలో కాకుండా వేరువేరు గదులు లేదా ఆవరణలలో పెట్టి తాళం వేసి బిగించి మాత్రమే నిల్వ చేయాలి. 2. ఈ శిలీంద్రనాశనిని నిల్వచేసే గదులు లేదా ఆవరణలు మంచి గట్టి కట్టడములై, మంచి గాలి, వెలుతురు ప్రసరించేలా విశాలంగా వుండాలి. తద్వారా ఏటి ఆవిరవలన పరిసరాలేమీ, నీరుగానీ కలుషితం కాకుండా కాపాడుకోవచ్చు.

ఖాళీ డబ్బాలను పారవేయు విధానము: ఖాళీ డబ్బాలను పగులకొట్టి మనుష్య సంచారానికి దూరంగా పారవేసుకోవాలి. వాటిని తిరిగి ఏవిధంగానూ వాడకుండా వుండటానికై వాటిని అలా బయట పదలివేయరాదు. ఖాళీ డబ్బాలను, మిగిలినపొయిన మందును, పరికరాలను కడుగగా వచ్చిన నీటిని పరిసరాలు మరియు నీరు కలుషితం కాకుండా కడు జాగ్రత్త వహిస్తూ సురక్షితమైన రీతిలో పారవేసుకోవాలి.

రసాయనిక మిశ్రమము:

ప్రొపినెబ్ టెక్నికల్ ('యు' టెక్నికల్) (80% కనీస శుద్ధత)	87.500% భా/భా
ప్రెసిపిటేటెడ్ సిలికా	8.750% భా/భా
కెయోలిన్	క్యు.యస్. భా/భా
మొత్తం	**100.00% భా/భా**

గమనిక : ఈ లేబుల్ / లీఫ్‌లెట్‌లో నిర్దేశించబడ్డ పంటలకు తప్ప మరి దేనికి వాడరాదు.

प्रॉपिनेब ७० प्रतिशत घुलनशील पाउडर (स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

प्रॉपिनेब ७० डब्ल्यू.पी. एक स्पर्शीय फफूंदीनाशक है जिसके ७० प्रतिशत भार-भार प्रॉपिनेब नामस सक्रिय तत्व है। बाकी निष्क्रिय और सहयोगी पदार्थ इस का प्रयोग विभिन्न फसलों में फफूंद जन्य व्याधियों का रोकथाम के लिए किया जाता है।

उपयोगः

फसल का नाम	रोग का सामान्य नाम	मात्रा सक्रिय तत्व (%/ग्राम)	मात्रा संरचना (%/ग्राम)	पानी की मिश्रण मात्रा (लीटर/ हैक्टेयर)	आखिरी छिड़काव एवं फसल काटने में अंतर (दिनों में)
सेब	पामा	०.२१% अथवा २१० ग्राम/ १०० लीटर पानी	०.३०% वा ३०० ग्राम/ १०० लीटर पानी	आवशक्यतानुसार पेड़ के आकार एवं पौध संरक्षण यन्त्र के आधार पर	३० दिन
अनार	पत्तियों एवं फलों के धब्बे	०.२१% अथवा २१० ग्राम/ १०० लीटर पानी	०.३०% वा ३०० ग्राम/ १०० लीटर पानी	-''-	१० दिन
आलू	अगेती एवं पछेती अंगमारी	०.२१% अथवा २१० ग्राम/ १०० लीटर पानी	०.३०% अथवा ३०० ग्राम/ १०० लीटर पानी	आवशक्यतानुसार फसल की अवस्था और पौध संरक्षण यन्त्र के आधार पर	१५ दिन
मिर्च	डाइ बैक	०.३५% अथवा ३५० ग्राम/ १०० लीटर पानी	०.५% अथवा ५०० ग्राम १०० लीटर पानी	-''-	१० दिन
अंगूर	मृदु रोमिल आसिता	०.२१% अथवा २१० ग्राम/ १०० लीटर पानी	०.३०% अथवा ३०० ग्राम/ १०० लीटर पानी	-''-	४० दिन
टमाटर	ऑख विगलन	०.२१% अथवा २१० ग्राम/ १०० लीटर पानी	०.३०% अथवा ३०० ग्राम/ १०० लीटर पानी	-''-	१०दिन
थान	भूरे धब्बों का रोग तथा सरकोसपोरा धब्बो का रोग	१०५०-१५००	१५००-२०००	५०० ली./हे.	

उपयोग के लिये निर्देश : प्रॉपनेब ७० डब्ल्यू पी का प्रयोग की रोकथाम हेतु रोग के प्रथम लक्षण आने पर पीठ पर लाद कर हस्त चालित छिडकाव कारक यन्त्र द्वारा करना चाहिए।

प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानियाः दवा के खाद्य पदार्थ के स्थान एव बच्चों की पहॅच से दूर रखें, प्रयोग करते समय खाद्य पदार्थों का सेवन या धुम्रपान न करें, त्वचा एंव ऑखों को दवा के संपर्क में न आने दें, दवा की फुआर को नाक या मुँद में न जाने दें, दूषित कपडों एंव त्वचा को साबुनौर पानी से धो डालें, प्रॉपिनेब के सम्पक४ में आने वाले श्रमिकों को सुरक्षात्मक लिबास जैसे लम्बी आस्तीन की कमीज, पतलून, दस्ताने, जूते एंव चश्मा पहनना आवश्यक है।

विष के लक्षणः यदि दवा पेट में गई हो तो वमन की लालसा, उदर शूल एंव अतिसार जैसे लक्षण दिखाइ देंगें। यदि श्वसन द्वारा दवा अन्दर गई हो तो फेफडों एव श्वसन ननिकाओं में लन हो सकती है। नींद आना स्वास्थ्य में गिरावट, लार टपकना, भूख न लगना, कष्ट श्वास, कमजोर मासपेशियों।

प्राथमिक चिकित्साः १. एक गिलास पानी में एक चम्मच नमक मिला कर मिलॉए या गले में उॅगली डालकर वमन कराएँ। यह प्रक्रिया वमन द्रव स्वच्छ निकलने तक करें। चिकित्सक को बुलाएँ। २. दूषित चमडी को पानी से धाएँ यदि ऑखो प्रभावित हुई हो तो जगभग १५ मिनट तक पानी से धोए एंव चिकित्सक की सलाह लें।

विषनाशकः कोइ विशिष्ट विशनाषक नही है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटाराः खाली डिब्बों को तोडकर बस्ती से दूर किसी स्थान पर गाड देना चाहिए, खाली डिब्बों को बाहर ना छोडे ताकि उनको दुबारा काम में न लिया जा सके, डिब्बों में बचा हुआ माल एंव धुलाई का पानी सुरक्षित तरकि से फेके ताकि वातावरण व पानी प्रदूषित न हो।

संग्रहम की शर्तेः १. दवा को ऐसे कमरे जगेह में रखे जो अन्य वस्तुओं के भण्डारण के कमरें या जगह से दूर हो अथवा ताला बंद अलमारी में रखें। २. यह कमरा या स्थान जहॉ यह दवा रखना है ठीक से बना हुआ, सूखा, प्रराशमय, हवादार एव बडे आकर का हो ताकी वातावरण प्रदूषित न हो।

रासायनिक संरचनाः

प्रॉपिनेब सक्रिय तत्व (न्यूनतम शुद्धता ८०%)	८७.५% भार/भार
प्रेसिपिटेटेड सिलिका-	८.७५% भार/भार
केओलिन	शेष भार/भार
कुल	१००.००% भार/भार

सावधानी:लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलवा अन्य फसलों परप्रयोग करना मना है ।

PROGIS

Propineb 70 WP Contact Fungicide

प्रोजिस

प्रॉपिनेब ७० डब्ल्यू.पी. स्पर्शीय फफूँदीनाशक

ప్రొజిస్

ప్రొపినెబ్ 70 డబ్ల్యుపి స్పర్శతో పనిచేసే శిలీంద్రనాశని

ಪ್ರೊಜಿಸ್

ಪ್ರೊಪಿನೆಬ್ 70 ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ ಸಂಪರ್ಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

అత్యంతము ఖతరా ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯ
DANGER
BLUE

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by :

Aegis™
Agro Chemicals India Private Limited

237, Main Road, Mallepally (V),
Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295. Telangana State.
Customer Care Manager No. +91 8498099536
Email: aegisagrochemicals@gmail.com / www.aegisagro.com

Mfg Licence No: 019/TS-IML/2016
Reg.No.:CIR-111299/2014-Propineb (WP)\(344)-8

For Agriculture use only. केवल कृषि उपयोग के लिए।

प्रॉपिनेब ७०%डब्ल्यू.पी. स्पर्शजन्य बुरशीनाशक

खबरदारी : हया लेबल/हस्तपत्रिकेत नेविदिते केलेल्या पीकांखेरीज अन्य कुठल्याहि पीकांवर याचा उपयोग करू नये.

एक स्पर्शजन्य बुरशीनाशक आहे, ज्यात ७०% व/व प्रोपिनेब नावाचे सक्रिय तत्व आहे. बाकी निष्क्रिय आणि सहाय्यक पदार्थ आहेत. त्याचा वापर वेगवेगळ्या पीकात बुरशीजन्य रोगांचे नियंत्रण करण्यासाठी केला जातो.

रासायनिक संरचना:

प्रॉपिनेब टेक्निकल ('यू' टेक्निकल)- (न्यूनतम शुद्धता ८०%)	:	८७.५% व/व
प्रेसिपिटेटेड सिलिका-	:	८.७५% व/व
केओलिन	:	इतर व/व
एकूण	:	१००.००% व/व

वापरासाठी शिफारस:

पीकाचे नाव	रोगाचे सामान्य नाव	दर स.त. (%/ग्रॅम)	दर औषध (%/ग्रॅम)	सौम्य करण्यासाठी पाणी (लिटर/हेक्टरी)	अखेरची फवारणी व काढणी कापणी यामध्ये अंतर (दिवस)
सफरचंद	स्कॅब	०.२१% वा २१० ग्रॅम/१०० लि. पाणी	०.३०% वा ३०० ग्रॅम/१०० लि. पाणी	आवश्यकतानुसार झाडाच्या आकारानुसार आणि रोप सुरक्षा यंत्राच्या आधारावर.	३० दिवस
डाळिंब	पानावरील व फळावरील ठिपके	०.२१% वा २१० ग्रॅम/१०० लि. पाणी	०.३०% वा ३०० ग्रॅम/१०० लि. पाणी	-"-	१० दिवस
बटाटा	सुरुवातीचा आणि नंतरचा करपा	०.२१% वा २१० ग्रॅम/१०० लि. पाणी	०.३०% वा ३०० ग्रॅम/१०० लि. पाणी	आवश्यकतानुसार पीकाच्या वाढीवर आणि रोप सुरक्षा यंत्राच्या आधारावर.	१५ दिवस
मिरची	शेंडे मर	०.३५% वा ३५० ग्रॅम/१०० लि. पाणी	०.५% वा ५०० ग्रॅम १०० लि. पाणी	-"-	१० दिवस
द्राक्ष	डाऊनी मिलड्यू, साखऱ्या (केवडा)	०.२१% वा २१० ग्रॅम/१०० लि. पाणी	०.३०% वा ३०० ग्रॅम/१०० लि. पाणी	-"-	४० दिवस
टोमॅटो	बक डोळा कुजलेला	०.२१% वा २१० ग्रॅम/१०० लि. पाणी	०.३०% वा ३०० ग्रॅम/१०० लि. पाणी	-"-	१० दिवस
तांदूळ	तपकिरी पानांचा ठिपका, अरुंद पानांचा ठिपका	1050-1400	1500-2000	500 ltrs/ha.	

वापरण्याची वेळ आणि वापरावयाची उपकरणी: चा वापर रोगाच्या नियंत्रणासाठी रोगाचे प्राथमिक लक्षण दिसल्या बरोबर फ्लॅटफॅन नोजल बसविलेल्या नॅपसॅक स्प्रेयर द्वारे करावे.

विषाक्तता: एल डी५० (प्रॉपिनेब) : मौखिक घूस > ५००० मि.ग्रॅ./कि.ग्र. शरीर वजन
: मौखिक उंदीर > ५००० मि.ग्रॅ./कि.ग्र. शरीर वजन
: डरमल घूस > ५००० मि.ग्रॅ./कि.ग्र. शरीर वजन

मत्स्यांसाठी विषारीपणा: एलसी ५० (ल्यूसिस्कस आईडस मेलानोटस)- १३३ मिग्रॅ/ली/९६ एच्

वापरदारांसाठी खबरदारी: अन्नपदार्थापासून अन्नपदार्थाच्या रिकामी कंटेनर्स पासून आणि जनावरांच्या चाऱ्यापासून दूर ठेवा. फवारणी करताना खावू, पीवू वा धुम्रपान करू नये. डोळ्यांशी व त्वचेशी संपर्क होवू देवू नका. फवारणीचे तुषार हुंगू नका. हे हाताळताना संरक्षक पोषाख जसा लांब बाह्यांचा शर्ट, लांब पँट, हातमोजे, बूट आणि गॉगल्स वापरावेत. संपर्कात आलेले कपडे आणि शरीराचा भाग स्वच्छ धुवा.

विषबाधेची लक्षणे: पोटात गेल्यास मळमळ, ओकाऱ्या, पोटात दुखणे व हगवण अशी लक्षणे दिसून येतात. श्वासाद्वारे आत गेल्यास फुफ्फुस व श्वासनलिकेत जळजळ होवू शकते. झोप येणे, तब्बेतीत उतार पडणे, लाळ गळणे, भूक न लागणे, श्वास घेण्यास त्रास, मांसपेशित अशक्तपणा.

प्रथमोपचार : १. एक ग्लास पाण्यात, एक चमचा मीठ घालून पाजावे वा गळ्यात बोट घालून उल्टी करवावी, ही प्रक्रिया उल्टी साफ होईपर्यंत करावी डॉक्टरांना बोलवा. २. संपर्कात आलेली त्वचा भरपूर पाण्यात धुवा. जर डोळ्यांशी संपर्क झाला असेल तर ते भरपूर व स्वच्छ पाण्याने जवळजवळ १५ मिनिटे धुवा आणि डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

विषनिवारण: लक्षणानुसार उपचार करा.

साठवण: १. ह्या उत्पादनाची पॅकेजिस इतर माल ठेवण्यासाठी असलेल्या जागा व खोल्या यापासून विशेषतः इतर पदार्थ साठवून ठेवण्याच्या जागेपासून दूर जागी वा खोल्यात, कपाटात कडीकुलुपात ठेवावीत. २. हे कीटकनाशक साठा करून ठेवण्याची जागा उत्तम बांधणीची, कोरडी, हवा खेळती राहणारी, भरपूर उजेडाची व पुरेशी मोठी असावी. त्यामुळे वापर्णी होणारे प्रदूषण टळेल.

डब्यांची उपकरणी धुतलेले पाणी आणि इतर द्रावण यांची विल्हेवाट: रिकामी पॅकजिस मोडून-तोडन वस्तीपासून दूर जागी, जमिनीत खोल पुरावीत. पुनः अन्य कामासाठी वापरली जावू नयेत म्हणून रिकामी पॅकेजिस उघड्यावर टाकू नयेत. पॅकेजिस किंवा उरलेले द्रावण किंवा फवाणीची उपकरणी धुतलेले पाणी यांची विल्हेवाट पर्यावरण किंवा पाणी प्रदूषित होणार नाही अशा सुरक्षित पद्धतीने लावावी.

प्रोपिनेब 70% डब्ल्यू. पी (संपर्क शिलींध्रनाशक)

प्रोपिनेब सक्रीय घटकवरूनी ओलगोंडे प्रोपिनेब टेक्निकल आधारवरूनीयु संपर्क शिलींध्र नाशकवरूनी, इतर बाकी अंश जडघटकांनी मांडलेले. विविध पीकांनी शिलींध्र रोगांनी नियंत्रणसाठी -अन्नु पत्र सिंपरणींयानी वापरलेले.

वापरणीचे शिफारस:

पीक	रोगाचे सामान्य नाव	स.घ. (% ग्रॅम)	प्रमाण फार्मुलेशन (% ग्रॅम)	तेलगोळसाठी नीरु (लीटर/ हेक्टर)	कोनेचे सिंपरणे मत्तु कालावधि
सेब	कज्जिरोग	0.21% अथवा 210 ग्रा./ 100 ली. नीरिनल्लि	0.30% अथवा 300 ग्रा./ 100 ली. नीरिनल्लि	मरद गात्र हागू ओलसिद सद्य संरक्षण उपकरण उपयोगिसि	30 दिनगळु
दाळिंबी	एलै मत्तु हण्णु चुक्कि रोग	0.21% अथवा 210 ग्रा./ 100 ली. नीरिनल्लि	0.30% अथवा 300 ग्रा./ 100 ली. नीरिनल्लि	,,	10 दिनगळु
आलुगड्डे	अदियु मत्तु अंतद्द अंगमारी	0.21% अथवा 210 ग्रा./ 100 ली. नीरिनल्लि	0.30% अथवा 300 ग्रा./ 100 ली. नीरिनल्लि	बेळियु गात्र हागू ओलसिद सद्य संरक्षण उपकरण उपयोगिसि	15 दिनगळु
मेणसिन कायि	ड्रैब्ब्याक् (कोनेयु ऊणगुव रोग)	0.35% अथवा 300 ग्रा./ 100 ली. नीरिनलि	0.5% अथवा 500 ग्रा./ 100 ली. नीरिनलि	,,	10 दिनगळु
द्राक्षि	बूदिरोग	0.21% अथवा 210 ग्रा./ 100 ली. नीरिनल्लि	0.30% अथवा 300 ग्रा./ 100 ली. नीरिनल्लि	,,	40 दिनगळु
टमॅटोचे	बक् कण्णिन कॉळेक	0.21% अथवा 210 ग्रा./ 100 ली. नीरिनल्लि	0.30% अथवा 300 ग्रा./ 100 ली. नीरिनल्लि	,,	10 दिनगळु
आक्कि	ब्रौन् लीफ् स्पॉट् (कंदुगोड्डुकुळियुव) किळगे एलै कैदिदाद एलै स्पॉट् (सॅप्टोरीया ब्रिरियु)	1050-1400	1500-2000	500ली./हा	

बळसुव समयु मत्तु औषधोगळ्ळे सलकरणे: फ्लाट् फ्यान् नासल् इरुव न्याप्स्याक् स्प्रेयर्‌निंद सिंपरणे शिलींध्र नाशकवरूनी यन्नु बळसबेकु.

बळसुवदरिंगे मुन्नेच्चरिकेगळु: आहार पदार्थगळु, औषधियादे आहार सामग्रि, इद्दुव साधनगळु हागू पशुगळ मेलिनिंद दूरवेयिरि. प्रयोगिसुवागे एनन्नू तिन्नबेडि, कुडियबेडि अथवा धूमपान मांडबेडि. कण्णु हागू चर्मक्कु तगलदंतॆ जाग्रतॆ वहिसि. सिंपरणेयु तुंतुरुगळिंद दूरवेयिरि. उद्दुत्तॆयु अंगि, उद्दुप्पाकुंडु, कैचीलगळु, ऊटुगळु हागू तंदुप कन्नडक (गाग्ल्स्) गळंतह रक्षणा उडुगेगळन्नु बळसुवागे धरिसिरि. देह भागगळु हागू बट्टेबरेगळन्नु कॆलुवेतगोंडाग सादुंतॆ कॊळेयिरि.

विष तगिदिद लक्षणगळु: वाकरिकॆ, वाऽति, उदरशूलॆ, बेंदि-ऒंदोंमॆ हॊट्टियॊळगॆ सॆरिदद्दु, सूक्ष्म दूळिन रूपदंदु ऎसरिन मूलक ऒळप्रवॆशिसिदद्दु, श्वासनाळ हागूं श्वासकोशगळ ऒंगाऽळ (इश्ट्रू)गळल्लि ऊरुतॆ-कॆरॆतॆ ऊंटाग्रॆगळुबहुदु.

प्रथमॆ चिकित्सॆ: 1. ऒंदु ग्लास् निरुनि ऒंदु चमचॆ उप्पु बॆरसि ई निरु कुडिसि वाऽति माडलु प्रॆरॆरॆसिरिदॆ. वाऽतिऒयागलु गंटॆल ऎंटॆदिगॆ बॆरॆयु तूरिसबहुदु. वाऽतियु द्रव्य शॆगिळुव्वद वरॆगॆ ऎरॆगि माडुतॆरि. डाक्टररन्नु करॆतॆयिरि. 2. हॆरळ निरिनिंद सलुवितगोंडद चर्मवन्नु तॊळॆयॆरि. कण्णुगळगॆ प्रभावव्वागिद्दल्लि हॆरळ स्वच्छ निरिनिंदद 15 निमिषगळ वरॆगॆ कण्णुगळगॆ निरु हायिसि तॊळॆयॆरि. जॊंडॆगॆ डाक्टरर सलहॆ पडॆयॆरि.

प्रत्यौषधः लक्षणानुसार चिकित्सॆ.

शेल्फ लाइफ्: 1. ऒत्तन्नुविरुव प्याकॆजुगळन्नु प्रत्यॆक कोणॆ अथवा कट्टडदल्लि, इतर पदार्थगळन्नु दाऽन्नु माडुव कोणॆ अथवा कट्टडदिंदद दूरवागि शॆल्फ्‌ऒयिसबेकु. इल्लवॆ प्रत्यॆक अलमारिनल्लि बॆगॆ हाकॆ भद्र प्रदेशिसबेकु. 2. शॆल्फ्‌ऒयिसुवद कोणॆ ऒथवा कट्टड चिन्नागि कट्टल्पट्टिरबेकु. अल्लि चिन्नद बॆळकॆदु शुद्ध वाऽतावरणविरबेकु. अल्लि ऒळॆयु गाळियाडुत्तिरबेकु हागूं निरिन हॆबॆयॊंदिगॆ मलिनवाग्रुव सादुंतॆ इल्लदिरुव सलुवागि कोणॆ अथवा कट्टड साकॆप्पु ऎशालवागि कट्टल्पट्टिरबेकु.

औषधोपचार: 1. ऒंदु ग्लास् निरुनि ऒंदु चमचॆ उप्पु हाकि ऒळॆयु बॆरॆयु ईनिरु कुडिसि वाऽति माडलु प्रॆरॆरॆसिरिदॆ. वाऽतियॊगलु गंटॆल ऎंटॆदिगॆ बॆरॆयु तूरिसबहुदु. वाऽतियु द्रव्य शॆगिळुव्वद वरॆगॆ ऎरॆगि माडुतॆरि. डाक्टरर सलहॆ करॆतॆयिरि. 2. हॆरळ निरिनिंद सलुवितगोंडद चर्मवन्नु तॊळॆयॆरि. कण्णुगळगॆ प्रभावव्वागिद्दल्लि हॆरळ स्वच्छ निरिनिंद 15 निमिषगळ वरॆगॆ कण्णुगळगॆ निरु हायिसि तॊळॆयॆरि. जॊंडॆगॆ डाक्टरर सलहॆ पडॆयॆरि.

औषधोपचार: 1. ऒत्तन्नुविरुव प्याकॆजुगळन्नु प्रत्यॆक कोणॆ अथवा कट्टडदल्लि, इतर पदार्थगळन्नु दाऽन्नु माडुव कोणॆ अथवा कट्टडदिंदद दूरवागि शॆल्फ्‌ऒयिसबेकु. इल्लवॆ प्रत्यॆक अलमारिनल्लि बॆगॆ हाकॆ भद्र प्रदेशिसबेकु. 2. शॆल्फ्‌ऒयिसुवद कोणॆ ऒथवा कट्टड चिन्नागि कट्टल्पट्टिरबेकु. अल्लि चिन्नद बॆळकॆदु शुद्ध वाऽतावरणविरबेकु. अल्लि ऒळॆयु गाळियाडुत्तिरबेकु हागूं निरिन हॆबॆयॊंदिगॆ मलिनवाग्रुव सादुंतॆ इल्लदिरुव सलुवागि कोणॆ अथवा कट्टड साकॆप्पु ऎशालवागि कट्टल्पट्टिरबेकु