

పారాక్వాట్ డైక్లోరైడ్ 24% యస్.ఎల్. - వివక్షణరహిత స్వచ్ఛందంగా కలుపుతూ
 రసాయన మిశ్రమము : పారాక్వాట్ డైక్లోరైడ్ స.ప. (స.ప. స్వచ్ఛందం అత్యధికం) ... 24.00% ఖా/ఖా, నాన్లెఫ్ ఫినాల్ ఐథిలీన్ ఆక్సైడ్ కండెన్సేట్ ... 1.00% ఖా/ఖా, ఖా/ఖా ఆక్సైడ్ ఐథిలీన్ కండెన్సేట్ ... 4.00% ఖా/ఖా, సిలెసిన్-డిఫోమర్ ... 0.10% ఖా/ఖా, డై ఆసిడ్ ఐ ... 0.05% ఖా/ఖా, సెమిటిక్ ప్రై ... 0.05% ఖా/ఖా, సెడ ... క్యు.యస్., మెత్తము ... 100.00% ఖా/ఖా. మందు ఉపయోగించుటకు సూచనలు : అభివృద్ధి కరణమునకు దయచేసి వడపండి. మందు తాగితము : మందు ప్రాథమమున సిల్వాలను పర్వము వర్షమునకు అంటియించుట. కలపిత వర్షమును పట్టుకును తుప్పరము తొనవడెను. మందు ఉపయోగించిన వెంటనే ఖాళీ ద్రావణము నాశనము చేయండి. మందును అభివృద్ధిమును మరియు పశుప్రాసముకు దూరంగా ఉంచవలెను. ఔషధ చికిత్స : పరల మరియు వాంతి చేయించండి మరియు ఉదరము తుప్పరమునకు ఖాళీ ద్రావణ 30% స్పెసిఫిక్ చేసిన వెంటనే తుప్పర ద్రావణము 500 మి.లీ. ఇవ్వండి. పరల 2-4 గంటల విరామముతో ఇవ్వండి. రోగిలక్షణములను అడ్డీ చికిత్స చేయండి. సిఫారసులు : దీనిని తేయాకుపైరులోను కుం, ఉద, గొర్రె, దప్పగడ్డి, తానగడ్డి మరియు బంగాళాదుంప, ప్రత్తి, రబ్బరు, పం, గోధుమ, ప్రాజ్ సెక్టర్లో వచ్చు అప్పుడ తా, పాములాకు, నేల ఉసిరి, బుడమతాయతో కలిపి, దప్పగడ్డి, నక్షత్రగడ్డి, తొలకాకు పండి కలుపుమువలె మరియు నీటిని తేలవలె అభివృద్ధిమును సహించుటకు ఉపయోగించవలెను. గమనిక : ఈ టేబుల్ / టిప్స్ డైట్ నిర్దేశించబడ్డ పంటలకు వర్షము ఉండి చేసే వాడరాదు.

పారాకాట్ డైక్లోరైడ్ 24% ఘనమున లక్షణము - స్పర్శీయ ఖరపవరణాశక
 రసాయనిక సంఘటన : పారాకాట్ డైక్లోరైడ్ ఐ.ఆర్.ఎ. (భారానుసార 900% స.త. పర ఆధారిత) ... 24.00% భార/భార, నోనాడల్ ఫినోల్ ఎథిలీన్ ఆక్సైడ్ కండెన్సేట్ ... 9.00% భార/భార, కిలెసిన్ డైథిలీన్ ఆక్సైడ్ కండెన్సేట్ ... 4.00% భార/భార, సిలెసిన్ డైథిలీన్ ఆక్సైడ్ కండెన్సేట్ ... 0.10% భార/భార, డై ఆసిడ్ కండెన్సేట్ ... 0.05% భార/భార, సెమిటిక్ ప్రై ... 0.05% భార/భార, సెడ ... క్యు.యస్., మెత్తము ... 100.00% భార/భార. మందు ఉపయోగించుటకు సూచనలు : అభివృద్ధి కరణమునకు దయచేసి వడపండి. మందు తాగితము : మందు ప్రాథమమున సిల్వాలను పర్వము వర్షమునకు అంటియించుట. కలపిత వర్షమును పట్టుకును తుప్పరము తొనవడెను. మందు ఉపయోగించిన వెంటనే ఖాళీ ద్రావణము నాశనము చేయండి. మందును అభివృద్ధిమును మరియు పశుప్రాసముకు దూరంగా ఉంచవలెను. ఔషధ చికిత్స : పరల మరియు వాంతి చేయించండి మరియు ఉదరము తుప్పరమునకు ఖాళీ ద్రావణ 30% స్పెసిఫిక్ చేసిన వెంటనే తుప్పర ద్రావణము 500 మి.లీ. ఇవ్వండి. పరల 2-4 గంటల విరామముతో ఇవ్వండి. రోగిలక్షణములను అడ్డీ చికిత్స చేయండి. సిఫారసులు : దీనిని తేయాకుపైరులోను కుం, ఉద, గొర్రె, దప్పగడ్డి, తానగడ్డి మరియు బంగాళాదుంప, ప్రత్తి, రబ్బరు, పం, గోధుమ, ప్రాజ్ సెక్టర్లో వచ్చు అప్పుడ తా, పాములాకు, నేల ఉసిరి, బుడమతాయతో కలిపి, దప్పగడ్డి, నక్షత్రగడ్డి, తొలకాకు పండి కలుపుమువలె మరియు నీటిని తేలవలె అభివృద్ధిమును సహించుటకు ఉపయోగించవలెను. గమనిక : ఈ టేబుల్ / టిప్స్ డైట్ నిర్దేశించబడ్డ పంటలకు వర్షము ఉండి చేసే వాడరాదు.

పారాక్వాట్ డైక్లోరైడ్ 24% ఎస్.ఎల్. సంచర సస్పెన్షన్
 రసాయనిక మిశ్రమము : పారాక్వాట్ డైక్లోరైడ్ ఎ.ఐ. (100% తులక/తులక అధారిత) ... 24.00% తులక/తులక, నోనాడల్ ఫినోల్ ఎథిలీన్ ఆక్సైడ్ కండెన్సేట్ ... 9.00% తులక/తులక, కిలెసిన్ డైథిలీన్ ఆక్సైడ్ కండెన్సేట్ ... 4.00% తులక/తులక, సిలెసిన్ డైథిలీన్ ఆక్సైడ్ కండెన్సేట్ ... 0.10% తులక/తులక, డై ఆసిడ్ కండెన్సేట్ ... 0.05% తులక/తులక, సెమిటిక్ ప్రై ... 0.05% తులక/తులక, సెడ ... క్యు.యస్., మెత్తము ... 100.00% తులక/తులక. మందు ఉపయోగించుటకు సూచనలు : అభివృద్ధి కరణమునకు దయచేసి వడపండి. మందు తాగితము : మందు ప్రాథమమున సిల్వాలను పర్వము వర్షమునకు అంటియించుట. కలపిత వర్షమును పట్టుకును తుప్పరము తొనవడెను. మందు ఉపయోగించిన వెంటనే ఖాళీ ద్రావణము నాశనము చేయండి. మందును అభివృద్ధిమును మరియు పశుప్రాసముకు దూరంగా ఉంచవలెను. ఔషధ చికిత్స : పరల మరియు వాంతి చేయించండి మరియు ఉదరము తుప్పరమునకు ఖాళీ ద్రావణ 30% స్పెసిఫిక్ చేసిన వెంటనే తుప్పర ద్రావణము 500 మి.లీ. ఇవ్వండి. పరల 2-4 గంటల విరామముతో ఇవ్వండి. రోగిలక్షణములను అడ్డీ చికిత్స చేయండి. సిఫారసులు : దీనిని తేయాకుపైరులోను కుం, ఉద, గొర్రె, దప్పగడ్డి, తానగడ్డి మరియు బంగాళాదుంప, ప్రత్తి, రబ్బరు, పం, గోధుమ, ప్రాజ్ సెక్టర్లో వచ్చు అప్పుడ తా, పాములాకు, నేల ఉసిరి, బుడమతాయతో కలిపి, దప్పగడ్డి, నక్షత్రగడ్డి, తొలకాకు పండి కలుపుమువలె మరియు నీటిని తేలవలె అభివృద్ధిమును సహించుటకు ఉపయోగించవలెను. గమనిక : ఈ టేబుల్ / టిప్స్ డైట్ నిర్దేశించబడ్డ పంటలకు వర్షము ఉండి చేసే వాడరాదు.

పారాక్వాట్ డైక్లోరైడ్ 24% ఎస్.ఎల్. సంచర సస్పెన్షన్
 రసాయనిక మిశ్రమము : పారాక్వాట్ డైక్లోరైడ్ ఎ.ఐ. (100% తులక/తులక అధారిత) ... 24.00% తులక/తులక, నోనాడల్ ఫినోల్ ఎథిలీన్ ఆక్సైడ్ కండెన్సేట్ ... 9.00% తులక/తులక, కిలెసిన్ డైథిలీన్ ఆక్సైడ్ కండెన్సేట్ ... 4.00% తులక/తులక, సిలెసిన్ డైథిలీన్ ఆక్సైడ్ కండెన్సేట్ ... 0.10% తులక/తులక, డై ఆసిడ్ కండెన్సేట్ ... 0.05% తులక/తులక, సెమిటిక్ ప్రై ... 0.05% తులక/తులక, సెడ ... క్యు.యస్., మెత్తము ... 100.00% తులక/తులక. మందు ఉపయోగించుటకు సూచనలు : అభివృద్ధి కరణమునకు దయచేసి వడపండి. మందు తాగితము : మందు ప్రాథమమున సిల్వాలను పర్వము వర్షమునకు అంటియించుట. కలపిత వర్షమును పట్టుకును తుప్పరము తొనవడెను. మందు ఉపయోగించిన వెంటనే ఖాళీ ద్రావణము నాశనము చేయండి. మందును అభివృద్ధిమును మరియు పశుప్రాసముకు దూరంగా ఉంచవలెను. ఔషధ చికిత్స : పరల మరియు వాంతి చేయించండి మరియు ఉదరము తుప్పరమునకు ఖాళీ ద్రావణ 30% స్పెసిఫిక్ చేసిన వెంటనే తుప్పర ద్రావణము 500 మి.లీ. ఇవ్వండి. పరల 2-4 గంటల విరామముతో ఇవ్వండి. రోగిలక్షణములను అడ్డీ చికిత్స చేయండి. సిఫారసులు : దీనిని తేయాకుపైరులోను కుం, ఉద, గొర్రె, దప్పగడ్డి, తానగడ్డి మరియు బంగాళాదుంప, ప్రత్తి, రబ్బరు, పం, గోధుమ, ప్రాజ్ సెక్టర్లో వచ్చు అప్పుడ తా, పాములాకు, నేల ఉసిరి, బుడమతాయతో కలిపి, దప్పగడ్డి, నక్షత్రగడ్డి, తొలకాకు పండి కలుపుమువలె మరియు నీటిని తేలవలె అభివృద్ధిమును సహించుటకు ఉపయోగించవలెను. గమనిక : ఈ టేబుల్ / టిప్స్ డైట్ నిర్దేశించబడ్డ పంటలకు వర్షము ఉండి చేసే వాడరాదు.



Paraquat Dichloride 24% SL

Non-Selective Contact Herbicide



बच्चों की पहुंच से दूर रखें
 పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి
 मಕ್ಕुल कृषी सिंगरोंत भद्रवानी शिडी
 Keep out of reach of children.
 READ LEAFLET BEFORE USE

A product of Aegis™

PARAQUATE DICHLORIDE 24% SL - NON-SELECTIVE CONTACT HERBICIDE

Chemical Composition : Paraquat Dichloride a.i. (based on 100% w/w a.i.) ... 24.00% w/w, Nonyl phenol Ethylene Oxide Condensate ... 1.00% w/w, Cocamine Ethoxylyate ... 4.00% w/w, Silicon-Difoamer ... 0.10% w/w, Dye Acid Blue ... 0.05% w/w, Emetic Dye ... 0.05% w/w, Water ... Q.S., Total ... 100.0% w/w. Direction for Use: Please read enclosed leaflet before use. Precautions: Avoid inhalation and skin contact. Wash contaminated skin & clothes. Destroy empty containers after use. Keep away from animal feeds and food stuff. Antidote : Induce vomiting repeatedly and wash out stomach give 500 ml. of 30% suspension of sterilized bento or fullers earh orally. Repeat after 2-4 hours. Treat Symptomatically. First Aid : Please read enclosed leaflet before use. Symptoms : Please read enclosed leaflet before use. Recommendations : It is used to control imperata cylindrica, Setaria sp., Commelina benghalensis, Boerhavia hispida paspa-lum conjugatum of tea and weeds of potato, Cotton, Rubber, Rice, Wheat, Grapes & Aquatic Weeds. Caution : Not to be used on Crops other than specified on this label/leaflet.

Regn.No / రజి నం. :
 CIR-112182/2014-Paraquat Dichloride (SL) (344)-53
 Mfg.Lic.No / ఉత్పాదక లాయ్సెస్. నం. : 019/TS-IML/2016 Dt. 23-7-2016

Manufactured & Marketed by :
Aegis™
 Agro Chemicals India Private Limited
 AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY
 # 237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295, Telangana State.
In Case of any Consumer Complaints Contact
 Manager Customer Care Cell No. : +91 8498099536
 Email: aegiagrochemicals@gmail.com / Website : www.aegiagro.com
 address in of Aegis Agro Chemicals Dist. TS.

Net Contents : **1L**
 ఉత్పాదక సామగ్రి :
 Batch No :
 బేచ నం. :
 Mfg.Date :
 ఉత్పాదన తిథి:
 Exp.Date :
 నిష్పాదన తిథి:
 Max.Retail.Price ₹ :
 అధికతమ ఖుదరా మూల్య ₹ :
 (Inclusive of all taxes)
 (సామి కరొ సహిత)

For Agricultural Use Only
 Keep in cool, dry place away from heat and open flame. శీల, शुष्क जगह में रखा जाए और खुले लौ से दूर रखें
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE