

हेक्साकोनोजोल ५% ई.सी. (पद्धतशीर बुरुशीनाशक)
खरवरी: हा खरवरीहतातिकेत निवेदित केलेल्या पीकांकेर याच कुटव्हाहि पीकांकेर याच उपयोग करा नो. हे एक पद्धतशीर बुरुशीनाशक असून त्याप्यं हेक्साकोनोजोल ५% कृतीर्थील घटक आहे आणि समतोल आनुभविंग घटक आहेत.

सुचना:	प्रक्रिया / संरचना	मात्रा / इक्वी	शब्दांची कवाणी ने सुरु वाराणी	प्रक्रिया / विवर
प्रक्रिया नाव:	हेक्साकोनोजोल ५% ई.सी. (पद्धतशीर बुरुशीनाशक)	मात्रा / इक्वी	शब्दांची कवाणी ने सुरु वाराणी	प्रक्रिया / विवर
ए. आपाच:	त्रिग्राम (प्रिज.)	पायांगील विवर	शब्दांची कवाणी ने सुरु वाराणी	(विवरात)
सफार्वर्ड चूक्टोग:	०.००१५%	०.०५%	जस्ती प्रमाणे	३०
भारत उत्पादक:	५० मि.लि./१००ग्राम			
आपाच अंतर्भूत:	५०	१०००	५००	५०
भूमध्य विवरात वापानक्त:	७५	१०००	५००	५०
आवा पायांगील विवर:	०.००५%	०.१%	जस्ती प्रमाणे	३०
	(ग्रा. / १००ग्रा.)	१०० मि.लि./१००ग्रा.		

. फवारीची मिथग त्यावर करणे:
हेक्साकोनोजोल ५% ई.सी. आवश्यक तेवढे घ्या आणि थोड्या पायाण घालून काढीन ठवाणा नंतर फवारीची ठवाणा हवे तेवढे पाणी त्यावर घालून मिथग पुन्हा घार्य प्रकारे काढीन ठवाणा।

ब. वनस्पती संरक्षक साचेत:

नंपसंक श्रेवर, पायाण चालवायचा श्रेवर, कॉर्प्शन नंपसंक श्रेवर, एसपीई एफटीप्री स्प्रयरचा कॉर्प्शन नंपसंक श्रेवर वापरा।

विषवारीची चिन्हे आणि लक्षणे:
विषनकता, अधीरता थरथर, वकता आणि दृश्य दुष्परिणाम.

प्रथमोपचारे उपायः
जर गिळल्यांस घशात वोटे घालून उल्टी करायला भाग पाडणे, वापित त्याचा आणि कपडे धुवा आणि सरवासाथाऱ्या सलाइनने डाळे धुवा।

अंपीधोपचारः
गिळल्याल देवदनाना प्रतिवंध होण्यासाठी जटासंवंधीचे काळजीपूर्वक उपचार करायात लक्षणनुसार उपचार करावेता।

साठवणूकः
१. बुरुशीनाशक असलेली पाकीटे वेगळ्या खोलीत किवा जगेत ठेवावीत।
विशेषता:
इतर पदार्थ आणि मुख्याते अन्व पदार्थ साठवियाच्या खोलीत ठेव नवेत।
बुरुशीनाशक अपांते आकामानुसार आणि बुरुशीनाशक पाकीटे आकामानुसार आणि बुरुशीनाशकाच्या स्वरूपानुसार वेगळ्या कायापात कीटी कूलापात ठेवावीत।
२. बुरुशीनाशक साठवियाची खोली चांगोी वंथलेली कोरीली प्रकाशायुक्त असारी।
त्यात हवा खेळी असारी वापीभवानापुढे दुप्रतीकरण ठाण्यासाठी पुढेर्या कोनांप्यं असारी।

रिकाम्या डव्हर्याचा नाश करणे:
१. पाकीटे तांडून मनुव्यासाती पायास दूर गाडीत।
२. वापालेली साठवियाची ठेवू नवेत त्याप्यं त्याच्या पुनर्वापवार प्रतिवंध होईला।
३. पाकीटे की अतिरिक्त साहित्य आणि मीठीन धुवालेले त्रावण आणि डवे यांची सुरुपत घडतीने दिलेवाट लावावी ज्यामुळे पर्यावरण किवा पायाणा प्रदुषणास प्रतिवंध होईला।

वापरप्रयातील मर्यादा आपाच:

जर कोटक, मासे, पायाण, जांवार पक्षी आणि पाणीवी प्राणी यांना इंजा होण्याची शक्यता असल्यास त्या परिस्थितीने हे वापरू नवे।

वापराच्यानाचे व्यवहारी काळजी:
उपायात आणि ज्यालापात दूर थंड कोरड्या जागी ठेवा जेथे अन्व पदार्थ आणि प्रायाचे खाद्य असारा नाही, फवारीची करत असलाना धुप्रापान, त्याव्याख्य सेवन, याण किंवा पिणे करू नका. त्याच्या सरपक टाणा. फवारीची कल्यानतर वापायत त्या धुवा।

सामयिक संरचना:

हेक्साकोनोजोल टेक ०५.५% डव्हर्या/डव्हर्या-ए.पल पर आधारीत

इतर अंपीधी पदार्थः
अ. स्टारिनेट पिनाईल इथिलीन आकामाड कॉटेसेट ०५.०% डव्हर्या/डव्हर्या व. डोडेसिल वेनीन सल्पोनिक एसिड काल्शीयम सॉल्ट ०५.०% डव्हर्या/डव्हर्या

विवर - एपोमेक्स १८.५% डव्हर्या/डव्हर्या

हेक्साकोनोजोल ५% ई.सी. (अंतर्वाहील त्रीप्रीद्यनातर)
मुक्ती: बुरुशीनाशक साठवियाची ठेवू नवेत त्याची खोली आणि बुरुशीनाशक असलेली त्यात त्रीप्रीद्यनातर ५% संतुष्टी घालून घुम्तुणारी नवायात घुम्तुणारी घालून घुम्तुणारी असेही त्रीप्रीद्यनातर वाहात आहेत.

त्रिप्रीद्यनातर:

प्रक्रिया	प्रक्रिया / विवर	त्रीप्रीद्यनातर	त्रीप्रीद्यनातर	त्रीप्रीद्यनातर
प्रक्रिया नाव:	हेक्साकोनोजोल ५% ई.सी. (अंतर्वाहील त्रीप्रीद्यनातर)	मात्रा / इक्वी	शब्दांची कवाणी ने सुरु वाराणी	प्रक्रिया / विवर
ए. आपाच:	त्रिग्राम (प्रिज.)	पायांगील विवर	शब्दांची कवाणी ने सुरु वाराणी	(विवरात)
सफार्वर्ड चूक्टोग:	०.००१५%	०.०५%	जस्ती प्रमाणे	३०
भारत उत्पादक:	५० मि.लि./१००ग्राम			
आपाच अंतर्भूत:	५०	१०००	५००	५०
भूमध्य विवरात वापानक्त:	७५	१०००	५००	५०
आवा पायांगील विवर:	०.००५%	०.१%	जस्ती प्रमाणे	३०
	(ग्रा. / १००ग्रा.)	१०० मि.लि./१००ग्रा.		

. फवारीची मिथग त्यावर करणे:
हेक्साकोनोजोल ५% ई.सी. आवश्यक तेवढे घ्या आणि थोड्या पायाण घालून काढीन ठवाणा नंतर फवारीची ठवाणा हवे तेवढे पाणी त्यावर घालून मिथग पुन्हा घार्य प्रकारे काढीन ठवाणा।

ब. वनस्पती संरक्षक साचेत:

नंपसंक श्रेवर, पायाण चालवायचा श्रेवर, कॉर्प्शन नंपसंक श्रेवर, एसपीई एफटीप्री स्प्रयरचा कॉर्प्शन नंपसंक श्रेवर असलेली ठवाणा नंतर फवारीची ठवाणा द्यावा आणि लक्षात घालून काढीन ठवाणा।

विषवारीची चिन्हे आणि लक्षणे:
विषनकता, अधीरता थरथर, वकता आणि दृश्य दुष्परिणाम.

प्रथमोपचारे उपायः
जर गिळल्यांस घशात वोटे घालून उल्टी करायला भाग पाडणे, वापित त्याचा आणि कपडे धुवा आणि सरवासाथाऱ्या सलाइनने डाळे धुवा।

अंपीधोपचारः
गिळल्याल देवदनाना प्रतिवंध होण्यासाठी जटासंवंधीचे काळजीपूर्वक उपचार करायात लक्षणनुसार उपचार करावेता।

साठवणूकः
१. बुरुशीनाशक असलेली पाकीटे वेगळ्या खोलीत किवा जगेत ठेवावीत।
विशेषता:
इतर पदार्थ आणि मुख्याते अन्व पदार्थ साठवियाच्या खोलीत ठेव नवेत।
बुरुशीनाशक अपांते आकामानुसार आणि बुरुशीनाशक पाकीटे आकामानुसार आणि बुरुशीनाशकाच्या स्वरूपानुसार वेगळ्या कायापात कीटी कूलापात ठेवावीत।
२. बुरुशीनाशक साठवियाची खोली चांगोी वंथलेली कोरीली प्रकाशायुक्त असारी।
त्यात हवा खेळी असारी वापीभवानापुढे दुप्रतीकरण ठाण्यासाठी पुढेर्या कोनांप्यं असारी।

रिकाम्या डव्हर्याचा नाश करणे:
१. पाकीटे तांडून मनुव्यासाती पायास दूर गाडीत।
२. वापालेली साठवियाची ठेवू नवेत त्याप्यं त्याच्या पुनर्वापवार प्रतिवंध होईला।
३. पाकीटे की अतिरिक्त साहित्य आणि मीठीन धुवालेले त्रावण आणि डवे यांची सुरुपत घडतीने दिलेवाट लावावी ज्यामुळे पर्यावरण किवा पायाणा प्रदुषणास प्रतिवंध होईला।

वापरप्रयातील मर्यादा आपाच:

जर कोटक, मासे, पायाण, जांवार पक्षी आणि पाणीवी प्राणी यांना इंजा होण्याची शक्यता असल्यास त्या परिस्थितीने हे वापरू नवे।

वापराच्यानाचे व्यवहारी काळजी:
उपायात आणि ज्यालापात दूर थंड कोरड्या जागी ठेवा जेथे अन्व पदार्थ आणि प्रायाचे खाद्य असारा नाही, फवारीची करत असलाना धुप्रापान, त्याव्याख्य सेवन, याण किंवा पिणे करू नका. त्याच्या सरपक टाणा. फवारीची कल्यानतर वापायत त्या धुवा।

सामयिक संरचना:

हेक्साकोनोजोल टेक ०५.५% डव्हर्या/डव्हर्या

बेहुकलाकोनोजोल ५% ई.सी. (आउट्रेलिंग बेहुकलाकोनोजोल)
मुक्ती: बुरुशीनाशक साठवियाची ठेवू नवेत त्याची खोली आणि बुरुशीनाशक असलेली त्यात आउट्रेलिंग ५% संतुष्टी घालून घुम्तुणारी नवायात घुम्तुणारी असेही त्रीप्रीद्यनातर वाहात आहेत.

त्रिप्रीद्यनातर:

प्रक्रिया	प्रक्रिया / विवर	त्रिप्रीद्यनातर	त्रिप्रीद्यनातर	त्रिप्रीद्यनातर
प्रक्रिया नाव:	हेक्साकोनोजोल ५% ई.सी. (आउट्रेलिंग बेहुकलाकोनोजोल)	मात्रा / इक्वी	शब्दांची कवाणी ने सुरु वाराणी	प्रक्रिया / विवर
ए. आपाच:	त्रिग्राम (प्रिज.)	पायांगील विवर	शब्दांची कवाणी ने सुरु वाराणी	(विवरात)
सफार्वर्ड चूक्टोग:	०.००१५%	०.०५%	जस्ती प्रमाणे	३०
भारत उत्पादक:	५० मि.लि./१००ग्राम			
आपाच अंतर्भूत:	५०	१०००	५००	५०
भूमध्य विवरात वापानक्त:	७५	१०००	५००	५०
आवा पायांगील विवर:	०.००५%	०.१%	जस्ती प्रमाणे	३०
	(ग्रा. / १००ग्रा.)	१०० मि.लि./१००ग्रा.		

. फवारीची मिथग त्यावर करणे:
हेक्साकोनोजोल ५% ई.सी. आवश्यक तेवढे घ्या आणि थोड्या पायाण घालून काढीन ठवाणा नंतर फवारीची ठवाणा हवे तेवढे पाणी त्यावर घालून मिथग पुन्हा घार्य प्रकारे काढीन ठवाणा।

ब. वनस्पती संरक्षक साचेत:

नंपसंक श्रेवर, पायाण चालवायचा श्रेवर, कॉर्प्शन नंपसंक श्रेवर, एसपीई एफटीप्री स्प्रयरचा कॉर्प्शन नंपसंक श्रेवर असलेली ठवाणा नंतर फवारीची ठवाणा द्यावा आणि लक्षात घालून काढीन ठवाणा।

विषवारीची चिन्हे आणि लक्षणे:
विषनकता, अधीरता थरथर, वकता आणि दृश्य दुष्परिणाम.

प्रथमोपचारे उपायः
जर गिळल्यांस घशात वोटे घालून उल्टी करायला भाग पाडणे, वापित त्याचा आउट्रेलिंग बेहुकलाकोनोजोल ५% ई.सी. (आउट्रेलिंग बेहुकलाकोनोजोल) आपाच अंतर्भूत वापरू नवे।

अंपीधोपचारः
गिळल्याल देवदनाना प्रतिवंध होण्यासाठी जटासंवंधीचे काळजीपूर्वक उपचार करायात लक्षणनुसार उपचार करावेता।

साठवणूकः
१. बुरुशीनाशक असलेली ठेवू नवेत त्रीप्रीद्यनातर ५% डेवेप्रोल ५.५०% डेवेप्रोल

२. जेविस्ट्रू प्रेसिडेंट नवायात आउट्रेलिंग बेहुकलाकोनोजोल ५% डेवेप्रोल ५.५०% डेवेप्रोल

३. डोटेलेट लिंगोनिट वेनीन सल्पोनिक एसिड काल्शीयम सॉल्ट ५.५०% डेवेप्रोल ५.५०% डेवेप्रोल

४. डोटेलेट लिंगोनिट वेनीन सल्पोनिक एसिड काल्शीयम सॉल्ट ५.५०% डेवेप्रोल ५.५०% डेवेप्रोल

५. डोटेलेट लिंगोनिट वेनीन सल्पोनिक एसिड काल्शीयम सॉल्ट ५.५०% डेवेप्रोल ५.५०% डेवेप्रोल

बेहुकलाकोनोजोल ५% ई.सी. (आउट्रेलिंग बेहुकलाकोनोजोल)
मुक्ती: बुरुशीनाशक साठवियाची ठेवू नवेत त्रीप्रीद्यनातर ५% डेवेप्रोल ५.५०% डेवेप्रोल

मात्रांमध्ये त्रीप्रीद्यनातर ५% त्रीप्रीद्यनातर आउट्रेलिंग बेहुकलाकोनोजोल ५% डेवेप्रोल

प्रक्रिया	प्रक्रिया / विवर	मात्रा / इक्वी	मात्रा / इक्वी	त्रीप्रीद्यनातर
प्रक्रिया नाव:	हेक्साकोनोजोल ५% ई.सी. (आउट्रेलिंग बेहुकलाकोनोजोल)	मात्रा / इक्वी	शब्द	

