Read enclosed leaflet before use. उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े । ఉపయోగించుటకు ముందు జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి.

థయామెథాక్సామ్ 25% డబ్ల్యు.జి. - కీటకనాశిని

రసాయనిక సంఘటన : థయామెథాక్సామ్ ని.ప. ... 25.0 % తూ/తూ, డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్ : సోడియం లిగ్నోసల్ఫేట్ ... 5.00 % తూ/తూ, వెటింగ్ ఏజెంట్ : సోడియం లారిల్ సల్ఫేట్ ... 3.75% తూ/తూ, ప్లాస్టిసైజర్ బుటిలేటెడ్ పాలివినైల్ పైరోలిడాన్ ... 1.25 % తూ/తూ, క్యారియర్ : డయాటోమాసియస్ ఎర్త్ ... 5.00 % తూ/తూ, బైండర్ కార్న్ స్టార్చ్ ... క్యు.సి. % తూ/తూ, మొత్తం ... 100.00 % తూ/తూ. మందును ఉపయోగించుటకు సూచనలు : ధరుడేని ఆహారపదార్థములకు మరియు ఉపయోగించుటకు మందు దరపడదు. మందు జాగ్రత్తలు : 1) ఆహార పదార్థాలు, ఛాలీ సాథాలు మరియు పశు గ్రాసములు నుండి దూరముగా ఉంచండి. 2) ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు అంటనీయరాదు. 3) మందు స్ప్రాయమును పీల్చరాదు. గాలి వాలుగానే పిచారాలి చేయండి. 4) ఆయిన చుట్టులు మరియు తీరిళారములను తుట్టుకొనరాదు. 5) పిచారాల చేయువరకు మరియు మందు కలుపువరకు సరైకెక్కిన దుస్తులను ధరించండి. దినప్ప చిక్కి : ప్రత్యేకమైన చేప లేదు. రోగి లక్షణములను బట్టి చిక్కిత్స చేయండి. ప్రథమ చిక్కిత్స : 1. మందును మింగినచో నిర్దిష్ట ప్రథమ ఉపశమన చేయరాదు. 2. దుస్తుల మరియు చర్మమ మందుతోనున్నచో దుస్తులు తీసివేసి బాగా వీటితో సబ్బుతో తుడుపుచేయండిచాలు. 3. కళ్ళలో చేయిన చేసిన వెంటనే తుట్టుకొని నీటితో 10-15 ని.ల పరకు ధారాళ కడగండి. విషప్రభావం : తలనొప్పి, మగత, కండరనలబలితనం, కాంపలం మరియు తుట్టుకోవడంతో కూడిన ఉపశమనం. సిఫారసులు : థయామెథాక్సామ్ 25% డబ్ల్యు.జి. ఆహార పిష్టుక వర్తగల అంతర్గాహక కీటకనాశిని. వీని తుట్టుకొని గల సూక్ష్మజీవ కీటకపు మొత్తు మరియు పై మొలకే ప్రతిచర్యలు చూపుతుంది. అందుచే కీటకనాశిని మొలకే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవాలి. థయామెథాక్సామ్ 25% డబ్ల్యు.జి. ఆహార పిష్టుక వర్తగల అంతర్గాహక కీటకనాశిని. వీని తుట్టుకొని గల సూక్ష్మజీవ కీటకపు మొత్తు మరియు పై మొలకే ప్రతిచర్యలు చూపుతుంది. అందుచే కీటకనాశిని మొలకే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవాలి. వరి : ఉధృతమైనప్పుడు ఎకరాకు 80 గ్రా. లేదా 320 గ్రా. ఎకరాకు 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచారాలి చేయండి. ఆకుమడి తుళ్ళు, ఆకుపచ్చ తుళ్ళు, పొగాకు లద్దె పురుగు, ఆకుచుట్టు పురుగు, పొగాకు మొగ్గ తినే పురుగ