RACE

CHLORANTRANILIPROLE 18.5% w/w SC

(INSECTICIDE)

Chlorantraniliprole 18.5% w/w SC (20% w/v) is a novel substituted anthranilamide insecticide. It is a broad spectrum insecticide and is recommended for controlling pests of Rice, Cabbage, Cotton, Sugarcane, Tomato, Chilli, Soybean, Brinjal, Pigeon pea (Red gram), Bengal gram, Black gram, Bitter gourd, Okra, Maize & Groundnut crop.

Crop	Common name of pest	Dosage per hectare			Waiting period between last spray and harvest (in days)	Re-entry after each Application (In Hours)
		a.i. (g)	Formulation (ml)	Dilution in (ltr)		
Rice	Stem borer (Schirphophaga incertuals) and Leaf Floder (Cnaphalocrocis medinalis)	30	150	500	47	
Cabbage	Diamond Back Moth (Piutella Xylostella)	10	50	500	3	
Cotton	American Boll Warm (Helicoverpa armigera) Spotted bollworm(Earias vittella) Tabacoo caterpillar (Spodoptera litura)	30	150	500	9	
Sugarcane	Termite (Odontolermes obesus/ Microtermes obesi)	100-125	500-625	1000		
	Early shoot borer (Chilo infuscatellus)	75	375	1000	208	
	Top borer (Scirpophaga excerptalis)	75	375	1000		
Tomato	Fruit borer (Helicoverpa armigera)	30	150	500	3	
Chilli	Fruit borer (Helicoverpa armigera, Spodoptera litura, Spodoptera exigua)	30	150	500	3	
Soybean	Green semiloopers (Chrysodexis acuta) Stem fly Girdle beetle	30	150	500-750	22	
Brinjal	Fruit and Shoot borer (Leucinoides orbonalis)	40	200	500-750	3	
Pigeon pea	Gram pod borer (Helicoverpa armigera) Pod fly (Melanogromyza obtusa)	30	150	500-750	29	
Bengal gram	Pod borer (Helicoverpa armigera & Spodoptera spp.)	25	125	500	11	
Black gram	Pod borer (Maruca spp. & Spodoptera litura)	20	100	500	20	
Bittergourd	Fruit Borers & Caterpillars (Diaphania sp. & H.armigera)	20-25	100-125	500	7	
Okra	Fruit borer (Helicoverpa armigera & Earias vilella)	25	125	500	5	
Maize	Spotted steam borer, Pink steam borer	40	200	500	10	
Groundnut	Tobacco caterpillar	30	150	500	28	

DIRECTION FOR USE: (Method and Time of application) **Sugarcane:** Sett Drenching/ Soil Drenching in the sugarcane crop for control of termites and early shoot borer and Top borer. The application fro the control of 3rd, 4th and 5th brood of Top borer in sugarcane, should be done as Soil drenching in the month of june Other crops (Rice, cotton, cabbage, tomato,chilli, soybean, brinjal, pigeonpea,bengal gram, black gram, bittergourd, okra, maize & groundnut) use as foliar spray at ETL of the pest population using knapsack sprayer. **Time of Application: PRECAUTIONS:** 1. Leaflet carefully, Save the container with the label to the show the physician in case of accidental poisoning. Read and follow all instructions on the label. 2. Do not inhale the contents. Wear rubber gloves, goggles, facemask and protective clothing while handling. Avoid remaining in the drift of spray by applying the insecticide with the wind. 3. Do not eat, drink, smoke or chew betel leaves while spraying. 4. Do not fill the spray tank beyond 3/4th of its capacity. Clean the blocked nozzle by a thin wire or pin never by blowing the same. 5. In case of any spillage on the body, it should be washed with plenty of water. 6. Always change clothing and take bath as soon as the insecticide treatment is over. 7. Wash hands and unprotected parts of the body before eating, drinking or smoking and after handling. 8. Remove and wash contaminated clothing before reuse. 9. Call a physician immediately if any symptoms of poisoning appear in a person who is using or has recently used this insecticide. **Symptoms Of Poisoning:** Mild eye irritant with blurred vision. Vapour inhalation may result in nasal secretion. **First Aid:** IF Inhaled; No specific intervention is indicated as the material is not likely to be hazardous by inhalation. If on skin: The material is not likely to be hazardous by skin contact, but cleaning the skin after use is advisable. If in eyes: The material is not likely to be hazardous to the eyes is, but if contact occurs, flushing the eyes with plenty of water. **Phytotoxicity:** No phytotoxic at recommended dosages. **Antidote:** No specific antidote available, treat symptomatically. **Disposal Of Used Container:** Container for not reuse. Empty containers should be destroyed and buried in ½ meter deep soil away from habitation. Do not contaminate the environment, water or food by storage of disposal. Do not flush to surface water or sanitary sewer system. **Storage Conditions :** Do not store or consume food, drink or tobacco in areas where they become contaminated with this material. Store the insecticide in original container only. Tightly closed in a well built, cool, dry place, well lit and ventilated and should be of sufficient dimensions to avoid contaminations with vapors. The material should be kept under lock and key, away from food, animal feed, other pesticide and fertilizers.

Chemical Composition:

Chlorantraniliprole a.i.	18.50% w/w
Methyl methacrylate ethoxylated graft co-polymer	3.00% w/w
Ethylene oxide/propylene oxide block co-polymer and ethoxylated alcohol	2.00% w/w
Attapulgite clay	1.00 % w/w
Xanthan gum	0.25% w/w
1,2-benzisothiazolin-3-one	0.10% w/w
Silicone emulsion	0.50% w/w
Propylene glycol	6.80% w/w
Water	Q.S.% w/w
Total	**100% w/w**

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

रेस

क्लोरऐन्ट्रानिलिप्रोल 18.5% भार/भार एससी

(कीटनाशक)

क्लोरऐन्ट्रानिलिप्रोल 18.5% भा/भा एस सी (20% भा/भा) एक अनूठे किस्म का एबजी ऐन्थनिलामाइड कीटनाशक है। यह एक बहु आयामी असर वाला कीटनाशक है जिसे धान, पत्तागोभी, कपास, गन्ना, टमाटर, मिर्च, सोयाबीन, बैंगन, अरहर, चना, उड़द, करेला, भिन्डी, मक्का और मूंगफली पर लगने वाले विभिन्न कीटों की रोकथाम के लिए इस्तेमाल की सिफारिश की जाती है।

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा			अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनो में)	पुन:प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
		स.तत्व ग्राम	संरचना (मि.ली.	पानी की मात्रा (ली.)		
धान	तना छेदक तथा पत्ता मोड़क	30	150	500	47	
पत्तागोभी	गोभी के चमकीले पंतगे	10	50	500	3	
कपास	अमेरिकी बोल वर्म पब्बेट्ट सुंडी तम्बाकू की इल्ली	30	150	500	9	
गन्ना	दीमक	100-125	500-625	1000		
	टॉप शूट बोरर	75	375	1000	208	
	अर्ली शूट बोरर	75	375	1000		
टमाटर	फल छेदक (हेलीकोवर्पा आर्मिगेरा)	30	150	500	3	
मिर्च	फल छेदक (हेलीकोवर्पा आर्मिगेरा लिचुरा, स्पोडोप्टेरा एक्सिगुआ)	30	150	500	3	
सोयाबीन	हरे अर्ध लूप्पा कीट (क्राइसोडेक्सिस एक्यूटा) तना मक्खी गरडल बीटल	30	150	500-750	22	
बैंगन	बैंगन और अंकुर तना छेदक (लूसीनोडेझ ओर्बोनेलिस)	40	200	500-750	3	
अरहर	दाल फली छेदक (हेलीकोवर्पा आर्मिगेरा), फलिया मक्खी (मेलानोग्रोमाइझा ऐब्टूसा)	30	150	500-750	29	
चना	फली छेदक (स्पोडोप्टेरा या हेलीकोवर्पा आर्मिगेरा)	25	125	500	11	
उड़द	फली छेदक (मक्का या स्पोडोप्टेरा)	20	100	500	20	
करेला	फल छेदक (हिफेमिआ, हेलीकोवर्पा आर्मिगेरा)	20-25	100-125	500	7	
भिण्डी	फल छेदक (हेलीकोवर्पा आर्मिगेरा, एरीआस विलेला)	25	125	500	5	
मक्का	धब्बेदार तना छेदक, गुलाबी तना छेदक	40	200	500	10	
मूंगफली	तम्बाकू सुंडी	30	150	500	28	

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश: (प्रयोग का समय व तरीक) गन्ना: गन्ने के दीमकों, कोमल तना छेदक तथा शीर्ष छेदक कीटों की रोकथाम के लिए या वृत्त-डंठल या मिट्टी को सरोबोर करें, गन्ने के शीर्ष छेदक कीटों के 3रे 4थे तथा 5वें भ्रूण अंडज को नियंत्रण करने के लिए जून महीने में मिट्टी को सरोबोर करना चाहिए। अन्य फसल: चावल, कपास और पत्तागोभी, गन्ना, टमाटर, मिर्च, सोयाबीन, बैंगन, अरहर, चना, उड़द, करेला और भिन्डी के मामले में कीट की संख्या जब आर्थिक नुकसान की देहरी (ई टी एल) पर हों तो नैप सैक स्पेयर से छिड़काव करें। **प्रयोग का समय: प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** 1. लेबल व पत्रक पर छपे सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करें, दुर्घटना वश विशाक्तता होने पर लेबल सहित कन्टेनर को सुरक्षित रखें, ताकि डॉक्टर को दिखलाया जाए। 2. सामग्री को सूघंना नहीं चाहिए प्रयोग के समय रबर के दस्ताने, रंगीन चश्में, चेहरे का नकाब व सुरक्षात्मक कपड़े पहनें हवा की बहाव दिशा में छिड़काव करके स्प्रे के छीटों से बचने का प्रयास करें। 3. छिड़काव के समय न तो खायें, पियें धूम्रपान करें, न ही तंबाकू/पान चबायें। 4. स्प्रे टैंक को 3/4 से ज्यादा क्षमता में नही भरे: नोजल में कणों के फैलने पर मुँह से न फूंके बल्कि पतले तार या पिन से साफ करें। 5. शरीर पर छलकन गिरने की हालत में खूब साफ पानी से साफ करें। 6. छिड़काव उपचार पूरा होते ही हमेशा कपड़े बदलें और नहायें भी। 7. खाने, पीने धूम्रपान से पहले तथा प्रयोग के बाद शरीर के खुले हिस्सों व हाथ-पैर को अच्छी तरह धो लें। 8. दुबारा इस्तेमाल करने से पहले दूषित कपड़े निकाल कर धो लें। 9. जिस किसी ने इस कीटनाशक को हाल में इस्तेमाल किया है या कर रहा है, उस पर विषाक्तता के लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर बुलायें। **विष के लक्षण:** आंखो में हलकी जलन व धुंधल दिखना, वाष्प सांस में जाने पर नाक से पानी बहता है। **प्राथमिक चिकित्सा:** यदि सांस में गई हो, तो कोई खास प्रतिक्रिया नहीं होती क्योंकि सामग्री सांस में जाने पर इतनी खतरनाक नही है, त्वचा पर संपर्क से दूषित होने से भी सामग्री इतनी खतरनाक नही हो सकती, फिर भी, त्वचा को साफ करना अच्छा ही होता है, आँख से संपर्क होने पर भी यह सामग्री इतनी खतरनाक होने की संभावना नहीं रखती, फिर संपर्क का असर दिखे, तो खूब सारे पानी से आँखों का प्रक्षालन करें। **पौधविशाक्तता:** सिफारिश मात्रा प्रयोग करने पर पौधों के लिए विषाक्त नहीं है। **विष नाशक:** कोई विशेष विष हरने वाली दवा नहीं है, लक्षण अनुसार ईलाज करना चाहिए। **खाली डिब्बों का निपटारा:** ये कन्टेनर दुबारा इस्तेमाल के लिए नही होते, खाली कन्टेनरों को नष्ट करके, निवास स्थान से दूर 1/2 मीटर गहरे मिट्टी में गाड़ देना चाहिए, निपटान की चीजों से पर्यावरण, पानी या भोजन संदूषित नहीं होना चाहिए, निपटान के पानी को पानी की सतह थी सफाई-गटर निकास सिस्टम से बचाना चाहिए। **संग्रहण की शर्तें:** इस सामग्री से संदूषित भोजन, पेय सामग्री या तंबाकू का सेवन न करें, ये सब चीजें संदूषित न होने पायें इस तरह से दवा का भण्डारण करना चाहिए। कीटनाशक सामग्री को उनके मूल कन्टेनर में, अच्छी तरह से बंद करके ठंडी, सूखी जगह में ऐसे कमरे या परिसर में रखना चाहिए, जो कि हवादार हो और जिसे बंद किया जा सके, ताकि वाष्प से संदूषिण न फैले, कीटनाशक सामग्री को भोजन, जानवरों के चारों, अन्य कीटनाशकों और खादों से अलग ताला चाबी की व्यवस्था के अंतर्गत रखा जाना चाहिए।

रासायनिक संरचना:

क्लोरऐन्ट्रानिलिप्रोल सक्रिय तत्व	18.50% भार/भार
मिथाइल मिथाक्राइलेट इथोक्सीलेटेड सह पोलिमर का निरोप	3.00% भार/भार
ईथाइलीन ऑक्साइड / प्रोपाइलीन ऑक्साइड सहपोलिमर पिंडक तथा इथोक्सीलेटेड अल्कोहल	2.00% भार/भार
अटपुलगाइट क्ले	1.00% भार/भार
जेनथेन गोंद	0.25% भार/भार
1,2- बेन्ज़ीसो थियाज़ोलिन -3-एकल	0.10% भार/भार
सिलिकॉन इमल्शन	0.50% भार/भार
प्रोपाइलीन ग्लाइकोल	6.80% भार/भार
जल	पर्याप्त मात्रा% भार/भार
कुल	**100% भार/भार**

सावधानी : इस लेबल/पत्रिका में निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें।

రేస్

క్లోరాంథ్రానిలిప్రోల్ 18.5% బ/బ ఎస్‌సి

(కీటకనాశని)

క్లోరాంథ్రానిలిప్రోల్ 18.5% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు ఎస్‌సి (20% డబ్ల్యు/వి) అనేది అంథ్రనిలిక్ స్థి ఎమైడ్ ఓ కొత్త విస్తృత చర్య గల కీటకాశి, దీన్ని వరి, క్యాబేజి, పత్తి, చెరకు, టమాటా, మిరపకాయ, తయారుచేసిన, వంగ, కంది, శనగ, మినుము, కాకర, లేడి, ముక్క జొన్న మరియు వేరుశనగ పంటల నాశించే పీడపీడలను అరికట్టుటకై సిఫారసు చేయ బడుతుంది.

పంట	పీటపీడల్ని సామాన్యంగా పిలిచే పేరు	హెక్టారుకు మోతాదు			చివరి స్ప్రే నుండి కోత కాలం వరకూ వేచి వుండాల్సిన సమయం (రోజుల్లో)	ప్రతి పిచికారి తరువాత పునః ప్రవేశం (గంటల్లో)
		స.మ. (గ్రాములల్లో)	సూత్రీకరణ (మి.లీ.లలో)	వాడాల్సిన నీటి మోతాదు (లీటర్లలో)		
వరి	కాండముతొలుచు పురుగులు మరియు ఆకుముడత పురుగులు లేదా ఆకుచుట్టు పురుగులు లేదా నాముతెగులు	30	150	500	47	
క్యాబేజి	డైమండ్ బ్యాక్ మత్ (వజ్రాకారపు నీపు పురుగు)	10	50	500	3	
ప్రత్తి	కాయతొలుచు పురుగులు, తంచక్క పురుగులు లేదా మచ్చల పురుగులు, ఊగాలుల్లర్ల పురుగులు	30	150	500	9	
చెరకు	చెద పురుగులు, పీక పురుగులు, మొవ్వనల్ల పురుగులు లేదా దవ్వనల్ల పురుగులు లేదా దవ్వతొలుచు పురుగులు	100-125	500-625	1000		
		75	375	1000	208	
		75	375	1000		
టమోటా	కాయతొలుచు పురుగు (హెలికోవెర్పా ఆర్మిగెరా)	30	150	500	3	
మిరప	కాయతొలుచు పురుగు (హెలికోవెర్పా ఆర్మిగెరా, స్పొడొప్టెరా లిటురా, స్పొడొప్టెరా ఎక్సిగుయా)	30	150	500	3	
సోయాబిన్	రాగన పురుగు (క్రిసొడెక్సిస్ ఎక్యుటా), కాండము ఈగ, పెరుకు పురుగు	30	150	500-750	22	
వంకాయ	కాండము మరియు కాయతొలుచు పురుగు	40	200	500-750	3	
కంది	కాయతొలుచు పురుగు (హెలికోవెర్పా ఆర్మిగెరా), కాయ ఈగ (లెలాంగ్రోమైజా ఒబటుస్సా)	30	150	500-750	29	
శనగ	కాయతొలుచు (హెలికోవెర్పా ఆర్మిగెరా, స్పొడొప్టెరా జాతి)	25	125	500	11	
మినుము	కాయతొలుచు (మరోకా జాతి, స్పొడొప్టెరా జాతి)	20	100	500	20	
కాకర	కాయతొలుచు మరియు ఆకునిక్కే గొంగళి పురుగులు (హెలికోవెర్పా ఆర్మిగెరా, డయాఫానియా ఇండికా)	20–25	100–125	500	7	
లేడి	కాయతొలుచు (హెలికోవెర్పా ఆర్మిగెరా, ఇరియాస్ విటెల్లా)	25	125	500	5	
మొక్క జొన్న	మచ్చల మొవ్వ పురుగు గులాబి రంగు పీకపురుగు	40	200	500	10	
వేరుశనగ	ఖణాకులర్ల పురుగులు	30	150	500	28	

ఉపయోగించేందుకు సూచనలు: (అప్లికేషన్ విధానం మరియు సమయం) చెరకు: చెరకు పంటలోనే చెదపురుగులు మరియు తొలిచుకతో పిరుబంధే పురుగు మరియు పెద్దనుండి తొలుచు పురుగుల నియంత్రణ కోసం సెట్టి డ్రెంచింగ్/ మట్టిని తడపడం చేయాలి. చెరకులో 3వ, 4వ మరియు 5వ సంతానమైన పెద్దముండే తొలుచు పురుగు నివారణకు దరఖాస్తు జూన్ నెలలో ఇతర పంటలు (వరి, పత్తి, క్యాబేజీ, టమాటా, మిరప, తయారుచేసిన, వంకాయ, బఠాణీ, నల్ల శనగలు, కాకరకాయ, బెండకాయ, మొక్కజొన్న మరియు వేరుశెనగలు) నాప్‌సాక్ స్ప్రేయరు ఉపయోగించి తెరలు సంఖ్యని ETL వద్ద జరిపియిన స్ప్రే గా ఉపయోగించండి. **అప్లికేషన్ సమయం: ముందు జాగ్రత్తలు:** 1. లేబులతో ఉన్న కంటెంట్ (సమాచారాన్ను విషప్రయోగం జరిగితే వెద్యుడికి చూపించడానికి కరపత్రాన్ని జాగ్రత్తగా సేవ్ చేయండి. లేబుల్‌ను తప్పక అన్ని సూచనలను చదవి, అనుసరించండి. 2. దీన్ని పీల్చుకోకండి. దీన్ని నిర్వహించేటప్పుడు రబ్బర్ తొడుగులు, కళ్ళకు నల్ల కళ్ళద్దాలు, ముఖపు కవరు, తల కవరు, జేడదారి దుస్తులు ధరించాలి. దీన్ని చల్లేటప్పుడు గాలి వాలాగ్న, చూపుకోసి చల్లుకోవాలి. తత్ఫలా దీని తుంపర్లు మీద పడకుండా కాపాడుకోవచ్చు. 3. దీన్ని చల్లేటప్పుడు ఏదైనా తినడం, త్రాగడం, పొగతాగటం లేదా తమలపాకులు నమలడం మొదలగు పనులు చేయరాదు. 4. స్ప్రే ట్యాంకును 3/4 వంతులకు మించి నింపరాదు. పూడుకుపోయిన నాజిలేను ఏదైనా సన్నని వైరుతో లేదా పిన్‌తో జుడిసి శుభ్రపర్చుకోవాలే గాని, నోటితో ఊదగాడు. 5. ఒకవేళ ఏమైనా తుంపర్లు శరీరం మీద పడితే, వెంటనే శుభ్రమైన నీటితో శుభ్రపర్చుకోవాలి. 6. ఈ కీటకనాశిని చల్లుకున్న వెంటనే బట్టల్ని తీసివేసి శుభ్రమైన స్నానం చేయాలి. 7. ఏదైనా తినడం, త్రాగడం లేదా పొగతాగటానికి ముందు మరియు చల్లుకున్న వెంటనే చేతుల్ని మరియు కన్నుకొనని తరిగ భాగాలను శుభ్రపర్చుకోవాలి. 8. కలుషితమైన బట్టల్ని తిరిగి వాడుటకు ముందు తప్పక ఉతుక్కోవాలి. 9. ఈ మందును చల్లేవారు లేదా ఈ మందు చల్లిన వారికి ఏమైనా విష లక్షణాలు కనబడుతుంటే వెంటనే డాక్టర్‌కాన్ను సంప్రదించండి. **విషల క్షణాలు:** మెస్సరుగా కళ్ళలో దురదతో పాటు మసక మసకగా వుంటుంది. దీని ఆవిరి పీల్చినట్లయితే, నాసిక రంధ్రాల నుంచి నీరు కారుతుంది. **ప్రథమ చికిత్స:** రక్తానికి అంటితే వెంటనే నీళ్ళతో కడుక్కోవలెను, కంటికి అంటితే, 15 నిమిషాలపాటు శుభ్రమైన నీటితో కడుగుకోవలెను. ఒకవేళ పీల్చితే గాలి, వెలుతురు గల (ప్రదేశంలో) ఉండవలెను. ఒకవేళ ఇంకా క్పాన పీల్చుకోతేని పల్చిత్తిలో ఉండే కృత్రిమంగా శ్వాస అందించవలెను. ఒకవేళ మింగితే ఒకటి నుండి రెండు గ్లాసుల నీటిని త్రాగంది వాంతి చేయించవలెను. ఒకవేళ అచేతనుడ స్థితిలో ఉంటే వాంతి చేయించవలెను. ఒకవేళ అచేతనుడ స్థితిలో ఉంటే వాంతి చేయించరాదు. ఇటువంటి పల్చిత్తిలో వెంటనే వైద్యునితో చికిత్స చేయించవలెను. **పైటోటాక్సిసిటీ:** సిఫార్సు చేయబడిన మోతాదులలో పైటోటాక్సిక్ ఉండదు. **విరుగుడు:** విష లక్షణాలను బట్టి చికిత్స జరిపించాలి. **వాడిన కంటెయినర్‌ని పారవేయడం:** కంటెయినర్ తిరిగి ఉపయోగించరాదు. ఖాళీ డబ్బాలని నాశనంచేసి, పరివారాలకి దాపు మీటర్ దూరంగా లోతుగా మట్టిలో పాతిపెట్టాలి. పారవేయడం ద్వారా పర్యావరణం, నీరు లేదా ఆహారాన్ని కలుషితం చేయవద్దు. ఉపరితల నీటికి లేదా సానిటరీ మురుగునీటి వ్యవస్థలోకి ఫ్లష్ చేయవద్దు. **నిల్వ పరిస్థితులు:** దీన్ని ఆహారపదార్థాలు నిల్వచేసే చోట నిల్వచేయరుకండి. అలాగే దీని వలన కలుషితమైన పరియాలలో ఏదైనా తినడం. త్రాగడం లేదా పొగతాగటంలాంటి పనులు చేయరాదు. ఈ కీటకనాశిని వాటి యొక్క ఒరిజినల్ డబ్బాలలోనే నిల్వచేసి వుంచాలి. డబ్బాల మూతగట్టిగా బిగించివుంచి, మంచి గట్టి కట్టడాలలో, చల్లగా, పొడిగా ఉన్న, బాగా గాలి వెలుతురు ప్రసరించే చోట నిల్వ చేయాలి. ఇలా నిల్వ చేయడం ద్వారా పీటీ ఆవిరి వలన వచనాలు కలుషితం కాకుండా కాపాడుకోవచ్చు. ఈ కీటకనాశిని డబ్బాలను వాటి యొక్క పరిమాణము మరియు సైజాన్ని బట్టి చేయవేరు అలమారాలలో పెట్టి తాళంవేసి ఉంచాలి. అంతే గాక దీన్ని ఆహారపదార్థాలను, పశువులదాణా, ఇతర కీటకనాశనులు మరియు ఫెర్టిలైజర్స్‌కు దూరంగా నిల్వచేయాలి.

రసాయనిక మిశ్రమము:

క్లోరాంథ్రానిలిప్రోల్ స.ప.:	18.5% బ/బ
మిథైల్ మెథాక్రైలేట్ ఎథోక్సిలేటెడ్ గ్రాఫ్ట్ కోపాలిమర్ ఎథిలీన్ ఆక్సైడ్/ప్రప్పైలీన్	3.0% బ/బ
ఆక్సైడ్ బ్లాక్ కోపాలిమర్ మరియు ఎథోక్సిలేటెడ్ ఆల్కహాల్ అట్టపుల్గైట్ క్లే	2.0% బ/బ
గ్వాంథాన్ బంక	1.0% బ/బ
1,2 బెంజిసోథియాజోలిన్-3-వన్	0.25% బ/బ
సిలికాన్ ఎమల్సిన్	0.1% బ/బ
ప్రొపీలీన్ గ్లైకోల్	0.5% బ/బ
నీరు	6.8% బ/బ
మొత్తం:	క్యూశికే వాలినంత
	100% బ/బ

హెచ్చరిక: లేబుల్/కరపత్రం మీద పున్న పంటలు కాకుండా ఇతర పంటల మీద వాడరాదు.

RACE

CHLORANTRANILIPROLE 18.5% w/w SC

(INSECTICIDE)

रेस

क्लोरऐन्ट्रानिलिप्रोल 18.5% भार/भार एससी

(कीटनाशक)

రేస్

క్లోరాంథ్రానిలిప్రోల్ 18.5% బ/బ ఎస్‌సి

(కీటకనాశని)

ರೇಸ್

ಕ್ಲೊರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೊಲ್ 18.5% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್‌ಸಿ

(ಕೀಟನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/Leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిలను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by :

Aegis®

Agro Chemicals India Private Limited

237, Main Road, Mallepally (V),

Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502 295. Telangana State.

Customer Care Manager No. +91 8498099536

Email: aegisagrochemicals@gmail.com / www.aegisagro.in

Mfg Licence No: 019/TS-IML/2016

Reg.No.: CIR-257826/2023-

Chlorantraniliprole (SC) (443)-485

For Agriculture use only. केवल कृषि उपयोग के लिए।

रेस

क्लोरॅन्ट्रानिलिप्रोल 18.5% व/व एससी

(कीटकनाशक)

क्लोरॅन्ट्रानिलिप्रोल 18.5% व/व एससी (20% भा/प.) एक नाविन्यपूर्ण ॲन्थ्रॅनिलिक डायामाईड कीटकनाशक आहे. हे एक व्यापक प्रभावी परिणाम करणारे कीटकनाशक आहे, त्याची शिफारस भात, कापूस, कोबी, ऊस, टोमॅटो, मिरची, सोयाबीन, वांगी तूर, चणा, उडीद, कारले, भेंडी, मका, आणि भुईमूग वर वेगवेगळ्या कीटकांच्या नियंत्रणासाठी केली जाते.

पीक	कीटकाचे सामान्य नाव	प्रमाण प्रति हेक्टर ग्रॅम स.त.	द्रावण (मि.लि.)	सौम्य करण्यासाठी पाणी (ली.)	शेवटची फवारणी ते कापणीतील वाट पाहण्याचा कालावधी (दिवसात)	प्रत्येक फवारणीनंतर पुन्हा प्रवेश (तासांमध्ये)
भात	खोड किडा (सिफॉफगा इनस्चुलस) आणि पाने गुंडाळणारी अळी (स्नेफालोक्रॉसिस मेडिनिलिस)	30	150	500	47	
कोबी	चौकोनी ठिपक्याचा पतंग (प्लुटेला-झायलोस्टेला)	10	50	500	3	
कापूस	हिरवी बोंडअळी (हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा) ठिपकेदार बोंडअळी (इयसिस विटेल्ला) लष्करी अळी (स्पोडोप्टेरा लिटच्यूरा)	30	150	500	9	
ऊस	वाळवी/उपद्री (ओडोटोटर्मस ओबेसस पाइक्रोटर्मस ओबेसी) खोड किडा (अर्ली शूट बोअरर) (चिलो इन्फस्कटेलस) टॉप बोरर (शिर्षोफगा एक्सर्ता पटेलिस)	100-125 75 75	500-625 375 375	1000 1000 1000	208	
टोमॅटो	फळ पोखरणारी अळी (हेलीकोवर्पा आर्मिजेरा)	30	150	500	3	
मिरची	फळ पोखरणारी अळी (हेलीकोवर्पा आर्मिजेरा, स्पोडोप्टेरा लिटच्यूरा, स्पोडोप्टेरा एक्सीगुआ)	30	150	500	3	
सोयाबीन	हीरवी उंट अळी (क्राइसोडेक्सिस एक्युटा) खोड पोखरणारी माशी गर्डल बीटल/चक्री भुंगा	30	150	500-750	22	
वांगी	फळ आणि शेंडा पोखरणारी अळी (लूसीनोडइस ऑरबोनालिस)	40	200	500-750	3	
तूर	शेंग पोखरणारी अळी (हेलीकोवर्पा आर्मिजेरा) शेंग माशी (मेनानोप्रोमइरा एल्ट्यूझा)	30	150	500-750	29	
चणा	शेंग पोखरणारी अळी (हेलीकोवर्पा आर्मिजेरा, स्पोडोप्टेरा लिटच्यूरा)	25	125	500	11	
उडीद	शेंग पोखरणारी अळी (मारुका इलॉटालिस)	20	100	500	20	
कारले	फळ पोखरणारी अळी, पामवरील सुरवंट (हेलीकोवर्पा आर्मिजेरा, ऐयाकानिया एसपी)	20-25	100-125	500	7	
भेंडी	फळ पोखरणारी अळी (हेलीकोवर्पा आर्मिजेरा, इयारलियास विलिया)	25	125	500	5	
मका	ठिपकेदार खोड कीडा गुलाबी खोड कीडा	40	200	500	10	
भुईमूग	लष्करी अळी	30	150	500	28	

वापराची पद्धती: (लावण्याची पद्धती आणि वेळ) ऊस: ऊसामध्ये सेट मिरविणे/माती भिजविणाने वाळवी आणि सुरवातीच्या स्तरातील देठ पोखणाऱ्ये किंवा टोक पोखणाऱ्या किटकांवर नियंत्रण मिळवित येते. ऊसाच्या 3-ऱ्या, 4थ्या आणि 5व्या पेरच्या भागाला पोखणाऱ्या किटकांकरिता जून महिन्या मध्ये माती भिजविण्याची प्रक्रिया करावी लागते. इतर पिक जसे (तांदूळ, कापूस, कोबी, टोमॅटो, मिर्ची, सोयाबीन, वांगी, वाटाणा,हरभरा, काळा वाटाणा, कारले, भेंडी, मका आणि भुईमूग) वाकरित पर्ण फवारणी ही किटकाच्या संख्येचा स्तर ईटीएलमध्ये असताना वर्नमसेक फवाचाने करावी. **लावण्याचा कालावधी: खबरदारी:** 1. पाऊक काळाजीपूर्वक वापावे, चुकीचे किंवा अपघातने विषबाधा झाल्यास चिकित्सकांना पाऊक दाखविण्याकरता उत्पादनाचे पाकिट सोबतूक ठेवावे. 2. हा सामग्रीचा वापर घेतू नका. हाताची फवारणी करताना रबरी हातमोजे, गॉगल्स, चेहऱ्याचा मुखवटा आणि सुरक्षित कपडे वापरावेत. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करताना फवारणीच्या तुषारांपासून वाचण्याचा प्रयत्न करा. 3. फवारणी करताना खाणू, पिणू, धुम्रपान करू नये, तंबाखू, पान चघळू नये. 4. फवारणी टाकिला 3/4 पेक्षा अधिक क्षमतेत भरू नये. नोझल मध्ये कण अडकल्यानंतर तोंडाने फुंकू नये, पातळ तारेने वा पिनने साफ करावे. 5. शरीरावर गळती झाल्यास, भरपूर पाण्याने स्वच्छ करा. 6. नेहमीच फवारणी झाल्यावर कपडे बदलावेत आणि आंघोळ करावी. 7.खाण्यापिण्या व धुम्रपान करण्यापूर्वी तसेच फवारणी नंतर शरीराचा उघडा भाग हात-पाय व्यवस्थित धुवावेत. 8. पुन: वापरण्यापूर्वी दूषित झालेले कपडे काढून धुवा. 9. त्या मागासाने ह्या कीटकनाशकाचा वापर युक्तपाच केला आहे, त्यावर विषबाधेची लक्षणे दिसताच त्वरित डॉक्टरला बोलवा. **लक्षण:** डोळ्यात बोटीशी जळजळ व अंधुक दिसणे. वाफ श्वासाद्वारे आत गेल्यास नाकातून पाणी वाहते. **प्रथमोपचार:** जर श्वासद्वारे आत गेले तर, कोणतीही खास प्रतिक्रिया होत नाही, कारण हे उत्पादन श्वासद्वारे आत गेल्यास एवढे घोकादायक नाही. त्वचेच्या संपर्काने दूषित झाल्यास हे उत्पादन एवढे घोकादायक होयू शकत नाही. तरीही त्वचेस स्वच्छ कराणे चांगले असते. डोळ्यांशी संपर्क झाल्यामाही हे उत्पादन घोकादायक होण्याची संभवना नसते ; तरीही संपर्क झाल्यास भरपूर पाण्याने डोळे धुवा. **विषबाधा:** शिफारस केलेल्या मात्रेनुसार वापरल्यास विषबाधा होण्याची संभावना नाही. **औषधोपचार:** लक्षणानुसार उपचार करा. **वापरलेल्या भांड्याची विल्हेवाट:** भांडी पुन्हा वापरू नये. रिकामी भांडी ही नष्ट करून वसाहतीपासा लांब 2 मीटर खोल खड्ड्यामध्ये पुरावी. विल्हेवाट लावते वेळी पर्यावरण , पाणी किंवा खाद्यपदार्थ दूषित होणार नाही याची काळजी घ्यावी. पाण्याचा निचरा होत असेल त्या ठिकाणी किंवा साठ्याण्याच जवळ देखील उत्पादनाचे पाणी फेकू नये. **साठविण्याची पद्धती:** ह्या साहित्याने दूषित झालेले आन, पेय वा तंबाकूचे सेवन करू नये. हे सर्व साहित्य दूषित होणार नाही, अशा प्रकारे ह्या कीटकनाशकाची साठवण केली पाहिजे. कीटकनाशकाची साठवण मूळ डब्यातच, घट्ट बंद, ठंड, कोरड्याजागी अशा खोलीत वा जागेत केली पाहिजे, जी हवेशीर असावी, लासरंट आणि भरपूर उबदे असलेली असावी जेणे करून वाफेने होणारे प्रदुषण टळेल. हे कीटकनाशक अप्रपर्यंच, जनावरांचा चारा, इतर कीटकनाशके आणि खतापासून वेगळ्या कुलुप-चावीत ठेवावे.

रासायनिक संरचना:

क्लोरॅन्ट्रानिलिप्रोल सक्रिय तत्व	18.5% व/व
मिथाइल मिथाक्राइलेट इथाक्सिलेटेड ग्राफ्ट कोपोलीमर	3.0% व/व
इथाइलीन ऑक्साइड/ प्रोपाइलीन ऑक्साइड कोपोलिमर आणि इथॉक्सिलेटेड अल्कोहोल	2.0% व/व
अटपुलगाइट व क्ले	1.0% व/व
झेनथॅन गम	0.25% व/व
1,2 बेन्जीसोथियाजोलिन-3-वन	0.1% व/व
सिलिकॉन इमल्शन	0.5% व/व
प्रोपाइलीन ग्लाइकोल	6.8% व/व
पाणी	पूरेसे प्रमाण बनविण्यासाठी
एकूण	**100% व/व**

सावधगिरी: ह्या लेबल/पत्रिकेवर निर्देशित पीकाव्यतिरिक्त इतर पीकावर वापरु नये.

रेस्

क्लोरान्ट्रानिलिप्रोल 18.5% डब्ल्यू/डब्ल्यू एस्सी

(कीटनाशक)

क्लोरान्ट्रानिलिप्रोल 18.5% डब्ल्यू/डब्ल्यू एस्सी (20% डब्ल्यू/व) क्लोरान्ट्रानिलिप्रोल 18.5% एस्सी ऐनवी नवीन नॉन्स्ट्रिक्ट्रेड्स मॉडलवरुन आण्ड्राग्रीलॅन्ट् ड्युपॉन्ट् कीटनाशकांपासून. ऐनवी उच्च ड्रॅग्लोग्रो ड्रॉय मॉलीएट कीटनाशकांपासून. ऐनवी, ऐनवीकरुन, बऱ्ड, ऐनवीकरुन, बऱ्ड, ऐनवी, बोंडअळी, मिलीबग, मॅक्सिकन बोंडअळी, पांढरी माशी, तुडतुडे, पाने गुंडाळणारी अळी, ठिपके असणारे पतंग, मॅक्सिकन बोंडअळी